



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μαρκάκης Κ.  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Αθήνα, 17 -12-2013  
Αριθ. πρωτ: 13461/156789

Προς: **ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**  
Υδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280

Κοιν.: Εσωτερική διανομή:  
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας  
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

**ΘΕΜΑ:** «1. Χορήγηση οριστικής  
έγκρισης κυκλοφορίας στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(ζιζανιοκτόνο) GLEAN 75 WG  
2. Ανάκληση της με αριθ. 7349  
άδειας διάθεσης στην αγορά»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40 παρ. 1γ) και 80 παρ. 5 αυτού.
2. Τον νόμο 4036/2012 (Α' 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Την με αριθ. 7349 έκκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος GLEAN 75 WG όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ. 185910/7-6-2010 απόφαση μας και ισχύει
9. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαίωματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
10. Την με αριθ. Πρωτ. 7080/72625/28-2-2012 αίτηση της εταιρείας **ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**
11. Την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) GLEAN 75 WG. Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70063</b>
<b>17-12-2013</b>
<b>31-12-2020</b>

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

<b>GLEAN 75 WG</b>
<b>Βρέξιμοι κόκκοι (WG)</b>

**1.3 Δραστική ουσία (ες)**

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

chlorsulfuron
---------------

chlorsulfuron: min 96%
------------------------

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

DuPont International Operations Sarl  
2 Chemin du Pavillon  
CH-1218 Le Grand Saconnex  
Geneva, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

1. Dupont Agricultural Chemicals Ltd Shanghai  
(DUPAC)  
3055 Pudong Bei Lu  
Pudong Shanghai 200137  
PR China  
  
2. Dupont Agricultural Caribe Industries , Ltd  
Highway 686, Km 2.3  
PO Box 30000  
Manati Puerto Rico  
00674-3000, USA

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν κατά την έγκριση της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της Συντονιστικής Αρμόδιας Αρχής

#### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

NTY ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280  
ΑΜΕ:  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα  
Τηλ.: 210 688 9700  
Fax: 210 688 9799  
E-mail:  
[Evangelos.Diamantis@grc.dupont.com](mailto:Evangelos.Diamantis@grc.dupont.com)

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του σκευάσματος στην αγορά

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

DuPont International Operations Sarl  
2 Chemin du Pavillon  
CH-1218 Le Grand Saconnex  
Geneva, Switzerland

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του  
σκευάσματος

**1. DuPont Australia Limited, Girraween Plant**

179 Magowar Road  
Girraween, New South Wales 2145  
Australia

**2. DuPont de Nemours (France) S.A.S.**

82 rue de Wittelsheim  
BP9  
F-68701 Cernay Cedex  
France

**3. DuPont Khimprom**

101 Promyshlennaya Str.  
429952, Novocheboksarsk  
Chuvash Republic  
Russia

**4. DuPont Crop Protection, El Paso Plant**

2830 US Highway 24  
El Paso, IL 61738-1734  
USA

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του  
σκευάσματος

DuPont de Nemours (France) S.A.S  
Agricultural Products  
82, rue de Wittelsheim  
BP9  
F-68701 CERNAY CEDEX  
FRANCE

στ) Εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος:

Chlorsulfuron: 75%β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 21,87% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του  
σκευάσματος παρουσιάζεται στο  
Παράρτημα Ι της παρούσας, είναι  
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει  
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

**2** Συσκευασία(ες)

## 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Βάζο	50 γραμμάρια	Δοχείο πολυαιθυλεντίου (HDPE)
2	Βάζο	100 γραμμάρια	Δοχείο πολυαιθυλεντίου (HDPE)
3	Βάζο	110 γραμμάρια	Δοχείο πολυαιθυλεντίου (HDPE)

**3** Οδηγίες χρήσης:

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ψεκασμός με χαμηλή πίεση (μικρότερη από 2.5 ατμόσφαιρες) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 10-60 λίτρα νερό /στρέμμα (συνήθεις όγκοι για την Ελλάδα 20-40 λίτρα νερό /στρέμμα ) με μπεκ τύπου σκούπας με συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Μισογεμίζεται πρώτα το βυτίο με νερό και προστίθεται η απαιτούμενη ποσότητα GLEAN 75 WG. Μετά απογεμίζεται το βυτίο με συνεχή ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται την ίδια μέρα της παρασκευής του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται καλά και το νερό ρίχνεται στο ψεκαστικό.

**Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση (βλ. ειδικές προφυλάξεις).**

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το GLEAN 75 WG είναι ζιζανιοκτόνο για την προφυτρωτική και μεταφυτρωτική καταπολέμηση πλατύφυλλων και καταστολή ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και βρώμη. Απορροφάται από το φύλλωμα και την ρίζα των ζιζανίων και μετακινούμενο διασυστηματικά, αναστέλλει την ανάπτυξη της βλάστησης και της ριζοφυΐας. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά 1-2 ώρες μετά τον ψεκασμό. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της δράσης του GLEAN 75 WG γίνονται ορατά αφού περάσουν 1-3 εβδομάδες από τον ψεκασμό.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Η Ορθή Γεωργική Πρακτική παρουσιάζεται στο Παράρτημα II και είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός
-----------------	--------	--------------------	-----------------------------	------------------

		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		εφαρμογ ών ανά καλλιεργη -τική περίοδο
Χειμερινά σιτηρά (Σιτάρι σκληρό- μαλακό)	Πλατύφυλ λα & Αγρωστώδ η Ζιζάνια*	1.5 - 2.0       1.3 - 2 + 0,1% μη ιονικό επιφανειο δραστικό π.χ. Trend		10-60  Τυπικός όγκος για τις ελληνικές συνθήκες 20-40	Προφυτρωτικά: για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και καταστολή ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων  Μεταφυτρωτικά: για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων (και των ανθεκτικών στα ορμονικά ζιζανιοκτόνα MCPA και 2,4 D) καθώς και για την καταστολή των αγρωστωδών ζιζανίων (σε πρώιμες μεταφυτρωτικές εφαρμογές) από το στάδιο του 1 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι το στάδιο της επιμήκυνσης του βλαστού BBCH 11-30	1

Χειμερινά σιτηρά (Κριθάρι, Βρώμη)	Πλατύφυλλα & Αγρωστώδη Ζιζάνια*	1.5 - 2.0  1.3 - 2 + 0,1% μη ιονικό επιφανειο δραστικό π.χ. Trend		10-60  Τυπικός όγκος για τις ελληνικές συνθήκες 20-40	Μεταφυτρωτικά: για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων (και των ανθεκτικών στα ορμονικά ζιζανιοκτόνα MCPA και 2,4 D) καθώς και για την καταστολή των αγρωστωδών ζιζανίων (σε πρώιμες μεταφυτρωτικές εφαρμογές) από το στάδιο του 1 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι το στάδιο της επιμήκυνσης του βλαστού BBCH 11-30	1
--	---------------------------------------	--	--	--	---	---

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Οι μεγαλύτερες δόσεις (1.5-2 γραμ./στρ.) συνιστώνται μόνο στις πολύ όψιμες μεταφυτρωτικές εφαρμογές, όταν τα ζιζάνια είναι ήδη μεγάλα και σε εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Επίσης μεγαλύτερες δόσεις (1.5-2 γραμ./στρ.) συνιστώνται για την καλύτερη καταστολή των αγρωστωδών ζιζανίων.

- Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων δεν έχει μεγάλη σημασία για τη δράση του GLEAN 75 WG. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι πολύ μικρά και βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Χάρη στην υπολειμματική του δράση το GLEAN 75 WG απορροφάται από τη ρίζα και καταπολεμά τα όψιμα ζιζάνια που φυτρώνουν μετά τον ψεκασμό.

- Η δράση του GLEAN 75 WG δεν επηρεάζεται πολύ από τη βροχή ούτε από τον τύπο του εδάφους.

- Η μεγάλη ξηρασία και το πολύ κρύο επιβραδύνουν τη δράση του ενώ η υγρασία και ο ζεστός καιρός την επιταχύνουν.

- Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές συνιστάται η χρήση επιφανειοδραστικού 0,1% (π.χ. Trend) του ψεκαστικού όγκου.

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

1. Να χρησιμοποιείται μόνο σε αγρούς που θα ακολουθείται η αμειψισπορά: χειμερινά σιτηρά – χειμερινά σιτηρά – χειμερινά σιτηρά χωρίς τη μεσολάβηση καμιάς άλλης καλλιέργειας όπως αναφέρεται στις ειδικές προφυλάξεις.

2. Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη και εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη του 1%.

3. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας να σπέρνετε μόνο σιτάρι την ίδια χρονιά χωρίς να γίνει επανάληψη της εφαρμογής.

\*Κατάλογος καταπολεμούμενων ζιζανίων

Προφυτρωτική εφαρμογή

Ικανοποιητική αποτελεσματικότητα για τα ακόλουθα ζιζάνια: *Anagallis arvensis*, *Anthemis arvensis*, *Anthemis sp.*, *Atriplex patula*, *Capsella bursa-pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Chenopodium vulvaria*, *Fumaria officinalis*, *Galium aparine*, *Hypocoum procumbens*, *Helianthus annuus*, *Lamium amplexicaule*, *Lolium rigidum*, *Chamomilla recutita*, *Papaver argemone*, *Papaver rhoeas*, *Poa annua*, *Polygonum aviculare*, *Bilderdykia convolvulus*, *Silene sp.*, *Sinapis arvensis*, *Sisymbrium spp.*, *Sonchus oleraceus*, *Stellaria media*, *Veronica hederifolia*, *Veronica persica*, *Viola sp.* and *Viola tricolor*

Μέτρια αποτελεσματικό: *Alopecurus myosuroides* and *Phalaris sp.*.

Η αποτελεσματικότητα κατά του *Lolium multiflorum* θεωρείται χαμηλή

### **Μεταφυτρωτική εφαρμογή**

Ικανοποιητική αποτελεσματικότητα για τα ακόλουθα ζιζάνια: *Alopecurus myosuroides*, *Anagallis arvensis*, *Anthemis arvensis*, *Anthemis cotula*, *Anthemis sp.*, *Atriplex patula*, *Bifora radians*, *Capsella bursa-pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium album*, *Chrysanthemum segetum*, *Diploaxis erucoides*, *Hypocoum procumbens*, *Helianthus annuus*, *Lamium sp.*, *Buglossoides arvensis*, *Chamomilla recutita*, *Matricaria inodora*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Ranunculus arvensis*, *Raphanus raphanistrum*, *Rapistrum rugosum*, *Scandix pecten-veneris*, *Silene sp.*, *Sinapis arvensis*, *Sinapis sp.*, *Stellaria media* and *Veronica persica*

Μέτρια αποτελεσματικό: *Fumaria officinalis* και *Viola arvensis*

Η αποτελεσματικότητα κατά του *Phalaris sp.* θεωρείται χαμηλή

Το GLEAN 75 WG θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μίγμα δοχείου με 0,1% μη ιονικό επιφανειοδραστικό π.χ. Trend για την καταπολέμηση των ζιζανίων: *Galium aparine*, *Bilderdykia convolvulus* and *Veronica hederifolia*. Το GLEAN 75 WG σε μίγμα δοχείου με 0,1% μη ιονικό επιφανειοδραστικό έδειξε μέτρια αποτελεσματικότητα (αποτελεσματικότητα 75-85 %) κατά του *Lolium rigidum*.

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από σιτηρά για 3 ολοκληρωμένες καλλιεργητικές περιόδους και όχι νωρίτερα από 36 μήνες από την εφαρμογή του GLEAN 75 WG.
- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να σπαρεί μόνο σιτάρι.
- Αποφύγετε τη χρήση του σε πολύ αλκαλικά εδάφη (pH>7.9). Να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη και αμμοπηλώδη εδάφη και εδάφη με περιεκτικότητα σε οργανική ουσία μικρότερη του 1 % για την αποφυγή της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2.5 ατμόσφαιρες (40 psi).
- Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες για τις οποίες δεν συνιστάται.
- Αμέσως μετά τον ψεκασμό:
  - Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
  - Αδειάστε το ξανά.
  - Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 λίτρο οικιακή



αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και απογεμίστε με καθαρό νερό. ▪ Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως. ▪ Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό. ▪ Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα. ▪ Το ψεκαστικό να μην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί. Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετε τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.**

#### **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων.

Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει μετά από ορθή εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης του.

Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με την εναλλαγή (ή ανάμειξη) αποτελεσματικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης ή με την χρησιμοποίηση εάν είναι δυνατόν εναλλακτικών πρακτικών καταπολέμησης (π.χ. καλλιέργεια του εδάφους).

#### **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα κυκλοφορούντα ζιζανιοκτόνα αγριοβρώμης για συνδυασμένη καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Επίσης συνδυάζεται με άλλα ζιζανιοκτόνα σιτηρών, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, προσκολλητικά και λιπάσματα. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα ζιζανιοκτόνα ρίξτε πρώτα το GLEAN 75 WG στο βυτίο και μετά το άλλο ζιζανιοκτόνο. Σε περίπτωση συνδυασμού με υγρό λίπασμα ανακατεύετε το GLEAN 75 WG σε λίγο νερό και το μίγμα προστίθεται στο υγρό λίπασμα. Να μην προστίθεται προσκολλητικό στην τελευταία περίπτωση.

Επίσης το σκεύασμα συνδυάζεται με το επιφανειοδραστικό Trend.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των  
καλλιεργειών που ακολουθούν

-


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Να μην ψεκάζονται σιτηρά που έχουν ζημιωθεί σοβαρά από παγετό, νεροκρατήματα, ξηρασία, έλλειψη ιχνοστοιχείων, ασθένειες κ.λ.π.

Αν πέσει δυνατή βροχή αμέσως μετά τον ψεκασμό μπορεί να εμφανιστεί πρόσκαιρο κιτρίνισμα στα σιτηρά. Σε πολύ αλκαλικά εδάφη και σε ξηρικές συνθήκες μπορεί να παραμείνει στο έδαφος μέχρι και 3 χρόνια, συγκέντρωση σκευάσματος ικανή να ζημιώσει ευπαθείς καλλιέργειες που θα ακολουθήσουν.

**9** Σήμανση σκευάσματος:



**Xn - Επικίνδυνο**

**N-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

**10** Φράσεις R

**R40** Ύποπτο καρκινογένεσης

**R50/53:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**S2:** Μακριά από παιδιά

**S13:** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S20/21:** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε

**S23:** Μην αναπνέετε εκνεφώματα

**S36/37:** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

**S46:** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα

**S60:** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα

**S61:** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας

**Sp1:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μ

**Spe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη 5μ από γειτονικούς αγρούς

*«Οι εργάτες εάν πρέπει να εισέλθουν στον ψεκασμένο αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να φοράνε μακρύ παντελόνι και παπούτσια»*

Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα, σπίθες ή φλόγες.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε αμέσως γιατρό. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης να προκληθεί εμετός χορηγώντας 2 ποτήρια νερό ή με το δάκτυλο. (Να μην χορηγηθεί τίποτε σε αναίσθητο άτομο).

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε το με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής να μεταφερθεί ο άρρωστος στον καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν υπάρχει δυσκολία να χορηγηθεί οξυγόνο.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων (MRLs)  
Chlorsulfuron

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs	

**13.2** Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη  
διάθεση στην αγορά όταν  
πρόκειται για μετασυλλεκτικές  
χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Μη εφαρμόσιμο

**14** Συνθήκες αποθήκευσης,  
χρονική σταθερότητα του  
σκευάσματος.

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο ξηρό και κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες**

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά οφείλει να διεξάγει καθ' έτος επισκοπήσεις σε υπόγεια νερά σε 2 περιοχές της Ελλάδας, μετά από συνεννόηση με την Συντονιστική Εθνική Αρχή, όπου καλλιεργούνται ευρέως σιτηρά και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων νερών. Η ανάλυση των δειγμάτων θα γίνεται σε διαπιστευμένα κατά ISO εργαστήρια. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει έκθεση των αποτελεσμάτων το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου εκάστου έτους για τις αναλύσεις του προηγούμενου έτους. Λεπτομέρειες όσον αφορά τον αριθμό των δειγμάτων και τις περιοχές δειγματοληψίας θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την ΣΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος καλείται εντός 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας όπως υποβάλει στη ΣΕΑ σχετική πρόταση.

**B**

**Ανακαλούμε** τη με αριθ. **7349** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού

προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **GLEAN 75 WG**, η οποία χορηγήθηκε με την με αριθ. 62776/27-3-1985 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. **185910/ 7-6-2010** απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει

Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 μήνες ακόμα
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 17-6-2014).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την (ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβάλει στην Συντονιστική Εθνική Αρχή τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή την ετικέτα του σκευάσματος όπως αυτό θα διατεθεί στην αγορά
6. Εάν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας θα πρέπει να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**A.A.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**