



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13.03.2014
Αριθ. πρωτ: 1318/17712

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: syg081@minagric.gr

Προς: SIPCAM INAGRA SA
διά της SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
Ήρας 3
19400 Κορωπί Αττικής

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14175 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PHOSMET – SIPCAM INAGRA 50 WP (phosmet 50%) ως προς το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά και την ταξινόμηση και σήμανση (CLP)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (L353/31.12.2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τη με αριθμό **14175** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET – SIPCAM INAGRA 50 WP (phosmet 50%)**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθμ. 117666/30.09.2011 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»».
6. Τις από 07.02.2014 και 28.02.2014 αιτήσεις της εταιρείας **SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14175 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET – SIPCAM INAGRA 50 WP (phosmet 50%)**, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά.


Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 9, 10, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./ στρέμμα	όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: - Γκρέϊπ-φρουτ, - Πορτοκαλιά	-Μύιγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>) -Κόκκινη Ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>) -Ψευδόκοκκος (<i>Pseudococcus citri</i>)	50	100	200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: - Μηλιά, - Αχλαδιά	-Καρπόκαφα (<i>Cydia pomonella</i>) -Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Οπλοκάμπη (<i>Homolocampa brevis</i>) -Φυλλοδέτες (<i>Adoxophyes orana</i>) -Φυλλορύκτες (<i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>P. corylifoliella</i>) -Ψύλλα (<i>Psylla pyri</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis pentagona</i>) -Αιματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	120-140	120-140	100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.	2

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: - Κερασιά	-Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>) -Ανθονόμους (<i>Anthonomus ornatus</i>) -Ρυγχίτης (<i>Rhynchites bacchus</i>)	120	180-300	150-250	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
	-Βαμβακάδα (<i>Diaspis spp.</i>)	140	210-350			
- Ροδακινιά, - Νεκταρινιά	-Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i>) -Καρπόκαψα (<i>Cydia molesta</i>) - Φυλλοδέτες -Ανθονόμους (<i>Anthonomus ornatus</i>) -Ρυγχίτης (<i>Rhynchites bacchus</i>) -Βαμβακάδα (<i>Diaspis spp.</i>)	150	150	100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
Αραβόσιτος	-Σεζάμια (<i>Sesamia nonagrioides</i>), -Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	120	60-120	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
Τεύτλα	-Κλεονός (<i>Bothynoderes punctiventris</i>)	120	72-96	60-80	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2

Τριφύλλι	Κάμπιες τριφυλλιού	120	36-60	30-50	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
Παρατηρήσεις: 1. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό. 2. Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή. 3. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλαψης των αυγών.						

Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

9	Εικονογράμματα κινδύνου		ΚΙΝΔΥΝΟΣ
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.</p> <p>H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.</p> <p>H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>	
11	Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.</p> <p>P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.</p> <p>P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>SPe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 1 ημέρα μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.</p> <p>EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>	

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό, χωρίς να το καταπιείτε. Χορηγήστε 200-300 κ.εκ. πόσιμου νερού.

P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αν αναπνέει με δυσκολία, θα πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο από εκπαιδευμένο άτομο. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή μόνο εφόσον ο παθών δεν αναπνέει. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεϊϊκή ατροπίνη και 2-PAM, με επίβλεψη γιατρού.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	28
Μηλοειδή	28
Κερασιά	28
Ροδακινιά	14
Νεκταρινιά	14
Αραβόσιτος	28
Τεύτλα	28
Τριφύλλι	28

Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 01.06.2015.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 117666/29.03.2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ