



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 - 5 - 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθ. 1789/22711

πρωτ:

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Προς: **AGRIPHAR S.A.**Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Belgium

Δια μέσου του

Agriphar ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ

Λ. Νάτο, θέση Πηλιχό

Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος

E-mail: info.hellas@agriphar.comagriphar.com

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Τηλέφωνο: 210 92 87 161

e-mail: sygo36@minagric.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 7609 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) METAGRIZIN 70 WG (δ.ο. Metribuzin 70%), ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

4. Την από 20 /5 /2014 εισήγηση της Υπηρεσίας.
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»
6. Την από 18.2.2014 αίτηση της εταιρείας **AGRIPHAR S.A.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **7609** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **METAGRIZIN 70 WG**, που χορηγήθηκε με την αριθ. **90216/29-2-2000** Απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες, και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

7609
29-2-2000
30-9-2011
(σε διαδικασία αξιολόγησης)

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

METAGRIZIN 70 WG

- 1.2.β Μορφή:

WG – Βρέξιμοι κόκκοι

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO	Metribuzin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<i>Βλ. επιστολή πρόσβασης/ φάκελο από Bayer</i>
Χημική ομάδα	Τριαζινονών
Παρασκευαστής	Bayer CropScience AG, Germany
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Bayer CropScience 8400 Hawthorn Road P.O. Box 4913 Kansas City MO 64120 - USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metribuzin όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συμμόρφωσης με την Οδηγία καταχώρησης που κατατέθηκαν και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Belgium
Τηλ.: +32/4.387.97.11
Fax: +32/4.387.97.49

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Agriphar ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ
Λ. Νάτο, θέση Πηλιχό Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
E-mail: info.hellas@agriphar.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Agriphar ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ
Λ. Νάτο, θέση Πηλιχό Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
E-mail: info.hellas@agriphar.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer CropScience S.A., Γαλλία

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Chimac S.A., Βέλγιο
Rue de Renory 26/2
B-4102 Ougrée, Belgium
- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
- Chimac S.A., Βέλγιο
- **Agriphar ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ**, Ασπρόπυργος Αττικής
- **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**, Μάνδρα Αττικής
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Δραστική ουσία Metribuzin 70 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 22,2% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1789/22711 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Πλαστική σακούλα εντός χαρτοκυτίου και πλαστικά δοχεία	100	PE για τη σακούλα ή το πλαστικό δοχείο και χαρτί για το κούτιο
2	Πλαστική σακούλα εντός χαρτοκυτίου και πλαστικά δοχεία	500	PE για τη σακούλα ή το πλαστικό δοχείο και χαρτί για το κούτιο
3	Πλαστική σακούλα εντός χαρτοκυτίου και πλαστικά δοχεία	1000	PE για τη σακούλα ή το πλαστικό δοχείο και χαρτί για το κούτιο
4	Σάκος πλαστικός	3000 γραμμάρια	PE-low density

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής) ή του εδάφους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τριπλό ξέπλυμα με νερό

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (κυτία, σακούλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση της ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργη-τική περίοδο
		γραμμάρια σκευάσματος /στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα / στρέμμα		
Καρότο	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50	40-50	ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 4 φύλλων.	1

Τομάτα υπαίθρου	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	40	40-50	<p>A. Προφυτρωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπόρων</p> <p>Ή</p> <p>B. Μεταφυτρωτικά: Εφαρμογή στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων μετά από αυλάκωμα ή το σχηματισμό «τραπεζιών».</p> <p>Ή</p> <p>ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοπιάσει» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σαμάρια και στα αυλάκια η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.</p>	1
Σπαράγγια	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50-100	40-50	Πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας.	1
Σόγια	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75-100	40-50	ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ Αμέσως μετά τη σπορά.	1
Πατάτες	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	50-100	40-50	<p>A. ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή από το φύτεμα μέχρι 3-4 ημέρες πριν το φύτερωμα της καλλιέργειας.</p> <p>ή</p>	1

		50		Β. ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Εφαρμογή από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών πατάτας έως το διάστημα που τα φυτά θα αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ.	1
		50 + 50		ή Γ. ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ + ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: 1 ^η εφαρμογή λίγο πριν το φύτευμα της πατάτας και 2 ^η εφαρμογή όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 5-10 εκ.	2
Μηδική	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	75-100	40-50	Εφαρμογή το χειμώνα στην περίοδο ληθάργου της καλλιέργειας.	1

Παρατηρήσεις:


1. Οι δόσεις είναι ανάλογες με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη και οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη.
2. Η **προφυτρωτική** εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: *Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovelix*. Ειδικά για τις ποικιλίες *Colmo & Jaerla* οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρέμμα σε βαρεία ή μέσης σύστασης εδάφη και 50 γρ./στρέμμα σε ελαφριά εδάφη.
3. Η **μεταφυτρωτική** εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: *Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blance, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate*.
4. Η εφαρμογή του σκευάσματος στην ΤΟΜΑΤΑ (προφυτρωτικά - μεταφυτρωτικά) συνιστάται στις ποικιλίες: *Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7*. Στην ποικιλία *Fantastic* η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μπεκ τύπου σκούπας.
5. Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες ΣΟΓΙΑΣ πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτότητας των φυτών σε μικρή κλίμακα.

<u>Καταπολεμούμενα ζιζάνια:</u>	
Βλήτα (<i>Amaranthus</i> spp.)	Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>)
Λαψάνα (<i>Lapsana communis</i>)	Ζωχός (<i>Sonchus</i> spp.)
Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>)	Περδικούλι (<i>Parietaria</i> sp.)
Άνθεμις (<i>Anthemis arvensis</i>)	Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>)
Λάμιο (<i>Lamium</i> sp.)	Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>)
Κενταύριο (<i>Centaurea cyanus</i>)	Χαμομήλι (<i>Marticaria chamomilla</i>)
Σκαρολάχανο (<i>Mercurialis annua</i>)	Οξαλίσ (<i>Oxalis</i> sp.)
Παπαρούνα (<i>Papaver rhoeas</i>)	Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>)
Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>)	Αγριοσινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>)
Σαπουνόχορτο (<i>Vaccaria pyramidata</i>)	Αγριοραδίκι (<i>Taraxacum officinale</i>)
Τσουκνίδα (<i>Urtica</i> spp.)	Βερονίκη (<i>Veronica</i> sp.)
Πικραλίδα ή Χοιροβότανο (<i>Picris</i> sp.)	Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>)
Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-gallis</i>)
Ήρα (<i>Lolium</i> spp.)	Πόα (<i>Poa</i> sp.)
Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)	Σκυλόχορτο (<i>Pulicularia dysenterica</i>)
Ελευσίνη (<i>Eleusine indica</i>)	Αγκάθι (<i>Xanthium</i> spp.)
Σκυλάκι (<i>Antirrhinum</i> sp.)	Αγριοκαρδαμούδα (<i>Lepidlum</i> sp.)
Βραχιάρα (<i>Brachiara</i> sp.)	Κομελίνα (<i>Commelina</i> sp.)
<u>Ανθεκτικά ζιζάνια:</u>	
Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.)	
Κίρσιο (<i>Cirsium arvense</i>)	
Μεγάλη κολλητσίδα (<i>Gallium aparine</i>)	
Μολόχα (<i>Malva</i> spp.)	
Στύφνος ή αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i>)	

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	Κατά τους θερινούς μήνες αποφεύγετε να ψεκάσετε τις ζεστές ώρες της ημέρας.
--	---

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	<input type="text"/>
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	<input type="text"/>

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται.
9	Εικονογράμματα κινδύνου	 <p>GHS07 GHS09 ΚΙΝΔΥΝΟΣ</p>
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
11	Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P330</p> <p>SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).</p> <p>EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
12	Πρώτες βοήθειες -	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά

Αντίδοτο	<p>με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p><u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Εάν υπάρξει ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.</p> <p><u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.</p> <p><u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Μην προκαλέστε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του). Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν.</p> <p>P301+312</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία και συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>
----------	--

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες	60

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ