



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13.12.2012
Αριθ. πρωτ: 12839/126735

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκούλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: syg081@minagric.gr

Προς: Dow AgroSciences SAS Γαλλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Μεσογειών 449,
153 43 Αγία Παρασκευή)
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7779 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GOAL 48 SC (oxyfluorfen) ως προς τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το είδος και το μέγεθος συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ημερομηνία λήξης της άδειας»

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με **7779** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **GOAL 48 SC**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 118542/30.05.2006 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 798/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών oxyfluorfen.
6. Την από 27.12.2011 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7779** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **GOAL 48 SC** που χορηγήθηκε με την αριθ. **118542/30.05.2006** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τον παρασκευαστή της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το είδος και το μέγεθος συσκευασίας, τον τρόπο εφαρμογής και την ημερομηνία λήξης της άδειας.

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7779 30.05.2006 31.12.2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

GOAL 48 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Oxyfluorfen
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97% (β/β) min.
Χημική ομάδα	Διφαινυλαιθέρες
Παρασκευαστής	Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville rd., Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Rohm & Haas Company 5000 Richmond Street, Philadelphhis, PA 19137, ΗΠΑ Tel: +(001) 989-636-3179 Facsimile: +(001) 989-638-6619 Shangyu Nutrichem Co. Ltd No.9 Weijiu Rd Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone, Zhejiang 312369 Κίνα Tel.: +(001) 989-636-3179
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας oxyfluorfen όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 28.11.2012 (Αρ . Πρ. ΥπΑΑΤ 12095/119081) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Dow AgroSciences Ltd,
 UK 3 Milton Park,
 Abingdon, Oxon,
 OX1144RN
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Τηλ: +44 1235 772900 Facsimile: +44 1235 774749

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
 BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
 ΑΜΕ6:
 Τηλ.: 210-6860100
 Fax: 210-6860200
 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
 ΑΜΕ6:
 Τηλ.: 210-6860100
 Fax: 210-6860200
 E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences LLC,
 9330 Zionsville rd.,
 Indianapolis, IN, 46268,
 ΗΠΑ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Dow AgroSciences SAS,**
 BP 20, Zone Industrielle,
 67410 Drusenheim,
 Γαλλία
 E-mail: PBaum@Dow.com
 Tel.: +33 388535682

2. **Diachem S.p.A, S.S.**
 11 Padana Superiore Km. 185,
 24043 Caravaggio (BG)
 Ιταλία (toll manufacturer)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) **Dow AgroSciences SAS**,
BP 20, Zone Industrielle,
67410 Drusenheim,
Γαλλία
E-mail: PBaum@Dow.com
Tel.: +33 388535682

2) **Diachem S.p.A, S.S.**
11 Padana Superiore Km. 185,
24043 Caravaggio (BG)
Ιταλία (toll manufacturer)

3) **K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**,
ΒΙ.Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Oxyfluorfen 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 58,4 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί με την αίτηση μας με ημερομηνία 28.11.2012 με αρ. πρωτ. 12095/119081.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	100, 125, 200, 250, 500 κ.εκ., 1 λίτρο	Polyamide/HDPE ή PET
2.	Δοχεία	2, 3 και 5 λίτρα	Polyamide/HDPE ή PET

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός του εδάφους με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μικρότερη από δύο (2) atm. Ψεκασμός σε λωρίδες κοντά στο έδαφος από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση του. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά τα $\frac{3}{4}$ με νερό και προσθέστε τη δόση που χρειάζεται. Ξεπλύντε πολλές φορές τα κενά δοχεία και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστικό εξοπλισμό & ξεπλύνετε το εσωτερικό του με καθαρό νερό. Αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει στο σύστημα για 10 λεπτά τουλάχιστον και έπειτα ψεκάστε τα νερά του ξεπλύματος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊφ φρουτ, Κίτρο)	Για ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια ⁽¹⁾ <u>Αγρωστώδη ζιζάνια:</u> <i>Αγριάδα</i>	250		60	Προφυτρωτικά	1
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	<i>(Cynodon dactylon), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis),</i>	250		60	Προφυτρωτικά	1
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκκιά, Δαμασκηλιά, Νεκταρινιά, Κορομηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά)	<i>Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense), Ήρα (Lolium spp.), Κόπερη (Cyperus spp.), Μουχρίτσα</i>	250		60	Προφυτρωτικά	1
Αμπέλι ⁽²⁾ (Σταφίδες, Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια)	<i>(Echinochloa crus galli), Σετάρια (Setaria spp.).</i>	250		60	Προφυτρωτικά	1
Ελιά	<u>Πλατύφυλλα ζιζάνια:</u>	250		60	Προφυτρωτικά	1
Μελιτζάνα	<i>Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti), Αγριομελιτζάνα (Xanthium</i>	125-150		60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση	1
Κρεμμύδι ⁽⁵⁾	<i>pensylvanicum), Αγριοτομάτα (Solanum nigrum), Αντράκλα (Portulaca oleracea), Βερόνικα (Veronica spp.), Βλήτο (Amaranthus retroflexus), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Ελευσίνη (Eleusine indica), Ζωχός (Sonchus oleracea), Λουβουδιά (Chenopodium album),</i>	75		60	Μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια στο στάδιο των 3-4 φύλλων (στο κρεμμύδι από σπόρο) ή εντός 2 ημερών από τη φύτευση (στο κρεμμύδι από κοκκάρι).	1
Κουνουπίδι, Λάχανο	<i>Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Μικρή τσουκνίδα (Urtica</i>	125-150		60	Πριν τη μεταφύτευση και ακολουθεί κατάκλιση	1
Αγγινάρα		150		60	Προ της βλάστησης του ξηρόφυτου	1

Ηλιάνθος ⁽⁴⁾	<i>urens</i>), <i>Οξάλις (Oxalis pescaprae)</i> , <i>Ραπανίδα (Raphanus spp.)</i> ,	50		60	Μετά τη σπορά και πριν το φύτευμα της καλλιέργειας.	1
Βαμβάκι	<i>Στελλάρια (Stellaria spp.)</i> , <i>Τάτουλας (Datura stramonium)</i> , <i>Τριβόλι (Tribulus terrestris)</i> , <i>Φυσαλίδα (Physalis spp.)</i> .	50-150		60	Πριν το φύτευμα της καλλιέργειας.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. Τα ζιζάνια *Calendula arvensis* (Καλέντουλα) και *Rumex spp* (Λάπαθα) είναι ανθεκτικά στο GOAL.
2. Το αμπέλι πρέπει να είναι ηλικίας πάνω από 3 χρόνια και να είναι υποστηλωμένο ή αναρριχώμενο, γιατί αν είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας.
3. Στον ηλιάνθο δόση μεγαλύτερη από 60 κ.εκ./στρέμμα, δρα φυτοτοξικά.
4. Στο κρεμμύδι: να χρησιμοποιείται μόνο στο κρεμμύδι που προορίζεται για παραγωγή ξηρών βολβών. Να μην εφαρμόζεται με κρύο και υγρό καιρό.
5. Η εφαρμογή του να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
6. Να μη γίνεται δεύτερη εφαρμογή τον ίδιο χρόνο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
Αν ρυπανθούν τα νερά αρδεύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν δέκα (10) μήνες από την εφαρμογή του.

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις καλλιέργειες που δεν συνιστάται μπορεί να προκαλέσουν φυτοτοξικότητα ακόμα και τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλιάνθο προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν γίνει υπέρβαση της δόσης. Στο κρεμμύδι συνήθως παρατηρείται και νέκρωση των άκρων των φύλλων, που όμως δεν έχει επιπτώσεις στην παραγωγή, γιατί είναι παροδική. Η φυτοτοξικότητα αυτή είναι πιο έντονη όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός.

9

Σήμανση σκευάσματος:

N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10	Φράσεις R	R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
-----------	-----------	--

11	Φράσεις S	<p>S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p>S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.</p> <p>S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.</p> <p>S35 Το υλικό και ο περιέκτης του θα πρέπει να διατεθεί με ασφλή τρόπο</p> <p>S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.</p> <p>Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. <i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i></p>
-----------	-----------	--

12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Ζητείστε τη συμβουλή γιατρού.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν εμφανισθεί ερεθισμός ζητείστε την συμβουλή οφθαλμίατρου.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.</p> <p>ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777</p>
-----------	----------------------------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά προϊόντα	MRL's σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.		

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Κρεμμύδι	60 ημέρες
	Λοιπές καλλιέργειες	21 ημέρες

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος	Στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
-----------	---	---

15 **A. Ανάκληση της άδειας-παράταση της άδειας**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η άδεια θα ανακληθεί στις **31.12.2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της άδειας αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

B **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ