



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26.05.2014  
Αριθ. πρωτ: 4168/42180

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 254  
e-mail: [syg081@minagric.gr](mailto:syg081@minagric.gr)

Προς: Quena Plant Protection, N.V.  
Pos Cabai Office Park, Unit 13,  
P.O. Box 403, Curacao  
Διά της αντιπροσώπου εταιρείας  
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

**ΘΕΜΑ:** “Τροποποίηση της με αριθ. 70079 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GOLTIX 70 SC (δ.ο. metamitron) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), του χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας και της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν καθώς και της τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά”

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και και ειδικότερα τα άρθρα 43 και 80 παρ. 5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β' /2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
4. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία metamitron.

7. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαίωματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»».
8. Την από 31.03.2014 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
9. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 70079 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GOLTIX 70 SC 2,5 SC (δ.ο. metamidron), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 4685/47174/09.04.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), του χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας και της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν καθώς και της τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά:

Συγκεκριμένα τα σημεία 5 (Φάσμα δράσης), 7 (Χρονικά διαστήματα ασφαλείας) και 13 (Προστασία των καταναλωτών) διαμορφώνονται ως εξής:

#### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα  Χρήση ήσσονος σημασίας Παντζάρι	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (4)	<b>200 -400</b>  <b>50-200</b>  (3)	35-40	<b>α. Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά:</b> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους (1) και <b>Μεταφυτρωτικά:</b> Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. (2)	<b>1</b>  <b>1 - 3</b>
	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (4)	<b>100</b>	20-50	<b>β. Μεταφυτρωτικά:</b> Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. (2)	<b>3</b>
	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (5)	<b>(200-250) + (120-150)</b> <b>ETHOFUMESAT E ΑΛΦΑ 50 SC ή ETHOSAT 50 SC</b>	30	<b>γ. Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά:</b> Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους	<b>1</b>
	Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (6)	<b>(62.5-100) + (37.4-60)</b> <b>ETHOFUMESA TE ΑΛΦΑ 50 SC ή ETHOSAT 50 SC</b>	25	<b>δ. Μεταφυτρωτικά:</b> Ψεκασμός μετά το φύτευμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα.	<b>3</b>

**Παρατηρήσεις:**

1. Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή ή τεχνητή βροχή.
2. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη προφυτρωτική σε βαρεία εδάφη. Ο ψεκάσμος γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκάσμος προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο GOLTIX και από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκάσμος με άλλα ζιζανιοκτόνα.
3. Η συνολική ποσότητα σκευάσματος / καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ.

**4. Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Προφυτρωτική + μεταφυτρωτικές εφαρμογές****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Λουβουδιά	( <i>Chenopodium album</i> )
Τάτουλας	( <i>Datura stramonium</i> )

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αγριομελιτζάνα	( <i>Xanthium strumarium</i> )
Πολυκόμπι	( <i>Polygonum aviculare</i> )

**Μεταφυτρωτικές εφαρμογές****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αγριοτοματιά	( <i>Solanum nigrum</i> )
Βλήτα	( <i>Amaranthus retroflexus</i> )
Ηλιοτρόπιο	( <i>Heliotropium eurypetium</i> )
Λουβουδιά	( <i>Chenopodium album</i> )
Τάτουλας	( <i>Datura stramonium</i> )

**5. Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Λουβουδιά	( <i>Chenopodium album</i> )
Ζωχός	( <i>Sonchus oleraceus</i> )

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Τσουκνίδα ( <i>Urtica urens</i> )
Πικρίς ( <i>Picris echioides</i> )
Καπνόχορτο ( <i>Fumaria officinalis</i> )

**6. Καταπολεμούμενα ζιζάνια****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Βλήτα	( <i>Amaranthus retroflexus</i> )
Αγριοτοματιά	( <i>Solanum nigrum</i> )

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:**

Λουβουδιά	( <i>Chenopodium album</i> )
-----------	------------------------------

7. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια ή σσονος σημασίας Παντζάρι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ή σσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρθούν, εκτός από Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα, αρακάς, κουκιά, πατάτες καθώς και αραβόσιτος αφού προηγηθεί άροση (15-20 εκ.). Σε περίπτωση συνδυασμού με **ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC** ή **ETHOSAT 50 SC** να τηρούνται επίσης και οι σχετικοί περιορισμοί που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις παραπάνω, πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος 15 – 20 εκ. Σε περίπτωση συνδυασμού με **ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC** ή **ETHOSAT 50 SC** να τηρούνται επίσης και οι σχετικοί περιορισμοί που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Για τις όλες τις καλλιέργειες, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

- 13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα <b>Παντζάρι</b>	<i>Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος</i>

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 4658/47174/09.04.2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

α/α

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**