



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 27 – 08 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 9582/106948**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) AGIL 10 EC (δραστική ουσία: propraquizafor)  
2. Ανάκληση της με αριθ. 7537 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 43 και 80 παρ. 5 αυτού.
2. Τον νόμο 4036/2012 (Α' 8) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1i) με τον οποίο η Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται ως Εθνική Συντονιστική Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1107/2009.
3. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008.
8. Τη με αριθ. 2009/37/ΕΕ οδηγία με την οποία η δραστική ουσία propaquizafop καταχωρίστηκε στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.
9. Τη με αριθ. 7537 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) AGIL 10 EC, η οποία χορηγήθηκε με τη με την με αριθ. 90257/29.2.2000 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6134/63481/31.5.12 σχετική αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
12. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) AGIL 10 EC . (δραστική ουσία: propaquizafop). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70.095</b>
<b>27-08-2014</b>
<b>30.11.2020</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>AGIL 10 EC</b>
<b>Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)</b>

## 1.3 Δραστική ουσία

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Propaquizafop</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>92 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	<b>Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα</b>
Παρασκευαστής της δ.ο.	<b>ADAMA QUENA N.V.,</b> Pos Cabai Office Park, Unit 13, POB 403, Curacao Dr. Gali Nisenboim TeleFax: +972-73-232 1200 E-mail: <a href="mailto:Gali.Nisenboim@adama.com">Gali.Nisenboim@adama.com</a>  European address <b>ADAMA Agricultural Solutions Ltd</b> c/o <b>ADAMA Deutschland GmbH</b> Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Germany Dr. Wolfgang Busch Τηλ. +49 2203 5039-501 E-mail: <a href="mailto:Wolfgang.Busch@de.adama.com">Wolfgang.Busch@de.adama.com</a>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): <b>ADAMA AGAN LTD</b> Northern Industrial Zone, Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ Dr. Geula Dagan Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325 E-mail: <a href="mailto:Geula.Dagan@adama.com">Geula.Dagan@adama.com</a>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το αριθ. πρωτ. 134262/19-11-2009 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
Τηλ.: 211 120 5570, Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ADAMA QUENA N.V.,**  
Pos Cabai Office Park, Unit 13,  
POB 403, Curacao  
Dr. Gali Nisenboim  
TeleFax: +972-73-232 1200  
E-mail: [Gali.Nisenboim@adama.com](mailto:Gali.Nisenboim@adama.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**ADAMA AGAN LTD**  
Northern Industrial Zone,  
Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ  
Dr. Geula Dagan  
Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325  
E-mail: [Geula.Dagan@adama.com](mailto:Geula.Dagan@adama.com)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**1. ADAMA AGAN LTD**  
Northern Industrial Zone,  
Ταχ. Δ/ση: P.O.B. 262, 77 102 - Ashdod, Ισραήλ  
Dr. Geula Dagan  
Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325  
E-mail: [Geula.Dagan@adama.com](mailto:Geula.Dagan@adama.com)  
**2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία  
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία  
Τηλ. 22620-30821-3, Φαξ. 22620-30820  
e-mail: [nikos.kosmidis@alfagro.gr](mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Propaquizafop 10% (β/ο)  
Βοηθητικές ουσίες 89,5% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	75 κ.εκ. έως 1 λίτρο	Πλαστικό multilayer τύπου COEX (PE/PA) ή (HDPE/EVOH)
2.	Δοχεία	2 έως 20 λίτρα.	Πλαστικό multilayer τύπου COEX (PE/PA) ή (HDPE/EVOH)
3.	Βαρέλι	200 λίτρων	Μεταλλικά βαρέλια με εξωτερική επένδυση alkyl melamine ή polyester και εσωτερική επένδυση epoxy phenolic lacquer

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-60 λίτρα νερό το στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας . Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm)

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα  $\frac{3}{4}$  με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:**

Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Goltix 700 SC, Ethosat 50 SC, Ethofumesate Αλφα 50 SC, Pendigan 40 WG και Belvedere Extra SE.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το propraquizafor απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα.

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
<b>Εσπεριδοειδή</b> (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά /Κλημεντίνες, Tangerine Γκρέιπ φρουτ, Φράπες, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Κιτριά Κουμκουάτ)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια *	α) 75-120	20-60	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) <u>Για ετήσια ζιζάνια</u> : από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων β) <u>Για πολυετή ζιζάνια</u> : όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) <u>Για το βέλιουρα</u> (Sorghum halepense): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.	1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
		β) 150-200			
		γ) 100-150			
<b>Ακρόδρυα</b> (Αμυγδαλιά, Καστανιά,	>>	>>	>>	>>	1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)

Φιστικιά Καρυδιά, Φουντουκιά, Κουκουναριά)					
Μηλιά, Αχλαδιά	>>	>>	>>	>>	1
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	>>	>>	>>	>>	1
Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά	>>	>>	>>	>>	1 (πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Αμπέλι	>>	>>	>>	>>	1
Καρότο Ρίζα μαϊντανού	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1
Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Τομάτα, Μελιτζάνα	>>	>>	>>	>>	1
Μπρόκολο	>>	>>	>>	>>	1
Σπανάκι	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1
Μάραθος	>>	α) 75-120 β) 125 γ) 100-125	>>	>>	1
Σπαράγγι	>>	α) 75-120 β) 120 γ) 100-120	>>	>>	1
Φασολάκια, Αρακάς (φρέσκα)	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Αρακάς Ρεβίθια Φακές Φασόλια Λούπινα Κουκιά	>>	α) 75-120 β) 150 -200 γ) 100-150	>>	>>	1
Ελαιοκράμβη Βαμβάκι Λινάρι	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1

Ηλιάνθος Σόγια	>>	75-120	>>	>>	1
Πατάτα	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1
Ζαχαρότευτλα	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Μηδική Τριφύλλι Βίκος	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1
Καπνός	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Καλλωπιστικά φυτά Φυτόρια Δασικά δένδρα	>>	α) 75-120 β) 150-200 γ) 100-150	>>	>>	1
Ρύζι	Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια	75-120	>>	Η εφαρμογή γίνεται πριν τη σπορά της καλλιέργειας και μεταφυτρωτικά των ζιζανίων (ως ανωτέρω) σε αποστραγγισμένο έδαφος	1

**Παρατηρήσεις:**

- Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια.
- Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.

**\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά), Avena fatua & A. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή), Bromus spp. (Βρόμοι), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli & E. colonum (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα), Eleusine indica (Ελευσίνη), Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο), Lolium spp. (Ήρες), Phalaris spp. (Φαλαρίδες), Panicum spp. (Πάνικο), Setaria spp. (Σετάριας), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο), Triticum spp. (Σιτάρια)

Πολυετή ζιζάνια:

Agropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος), Agrostis spp (Αγρωστης), Cyperus rotundus (κύπερη πορφυρή), Cynodon dactylon (Αγριάδα), Paspalum spp. (Πάσπαλο), Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα), Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα).

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας**

Οι χρήσεις του πίνακα που ακολουθεί θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Λάχανο Κουνουπίδι	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη	α) 75-120 β) 150 -200	20-60	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. α) <u>Για ετήσια ζιζάνια:</u> από το στάδιο των 2-3 φύλλων έως	1
----------------------	------------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---

	ζιζάνια *	γ) 100-150		την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους των ζιζανίων β) Για πολυετή ζιζάνια: όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 15-20 εκ. γ) Για το βέλιουρα (Sorghum halepense): όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 30-40 εκ.	
Μαρούλι και λοιπά σαλατικά Ραδίκι Μαϊντανός (φύλλα)	>>	α) 75-120 β) 150 γ) 100-150	>>	>>	1

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:  
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας  
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.  
Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος  
Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό .

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

**9** Σήμανση σκευάσματος:



**GHS08**  
**GHS09**

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Περιέχει αρωματικό διαλυτή νάφθα και 1,2-propanediol carbonate



**10****ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**

**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  
**H351** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου  
**H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
**EUH066** παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  
**EUH208** Περιέχει Propaquizafop, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**11****ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

**P405 +P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την εφαρμογή»  
**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα  
**SPe3** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.  
**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12****Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο**

**P305+ P351+ P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**P301 + P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**P331** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
**P304 + P340** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό .  
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13****Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Για τις καλλιέργειες Λάχανο, Κουνουπίδι, Μαρούλι κ.α σαλατικά/ραδίκι, μαϊντανός (φύλλα) θα πρέπει καθοριστούν νέα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Ακρόδρυα	Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Μηλοειδή	30
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	30
Δαμασκηινιά, Κερασιά, Βερικοκιά	Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας)
Αμπέλι	30
Καρότο, Ρίζα μαϊντανού	30
Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια	30
Τομάτα, Μελιτζάνα	30
Μπρόκολο	30
Σπανάκι	30
Μάραθος	30
Φασολάκια, Αρακάς (φρέσκα)	40
Φακές, Αρακάς, Ρεβίθια, Φασόλια, Λούπινα, Κουκιά	50
Σπαράγγι	30
Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Ηλίανθος, Σόγια, Λινάρι	90
Πατάτα	40
Ζαχαρότευτλα	45
Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος	45
Καπνός	40
Ρύζι	Δ.Ε.

Οι παρακάτω τελευταίες επεμβάσεις πριν τη συγκομιδή θα συμπληρωθούν όταν και εάν χορηγηθούν οι χρήσεις στις καλλιέργειες

Λάχανο, Κουνουπίδι	30
Μαρούλι κ.α. σαλατικά, Ραδίκι, Μαϊντανός (φύλλα)	30

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

## **17** Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει μέχρι 27/08/2017 να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Μελέτη για την σταθερότητα στην αποθήκευση σε κανονικές συνθήκες (Shelf-life study of the product at ambient temperature for at least 2 years.)
2. Μελέτη για την εκρηκτικότητα, οξειδωτικές ιδιότητες και αυτοανάφλεξη (Studies concerning the explosive, oxidising properties and autoflammability).
3. Μελέτη δοκιμής σταθερότητας κατά την αποθήκευση σε φιάλες PE/PA (Accelerated storage stability study using PE/PA packaging material).
4. Μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας καθαρισμού (Assessment of the effectiveness of cleaning procedures with the formulated product Propaquizafop 100 g/L EC).
5. An ILV to method IIIA 5.3.1/01, Krainz, A. (2010).
6. Πλήρως επικυρωμένη μέθοδος ανάλυσης (συμπεριλαμβανομένης της ΔΙΕ/ΙΛV) σύμφωνα με την SANCO /825/00 rev. 8.1 για τον προσδιορισμό της δ.ο. propaquizafop σε υψηλής οξύ προϊόντα (A fully validated analytical method (including ILV) according to SANCO /825/00 rev. 8.1 for the determination of propaquizafop in high acid commodities).
7. Πλήρως επικυρωμένη μέθοδος ανάλυσης (συμπεριλαμβανομένης της ΔΙΕ/ΙΛV) για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με την SANCO/825/00 rev. 8.1 (A fully validated residue analytical method (including ILV), for products of animal origin, according to SANCO/825/00 rev. 8.1).
8. Μελέτη για την σταθερότητα κατά την αποθήκευση της δ.ο. propaquizafop και του μεταβολίτη της στα σταφύλια (Storage stability of propaquizafop and its metabolite in grapes during frozen storage).
9. Μελέτη για την σταθερότητα κατά την αποθήκευση της δ.ο. propaquizafop και του μεταβολίτη της στα όσπρια (Storage stability of propaquizafop and its metabolite in dry pulses during frozen storage).

## **B.** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανον. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Γ.** **Ανακαλούμε** τη με αριθ. 7537 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) AGIL 10 EC, η οποία χορηγήθηκε με τη με την με αριθ. 90257/29.2.2000 απόφαση μας.

Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα

- χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
  4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την (ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
  5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**