



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16 - 9 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 10072/112140

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Προς: Indofil Industries Limited  
Via Filippo Turati 6,  
T.K.: 20121 Milan, Ιταλία

(Δια της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος  
& Σια ΕΕ  
Τσιτούρη 22, 15231 Χαλάνδρι)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
60.425 οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά του  
φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (μυκητοκτόνο)  
AGRIZEB 72 WP (δ.ο.  
mancozeb) ως προς το  
εμπορικό όνομα του  
σκευάσματος»

Κοιν.: Εσωτερική διανομή:  
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας  
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αρ. πρωτ. 8458/92953/19-8-2014 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60.425 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) AGRIZEB 72 WP (δ.ο. mancozeb) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»»

5. Τη με αριθ. Πρωτ. 10072/112140/9-9-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60.425 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AGRIZEB 72 WP (δ.ο. mancozeb), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 8458/92953/19-8-2014 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς το εμπορικό όνομα.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.2<sup>α</sup>, 5.1 και 6 διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

AGRIZEB BLUE 72 WP

#### 5

#### 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Γραμ / στρέμμα	Γραμ./ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	220	220	50 – 100	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση BBCH 11-79	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτα, Υπαίθρου	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> )	220	220	50 – 100	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου και έπειτα. Συνιστάται να γίνεται καλό λούσιμο του φυλλώματος. Μεσοδιάστημα ψεκασμών ανάλογα με την πίεση της	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

					προσβολής. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. BBCH 14-87	
Πατάτα	Περονόσπορος (Phytophthora infestans)	220	--	50 – 100	Εφαρμογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7-10 ημέρες. BBCH 14-49	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7- 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Ζαχαρότευτλα	Κερκόσπορα (Cercospora beticola)	220 – 275	--	40	Προληπτικές Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Μεσοδιάστημα ψεκασμών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την πίεση της προσβολής BBCH 39 - 49	Μέχρι 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 – 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

**Παρατηρήσεις:**

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.
3. Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του AGRIZEB BLUE 72 WP.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

:  
Το AGRIZEB BLUE 72 WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.  
Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται μαζί με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 8458/92953/19-8-2014 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**