



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17 - 11 - 2014
Αριθ. πρωτ: 12827/144583

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 72 25
e-mail: syg058@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΩΡΟΥ 18-20
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της προσωρινής
έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) **MOVENTO 150 OD** ως
προς τις συσκευασίες, το φάσμα
δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση,
καθώς και τις πρώτες βοήθειες”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.
4. Τον Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Την με αρ.πρωτ. **4979/53984/30-4-2013** (ΑΔΑ: ΒΕΝΕΒ-ΘΓ7) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **14430** προσωρινή έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MOVENTO 150 OD** (δ.ο spirotetramat).
6. Το με αριθ. ΕΜΠ 1107/22.11.2012 από 09.04.2014(Επανάληψη στο Ορθό) έγγραφο της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης (ΜΦΙ), περί του βιολογικού ελέγχου του εντομοκτόνου **MOVENTO 150 OD**.
7. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».

8. Την 4206/42290/31.03.2014 αίτηση της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η με αριθμ. **14430** προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MOVENTO 150 OD** (δ.ο spirotetramat) της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.**, τροποποιείται ως προς τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση, καθώς και τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα τα σημεία 2, 5, 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

2

Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	20 κ.εκ.	HDPE, COEX/E-VAL, COEX/PA
2	Φιάλη	50 κ.εκ.	
3	Φιάλη	100 κ.εκ.	
4	Φιάλη	130 κ. εκ.	
5	Φιάλη	150 κ.εκ.	
6	Φιάλη	200 κ.εκ.	
7	Φιάλη	250 κ.εκ.	
8	Φιάλη	300 κ.εκ.	
9	Φιάλη	400 κ.εκ.	
10	Φιάλη	500 κ.εκ.	
11	Φιάλη	1 λίτρο	
12	Φιάλη	2 λίτρα	

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (max)		
Αμπέλι	Ψευδόκοκκος (Planococcus ficus)	-	50-100	50	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης. 1^η εφαρμογή όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού 2^η εφαρμογή όταν αρχίσει να «κλείνει» το τσαμπί	2/14-21
	Aphis spp.	-		40-50	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	
Αχλαδιά	Ψύλλα Αχλαδιάς (Cacopsila piri) Ψώρα Σαν Ζοζέ ¹ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	100* <i>*με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα</i>	50-150	100-144	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης. Ψύλλα: Εφαρμογές όταν το 50% των αυγών είναι κίτρινα και το υπόλοιπο 50% λευκά. Ψώρα Σαν Ζοζέ: Εφαρμογές στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	2/14-21
	Ρόδινη αφίδα της μηλιάς (<i>Dysaphis plantaginea</i>), Πράσινη αφίδα της μηλιάς (Aphis pomi)	60* <i>*με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα</i>			50-150	

Μηλιά	Ψώρα Σαν Ζοζέ ¹ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), Lepidosaphes sp., Ματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	100* *με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα	50-150	100-144	Ψώρα Σαν Ζοζέ: Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές) Ματόψειρα: Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση της προσβολής. Συστήνεται να γίνεται πολύ καλή διαβροχή.	2/14-21
	Ρόδινη αφίδα της μηλιάς (<i>Dysaphis plantaginea</i>), Πράσινη αφίδα της μηλιάς (<i>Aphis pomi</i>)	60* *με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα	50-150	60-90	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Δαμασκηινιά	Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (<i>Myzus persicae</i>)	60* *με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα	50-150	60-90	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	2/14-21
	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), Βαμβακάδα της ροδακινιάς (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>)	100* *με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα	50-150	100-144	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	
Κερασιά	Μαύρη Αφίδα της Κερασιάς (<i>Myzus cerasi</i>)	60* *με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα	50-150	60-90	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	2/14-21

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ φρουτ	Κοκκοειδή (<i>Aonidiella</i> sp. <i>Planococcus</i> sp, <i>Aspidiotus</i> sp, <i>Ceroplastes</i> sp. <i>Parlatoria</i> sp. <i>Saissetia</i> sp. <i>Lepidosaphes</i> sp.)	20-60-	100-300	-	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	2 /21
Ελιά*	Κοκκοειδή (<i>Parlatoria</i> sp. <i>Lepidosaphes</i> sp. <i>Saissetia</i> sp.)	50	100	-	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	2 /21
Τομάτα (Υ) Αγγούρι (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	-	100	50	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
Μελιτζάνα (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	-	100	50	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 /14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>)					
Πεπόνι Καρπούζι (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	-	50-75	40	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>)	-		50		

Κολοκύθι (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	-		40	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>)	-	50-75	50		
Τομάτα (Θ)	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>)	65	75-150	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)					
Πιπεριά (Θ) Μελιτζάνα (Θ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	50	100	50	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>)					
Αγγούρι (Θ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	65	75-150	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i>)					

Πεπόνι Καρπούζι (Θ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	50	50-75	40	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	65		50		
Κολοκύθι (Θ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	50	50-75	40	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	65		50		
Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών	Αφίδες (<i>Brevicoryne brassicae</i> <i>Aphis spp.</i>)	-	25-100	50	65	2/14

Παρατηρήσεις:


*Η χρήση στην καλλιέργεια Ελιά, θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον Κανονισμό 396/2005 EU-MRLs σύμφωνα με την Ορθή Γεωργική Πρακτική (ΟΓΠ). Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αρμόδια Αρχή (ΑΑ).

¹ Στη μηλιά και την αχλαδιά να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση για την καταπολέμηση του *Quadraspidiotus perniciosus*.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

9 Εικονογράμματα
Κινδύνου

Προειδοποιητική
λέξη



10 Δηλώσεις
Επικινδυνότητας

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H361 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.
P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

SP 1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. «Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο».

SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες της Ελιάς και των Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρουτ).

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες της Ελιάς και των Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-Φρουτ) και **5 μέτρων** μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών (Μηλιά, Αχλαδιά) και των Πυρηνόκαρπων (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά).

SPe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Πρώτες Βοήθειες****Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:**

Γενικά: Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου και τοποθετείστε τον σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα βρεγμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

P333+313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν ο ερεθισμός αναπτυχθεί και επιμένει, καλέστε αμέσως γιατρό.

P305 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

«Δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα».

Πληροφορίες για το γιατρό:

Θεραπεία: πρώτες βοήθειες, απομόλυνση, συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ