



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25.11.2014  
Αριθ. πρωτ: 13191/149261

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 254  
e-mail: [syg081@minagric.gr](mailto:syg081@minagric.gr)

Προς: SAPEC Agro S.A.  
Alameda dos Oceanos Lote 1.06.1.1 - 3º A  
Parque das Nações 1990-207 Lisboa  
Πορτογαλία  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.)  
E-mail: [aconsult@otenet.gr](mailto:aconsult@otenet.gr)

**ΘΕΜΑ:** “Τροποποίηση της με αριθμ. 70078 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **PODIUM (pendimethalin 33%)** ως προς το φάσμα δράσης, τα χρονικά διαστήματα ασφαλείας και τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους”

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την άδεια διάθεσης στην αγορά της Πορτογαλίας με αριθ. 0330.
4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαίωματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **70078** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**ζιζανιοκτόνο**) **PODIUM (pendimethalin 33%)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 782/10486/09.04.2014 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το φάσμα δράσης, τα χρονικά διαστήματα ασφαλείας

και τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

**Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 7 και 8 διαμορφώνεται ως εξής:**

5	5.1 Φάσμα δράσης	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.	
		γρ. σκεκ./στρ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ			
	Φράουλα	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	α) Πριν τη μεταφύτευση της καλλιέργειας β) προς το τέλος του λήθαργου σε εγκατεστημένη φυτεία με κατευθυνόμενη εφαρμογή μεταξύ των γραμμών	1
	Καρότο	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
	Κρεμμύδι	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	300 – 500	20 – 60	Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας  Πριν ή μετά τη μεταφύτευση	1
	Σκόρδο	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου)	1
	Τομάτα Υπαίθρου	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Πριν ή μετά τη μεταφύτευση	1
	Πυτεριά Υπαίθρου	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Πριν τη μεταφύτευση	1
	Λάχανο	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Πριν τη μεταφύτευση	1
	Ψυχανθή: Φασολάκια, Αρακάς Μπιζέλι	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
	Φασόλια, Ρεβίθια, (όσπρια)	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
	Ηλίανθος	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
	Πατάτα	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
	Καπνός	Ετήσια, αγρωστώδη	400 – 600	20 – 60	Πριν τη μεταφύτευση	1

	και πλατύφυλλα ζιζάνια				
Αραβόσιτος	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας	1
Βαμβάκι	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400 – 600	20 – 60	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας	1

**Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*).

**Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:****Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Πλαγιαστό Βλήτο (*Amaranthus blitoides*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Κοινό ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum*), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*) Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*), Λαπάτσα (*Polygonum lapathifolium*), Τσουκνίδα (*Urtica urens*), Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*).

**Μετρίως ευαίσθητα:**

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Σετάρια (*Setaria* spp.), Στύφνος (*Solanum nigrum*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*).

**Παρατηρήσεις:**

1. Η δράση του PODIUM 33 EC στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

2. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και σε μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή χαμηλών θερμοκρασιών.

**3. Μην εφαρμόζετε το PODIUM 33 EC σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.**

4. Στις καλλιέργειες της τομάτας και του καπνού μετά την εφαρμογή να γίνεται ενσωμάτωση σε βάθος 5-8 εκ. ή να ακολουθείται ελαφρύ πότισμα.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.**

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε αραβόσιτο, πεπόνι, αγγούρι ή άλλα κολοκυνθοειδή, μηδική, σπανάκι και τεύτλα στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.  
Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου και αφού προηγηθεί κατεργασία του εδάφους.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό .

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.  
Ευαίσθητες γειτονικές καλλιέργειες: αγγούρι, πεπόνι, σέσκουλο, σπανάκι και τεύτλα.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**