



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π.

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 25 - 5 - 2015
Αριθ. πρωτ: 3555/41862

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 72 25
e-mail: ptheodoris@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΩΡΟΥ 18-20
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της προσωρινής
έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) **MOVENTO 150 OD** ως
προς το φάσμα δράσης και την
τελευταία επέμβαση πριν την
συγκομιδή”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τον Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τους καν. 364/2014 και 399/2015.
4. Την με αρ.πρωτ. **4979/53984/30-4-2013** (ΑΔΑ: ΒΕΝΕΒ-ΘΓ7) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **14430 προσωρινή** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MOVENTO 150 OD** (δ.ο spirotetramat), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/Β/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
7. Την από 15.04.2015 αίτηση της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η με αριθμ. **14430** προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MOVENTO 150 OD** (δ.ο spirotetramat) της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.**, τροποποιείται ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή.

Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ. εκ./ στρέμμα (min-max)		
Αμπέλι	<i>Ψευδόκοκκος (Plasmodium fuscum)</i>	-	50-100	50	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης. 1^η εφαρμογή όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού 2^η εφαρμογή όταν αρχίσει να «κλείνει» το τσαμπί	2/14-21
	<i>Aphis spp.</i>	-		40-50	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	
Αχλαδιά	<i>Ψύλλα Αχλαδιάς (Cacopsila piri)</i> <i>Ψώρα Σαν Ζοζέ¹ (Quadraspidiotus perniciosus)</i>	100*	50-150	100-144	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης. Ψύλλα: Εφαρμογές όταν το 50% των αυγών είναι κίτρινα και το υπόλοιπο 50% λευκά. Ψώρα Σαν Ζοζέ: Εφαρμογές στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	2/14-21

*με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα

	Ρόδινη αφίδα της μηλιάς (<i>Dysaphis plantaginea</i>), Πράσινη αφίδα της μηλιάς (<i>Aphis pomi</i>)	60* *με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα	50-150	60-90	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	
Μηλιά	Ψώρα Σαν Ζοζέ ¹ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), Lepidosaphes sp., Ματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	100* *με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα	50-150	100-144	Ψώρα Σαν Ζοζέ: Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές) Ματόψειρα: Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση της προσβολής. Συστήνεται να γίνεται πολύ καλή διαβροχή.	2/14-21
	Ρόδινη αφίδα της μηλιάς (<i>Dysaphis plantaginea</i>), Πράσινη αφίδα της μηλιάς (<i>Aphis pomi</i>)	60* *με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα	50-150	60-90	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	
Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά Δαμασκηλιά	Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (<i>Myzus persicae</i>)	60* *με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα	50-150	60-90	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	2/14-21
	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>), Βαμβακάδα της ροδακινιάς (<i>Pseudalacaspis pentagona</i>)	100* *με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ./στρέμμα	50-150	100-144	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	

Κερασιά	Μαύρη Αφίδα της Κερασιάς (<i>Myzus cerasi</i>)	60* *με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ./στρέμμα	50-150	60-90	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης και με την εμφάνιση της προσβολής	2/14-21
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ φρουτ	Κοκκοειδή (<i>Aonidiella sp.</i> , <i>Planococcus sp.</i> , <i>Aspidiotus sp.</i> , <i>Ceroplastes sp.</i> , <i>Parlatoria sp.</i> , <i>Saissetia sp.</i> , <i>Laevidosaphes sp.</i>)	20-60	100-300	-	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	2 /21
Ελιά	Κοκκοειδή (<i>Parlatoria sp.</i> , <i>Lepidosaphes sp.</i> , <i>Saissetia sp.</i>)	50	100	-	Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές)	2 /21
Τομάτα (Υ) Αγγούρι (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	-	100	50	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
Μελιτζάνα (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>) Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	-	100	50	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 /14
Πεπόνι Καρπούζι (Υ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>) Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	-	50-75	40 50	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 14

Κολοκύθι (Υ)	Αφίδες <i>(Myzus persicae, Aphis gossypii)</i>	-	50-75	40	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
	Αλευρώδεις <i>(Bemisia tabaci, Trialeurodes varorariorum)</i>	-		50		
Τομάτα (Θ)	Αλευρώδεις <i>(Bemisia tabaci, Trialeurodes varorariorum)</i>	65	75-150	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
	Αφίδες <i>(Myzus persicae, Aphis gossypii)</i>					
Πιπεριά (Θ) Μελιτζάνα (Θ)	Αφίδες <i>(Myzus persicae, Aphis gossypii)</i>	50	100	50	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 14
	Αλευρώδεις <i>(Bemisia tabaci, Trialeurodes varorariorum)</i>					
Αγγούρι (Θ)	Αφίδες <i>(Myzus persicae, Aphis gossypii)</i>	65	75-150	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 / 14
	Αλευρώδεις <i>(Bemisia tabaci, Trialeurodes varorariorum)</i>					
Πεπόνι Καρπούζι (Θ)	Αφίδες <i>(Myzus persicae, Aphis gossypii)</i>	50	50-75	40	Με την εμφάνιση της προσβολής	3 / 14

	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>variorariorum</i>)	65		50		
Κολοκύθι (Θ)	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>)	50	50-75	40	Με την εμφάνιση της προσβολής	4 /14
	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> <i>variorariorum</i>)	65		50		
Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλώ ν	Αφίδες (<i>Brevicoryne</i> <i>brassicae</i> <i>Aphis spp.</i>)	-	25-100	50	65	2/14

Παρατηρήσεις:

¹ Στη Μηλιά και την Αχλαδιά να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση για την καταπολέμηση του *Quadraspidiotus perniciosus*.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

13**Προστασία των καταναλωτών**

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αχλαδιά, Μηλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά Δαμασκηνιά	21
Αμπέλι	14
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊφ φρουτ, Ελιά	14
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών	3

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. **14430** προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MOVENTO 150 OD** (δ.ο spirotetramat) της εταιρείας **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ