



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 9-6- 2015
Αριθ. πρωτ: 3122/35668 π.ε.

Ταχ . Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Προς BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 7161

: Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
E-mail:

dimitris.theodosiou@basf.com

e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60182 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ROVRAL 75 WG (δ.ο. iprodione 75% β/β) ως προς τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 και 51 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Την ΥΑ με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
5. Την εισήγηση της Υπηρεσίας
6. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.

7. Την από 17.3.2014, 3-4-2014, 6-6-2014, 15-9-2014 και αίτηση της εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι Τροποποιούμε τη με αριθ. **60182** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ROVRAL 75 WG (δ.ο. iprodione 75% β/β)** που χορηγήθηκε με την αριθ. 119468/2-6-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τον παρασκευαστή και τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), καθώς και την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες

Συγκεκριμένα :

Α. Το σημείο 1. **3γ/δ** διαμορφώνεται ως εξής

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.3 Δραστική ουσία (ες)

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

BASF Agro B.V.
Arnhem (NL) – Zuerich Branch im
Tiergarten 7
8055 Zuerich
Ελβετία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
BASF Agri-Production S.A.S.
32, Rue de Verdun
BP 80116
76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf
Γαλλία.
Nutrichem Co., Ltd.
Building D-1
Zhongguancun Dongsheng Science Park
No.66 Xixiaokou Road, Haidian District
Beijing 100192, P.R. CHINA
3. Jiangxi Heyi Chemical Co. Ltd.
Longcheng Town, Pengze
Jiujiang City, Jiangxi Province
P.R., Κίνα

Β Το σημείο 1.4 γ διαμορφώνεται ως εξής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

χρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro B.V.
 Arnhem (NL) – Zuerich Branch im Tiergarten
 7
 8055 Zuerich
 Ελβετία

Γ Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής

5		5.1 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Όγκος Ψεκαστικού υγρού (l/στρέμμα (min-max))	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Kg Σκευάσματος / στρέμμα	gr σκευάσματος / εκατόλιτρο			
Αμπέλι	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,1	100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την πλήρη Άνθηση ως την ωρίμανση των καρπών Μεσοδιάστημα 14 ημέρες	2
Φράουλα (ύπαιθρος, θερμοκήπιο)	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,1	100	100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης. Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2
Καρότο	Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp.</i>),	0,1		50	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2

Κρεμμύδι (ξηρός βολβός)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia WGlerotiorum</i>)	0,1		40-50	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μεσοδιάστημα 10 -14 ημέρες	2
Τομάτα (θερμοκήπιο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia spp</i>)	0,1-0,145	70-290	50-150	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση Μεσοδιάστημα 7- 14 ημέρες	2
Πιπεριά (θερμοκήπιο)			100-290	50-100		
Μελιτζάνα (θερμοκήπιο)						
Αγγούρι/ αγγουράκι τουρσί (ύπαιθρος θερμοκήπιο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia spp</i>)	0,1	70-100	50-100 (Υ) 50-150 (Θ)	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2
Κολοκύθι (ύπαιθρος, θερμοκήπιο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia spp</i>)	0,1	70-100	50-80 (Υ) 50-150 (Θ)	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2
Πεπόνι, (ύπαιθρος, θερμοκήπιο) Καρπούζι υπαίθρου	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia spp</i>)	0,1	70-100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμανση Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2

Κουνουπίδι, Μπρόκολο	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia spp</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>), Ριζοκτόνια (<i>Rhizoctonia solani</i>),	0,1		100	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2
Μαρούλι (ύπαιθρος, θερμοκήπιο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia spp</i>) Ριζοκτόνια (<i>Rhizoctonia solani</i>),	0,1 (Υ) 0,08(Θ)		60-80	Ψεκασμοί φυλλώματος μετά το στάδιο των 2-3 φύλλων, μέχρι το κλείσιμο των γραμμών Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2
Φασόλι, (ύπαιθρος, θερμοκήπιο) Αρακάς (ύπαιθρος)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia WGlerotiorum</i>)	0,1	70-100	60-80 (Υ) 100-150 (Θ)	Ψεκασμοί φυλλώματος στην άνθηση Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2
Σπαράγγι	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i>) μέτρια δράση στο Στεμφύλιο στο Στεμφύλιο (<i>Stemphyllium spp.</i>)	0,1		50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων Μεσοδιάστημα 14 ημέρες	2
Καλλωπιστικά (ύπαιθρος, θερμοκήπιο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,1	70-100	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες	2

Σκόρδο	Βοτρυτής (<i>Botrytis cinerea</i>), Σκληρωτία (<i>WGlerotinia WGlerotiorum</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp</i>)	0,1	40-50	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μεσοδιάστημα 10 -14 ημέρες	2
<p>Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να συνδυάζεται με τον μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού</p> <p>Στην Ελλάδα η πολύχρονη εμπειρία από την χρήση του προϊόντος έχει δείξει άριστη αποτελεσματικότητα με την μικρότερη δόση στην τομάτα</p>					

Δ Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		ΠΡΟΣΟΧΗ

Ε Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής

10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
		H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
		H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΣΤ. Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102+405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P264: Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.

Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό

SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

SPe3 «Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** για τις καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα».

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

Z Το σημείο 12 διαμορφώνεται ως εξής

12 Πρώτες
βοήθειες -
Αντίδοτο

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα.. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανιστούν αναπνευστικές ή άλλες δυσχέρειες κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Εθνικά προσωρινά MRLs	
	(mg/kg)	
Iprodione	προϊόντα	MRLs
	Έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό 369/2005 (κανονισμός 149/2008)	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	PHI(ημέρες)
Αμπέλι επιτραπέζια οινοποιήσιμα	21
Φράουλα	3

Καρότο	27
Κρεμμύδια (ξηρός βολβός)	21
Τομάτες θερμοκηπίου	3
Μελιτζάνες θερμοκηπίου	3
Πιπεριές θερμοκηπίου	3
Αγγούρια/ Αγγουράκια για τουρσί	3
Κολοκύθια (Υ + Θ)	3
Πεπόνι, (Υ + Θ)	7
Καρπούζι (Υ)	7
Μπρόκολο	21
Κουνουπίδι	21
Μαρούλι	14
Υπαίθρου	21
θερμοκηπίου	
Φασόλια	3
Υπαίθρου	14
θερμοκηπίου	
Αρακάς	3
Υπαίθρου	
Σπαράγγι	Δεν ορίζεται
Σκόρδο	21

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 119468/2-6-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ