

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 5-10-2015  
Αριθ. πρωτ: 9384/106963

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  
Τηλέφωνο: 210 92 87 237  
e-mail: [apapamichail@minagric.gr](mailto:apapamichail@minagric.gr)

Προς: Fine Agrochemicals Limited  
Δια μέσου της  
Χελλαφάρμ ΑΕ.  
Φλέμιγκ 15  
Τ.Κ. 151 23 Μαρούσι

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) **FALGRO 4 SL (δ.ο. Gibberellic acid)**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &amp; ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί και οι δραστικές ουσίες gibberellic acid και gibberellin.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Την ΟΔΗΓΙΑ 2008/127/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να συμπεριληφθούν διάφορες δραστικές ουσίες μεταξύ των οποίων και οι gibberellic acid και gibberellin.
8. Το υπ' αρ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) Προεδρικό Διάταγμα για την Ανασύσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Το υπ' αρ. 73/22-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α/22-9-2015) Προεδρικό διάταγμα για τον διορισμό του κ. Ε. Αποστόλου στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Τη με αριθ. Πρωτ. 6252/78481/14.07.2015 (ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
11. Την υπ' αρ. 9202/103917/29-8-2013 αίτηση της εταιρείας για την άδεια διάθεσης στην αγορά και την υπ' αρ. 6717/16-7-2015 αίτηση για την αλλαγή του εμπορικού ονόματος του σκευάσματος.
12. Την Έκθεση Αξιολόγησης του Μ.Φ.Ι. (αρ. πρωτ.: ΕΜΠ 584/10-6-2015).
13. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33, του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FALGRO 4 SL** (δ.ο. Gibberellic acid) της εταιρείας **Fine Agrochemicals Limited** με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>8239</b>
<b>5.10.2015</b>
<b>31.08.2020</b>

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>FALGRO SL</b>
<b>SL (πυκνό διάλυμα)</b>

**1.3 Δραστικές ουσίες**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>Gibberellic acid (GA<sub>3</sub>)</b>
--

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

<b>91.4% w/w min</b>
----------------------

Χημική ομάδα

Gibberellins
--------------

Παρασκευαστής

Fine Agrochemicals Limited
----------------------------

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd, Zhejiang, No.598 Xishan Road, Haining, Zhejiang, China
--

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Gibberellic acid (GA<sub>3</sub>)** όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αριθ. πρωτ. 9202/103917/29-8-2013 αίτηση της εταιρείας για το σκεύασμα, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. Είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές καταχώρησης του gibberellic acid στο Annex I. ( Η Fine Agrochemicals Limited είναι μέλος του EUTF που υποστήριξε την καταχώρηση του gibberellic acid στο Annex I κατά την οποία ορίστηκε ελάχιστη καθαρότητα > 850 g/kg ).

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Fine Agrochemicals Limited  
P.C. Hill End House, Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK  
Tel.: +44 (0) 1905 361800  
Fax: +44 (0) 1905 361810  
E-mail: [mariam@fine.eu](mailto:mariam@fine.eu)

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Χελλαφάρμ ΑΕ.  
Φλέμιγκ 15  
151 23 Μαρούσι  
Τηλ: 210 6800900  
Fax: 210 6833488  
E-mail: [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Χελλαφάρμ ΑΕ.  
Φλέμιγκ 15  
151 23 Μαρούσι  
Τηλ: 210 6800900  
Fax: 210 6833488  
E-mail: [info@hellafarm.gr](mailto:info@hellafarm.gr)

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Fine Agrochemicals Limited

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
Schirm GmbH  
Standort Schönebeck,  
Geschwister-Scholl-Straße 127  
39218 Schönebeck/Elbe, Germany  
Tel: (49)3928 456 356

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- Schirm GmbH  
Standort Schönebeck,  
Geschwister-Scholl-Straße 127  
39218 Schönebeck/Elbe, Germany  
Tel: (49)3928 456 356
- Χελλαφάρμ Α.Ε., Στυλίδα Φθιώτιδας

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Gibberellic acid: (91.4% % GA<sub>3</sub>)\* 4% β/ο (\*αντιστοιχεί σε 3,6% β/ο καθαρή δραστική ουσία)  
 Βοηθητικές ουσίες: 95,02% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 9202/103917/29-8-2013 αίτηση μας για το σκεύασμα είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

2

## Συσκευασίες:

## 2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	50 κ. εκ., 100 κ. εκ., 250 κ. εκ., 500 κ. εκ., 1 λίτρο, 5 λίτρα και 10 λίτρα	Co-extruded HDPE

3

## Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης μέχρι απορροής,

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού διαλύματος: Αφού υπολογίσετε την ποσότητα **FALGRO 4SL** που απαιτείται για τον όγκο ψεκαστικού υγρού που θα εφαρμόσετε γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο με λίγο καθαρό νερό και ψεκάστε το στην ψεκασμένη περιοχή αδειάζοντας τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε όλα τα ορατά υπολείμματα και από το εξωτερικό του ψεκαστικού ξεπλένοντας με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε και πάλι το εσωτερικό του ψεκαστικού με καθαρό νερό και αδειάστε τελείως το νερό ξεπλύματος μέσω του συστήματος ψεκασμού (το νερό που θα χρησιμοποιήσετε για το ξέπλυμα να είναι τουλάχιστον το 1/10 του όγκου που χωράει το βυτίο). Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Συνδυαστικότητα: Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα εκτός από το Perlan. Κατά το συνδυασμό με Perlan διατηρείτε συνεχώς το μίγμα σε ανάμιξη και χρησιμοποιήστε το άμεσα (χρήση σε λιγότερο από 3 ώρες υπό διαρκή ανάμιξη). Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με λάδια και αλκαλικά μείγματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός ή το θειασβέστιο. Το **FALGRO 4SL** δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν και μετά την εφαρμογή θερινού πολτού επειδή επηρεάζεται αρνητικά η απορρόφησή του.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	<p><u>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</u> Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p> <p>Προφυλάξεις για τους χειριστές: (βλπ σημείο 11).</p>
--	---

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Φυτορρυθμιστική ουσία, προάγει την επιμήκυνση των κυττάρων και χρησιμοποιείται για αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, αχλαδιά και αγκινάρα.</p>
----------	------------------------------	---

<b>5 5.1 Φάσμα δράσης</b>						
Καλλιέργεια	Στόχος	Δόσεις εφαρμογής			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρ		
<b>Εσπεριδοειδή</b> Πορτοκαλιά	Βελτίωση της ποιότητας του φλοιού.	50	25-50	100	Πριν την έναρξη χρωματισμού των καρπών	1
Κλημεντίνη μανταρινιά	Προώθηση καρπόδεσης	25	25	100	Πλήρης άνθηση - 2/3 πτώση πετάλων. Επαναλάβετε εφόσον κριθεί αναγκαίο, ειδικά για παρατεταμένη περίοδο άνθησης	2/10-30 ημέρες ανάλογα με τη διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας
Λεμονιά	Καθυστέρηση ωρίμανσης, μείωση του αριθμού μικρών καρπών, αύξηση μεγέθους των καρπών.	50	25-50	100	Πριν το χρωματισμό των καρπών	1
Αχλαδιά	Προώθηση της καρπόδεσης στις ποικιλίες χαμηλής καρπόδεσης και της κανονικής ανάπτυξης των καρπών	30 μόνο του ή 7.5 όταν εφαρμόζεται μαζί με Perlán.	15-30 μόνο του ή 7.5 όταν εφαρμόζεται μαζί με Perlán.	100	Εφαρμογή κατά την άνθηση (20-30% άνθησης – τέλος άνθησης)	1

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<b>Αμπέλι</b>						
Επιτραπέζια σταφύλια (άσπερμες ποικιλίες (Σουλτανίνα Thomson...))	Επιμήκυνση βοτρύων	75	75	30-100	Πριν την άνθηση, βλαστοί 4-8 εκ.	1
	Αραίωμα	75	75	60-100	30-40% άνθηση	1
	Μεγέθυνση ραγών	75	75	100	Από την καρπόδεση μέχρι ράγες διαμέτρου 3-4 mm. Επανάληψη μετά 5-12 ημέρες για ομογενοποίηση του μεγέθους των ραγών.	2/5-12
	Αύξηση καρπόδεσης και πρωίμιση της παραγωγής	75	75	100	Κατά την πλήρη άνθηση και 5-12 ημέρες αργότερα	2/5-12
Οινοποιήσιμο	Αύξηση του μήκους των βοτρύων	12.5	12.5-25	50	Πριν την άνθηση, σε βλαστούς 10-15 εκ.	1
Σταφίδα (Σουλτανίνα)	Αύξηση μεγέθους ραγών	25	25	100	Μέγεθος ραγών 3 χιλιοστά	1
Σταφίδα (Κορινθιακή)	Μείωση πτώσης ανθέων και καρπών, αύξηση καρπόδεσης	12.5	12.5	100	Κατά την πλήρη άνθηση	1
Αγκινάρα	Πρωίμιση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητάς της.	50	25 – 50	40 – 100	1η εφαρμογή με τον σχηματισμό του κεντρικού άνθους της κεφαλής (1-2 αληθινά φύλλα)	3/15-20

**Παρατηρήσεις:**

- Χρησιμοποιείτε μεγάλους όγκους νερού για να εξασφαλιστεί καλή κάλυψη της καλλιέργειας. Προσαρμόστε τον ψεκαστικό όγκο στο στάδιο ανάπτυξης και τον όγκο βλάστησης της καλλιέργειας.
- Για να εξασφαλίσετε καλλίτερη απορρόφηση και αυξημένη αποτελεσματικότητα του FALGRO 4 SL ψεκάστε κατά προτίμηση όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή (το πρωί ή το βράδυ). Μην ψεκάσετε φυτά που υποφέρουν από έλλειψη νερού.
- Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα στον ψεκαστήρα για μεγάλο διάστημα (για παράδειγμα όταν διακόπτετε για φαγητό ή για την επόμενη ημέρα).

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1) Εσπεριδοειδή:

Προσοχή: Όταν οι συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας δεν είναι ευνοϊκές η εφαρμογή γιββεριλικού οξέος σε ορισμένες ποικιλίες εσπεριδοειδών όπως η Turkey Valencia και η Bhihinnia Navel μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα.

Για καλύτερη απορρόφηση του γιββεριλικού οξέος, το pH του διαλύματος πρέπει να είναι 4-5.5

2) Αχλαδιά:

Καλή ανταπόκριση στο **FALGRO 4SL** μπορεί να επιτευχθεί σε ποικιλίες όπως: Louise Bonne d'Avranches, Buttira Giffard, Coscia, Gentilona, Passacrassane, Spadona, Spadoncina, Triumph of Vienna, William. **FALGRO 4L** δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην ποικιλία Doyenné du Comice.

Προσοχή: Οι καλλιεργητικές πρακτικές (κυρίως κλάδεμα και έλεγχος ευρωστίας) και η λίπανση πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το προσδοκώμενο φορτίο των δένδρων σε καρπούς. Η χρήση του **FALGRO 4SL** σε υψηλές δόσεις μπορεί να αλλοιώσει την μορφή των καρπών (επιμήκυνση) και να ελαττώσει την άνθηση του επόμενου χρόνου.

3) Αμπέλι:

Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες (Chardonnay, Picolit, Tocai, κλπ), η εφαρμογή **FALGRO 4SL** βελτιώνει το μήκος των βοτρύων με αποτέλεσμα να γίνονται λιγότερο συμπαγείς και να ελαττώνεται η πιθανότητα προσβολής από βοτρυτή (*Botrytis cinerea*).

Η χρήση του **FALGRO 4SL** σε μείγμα βυτίου με ένα προσκολλητικό βελτιώνει τη διείσδυση και την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Προσοχή: Σε πολύ ευπαθείς ποικιλίες όπως η Riesling χρησιμοποιείστε το **FALGRO 4SL** σε μειωμένη δόση.

4) Αγκινάρα:

Προσοχή: Για να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του **FALGRO 4SL** και να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη αύξηση της παραγωγής πρέπει να αυξηθούν ανάλογα η λίπανση και η άρδευση. Υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύμητων επιδράσεων στις ποικιλίες Romanesco & Spinoso.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας .**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	Δεν απαιτείται
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Δεν απαιτείται
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.	Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων


- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας,

Η χρήση γιββεριλικού οξέος μπορεί να προκαλέσει

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ευπαθείς ποικιλίες εσπεριδοειδών όπως οι Turkey Valencia και Bhihinnia Navel, όταν οι συνθήκες ανάπτυξης των δένδρων δεν είναι ευνοϊκές.  
Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν ενδείξεις για παρενέργειες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης

9	Εικονογράμματα κινδύνου	<p>Κίνδυνος Εύφλεκτο υγρό- Κατηγορία 2 Ερεθιστικό οφθαλμών - Κατηγορία 2 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση - Κατηγορία 3</p> 
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.</p>
11	Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P102: Μακριά από παιδιά.. P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P210: Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ γυμνές φλόγες/ θερμές επιφάνειες. P233: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.. P243: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα P240: Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη P241: Να χρησιμοποιείται αντιαεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός/.../ εξοπλισμός. P242: Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. P243: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό». Sp1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>P303 + P361 + P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει</p>



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<p>την αναπνοή</p> <p>P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε..</p> <p>P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>P370 + P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση.</p> <p>P403 + P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό ή χορηγήσετε υγρά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.</p> <p><b>Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777</b></p>
---

**13****Προστασία των καταναλωτών**

**13.1.** Δεν απαιτείται καθορισμός MRLs σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Καν. 396/2005.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Δεν απαιτείται	-

**14**

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική & απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία ως 40 °C.

**15****Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16****Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17****Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

*Μελέτες/πειράματα για την υποστήριξη των χρήσεων στις καλλιέργειες: Λεμονιά, Αχλαδιά, Επιτραπέζιο Σταφύλι (Αραίωμα, Αύξηση καρπόδεσης και πρωίμιση της παραγωγής), Σταφίδα.*

*Μελέτη σταθερότητας διατιάς σε θερμοκρασίας περιβάλλοντος (έως 40°C)*

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**B**

## Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**