



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 24-7-2015
Αριθ. πρωτ: 2975/35401**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 928 7230
e-mail: nrapanikolaou@minagric.gr**

**Προς: UPL Europe Ltd
(δια της Χελλαφάρμ Α.Ε..
Φλέμιγκ 13, 151 23 Μαρούσι)
e-mail: info@hellafarm.gr**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60301 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP (δ.ο. mancozeb) ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Καν. 34/2013 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του Κανονισμού, (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες 2-phenylphenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and DSM 14941, cyproconazole, difenoconazole, dithiocarbamates, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad and tetraconazole μέσα ή πάνω στα τρόφιμα.
4. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 6252/78481/14-7-2015 (ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τη με αρ. 2975/35401/27-03-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60301** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72** που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. **188168/06-09-2010** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος και τα εργοστάσια παρασκευής και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 1.4α, 1.4γ, 1.4δ, 1.4ε, 5, 11 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Mancozeb
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	850 g/kg min
Χημική κατηγορία	διθειοκαρβαμιδικά
Παρασκευαστής	UPL Europe Ltd
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1) UPL Ltd, Ινδίας 2) Cerexagri B.V., Ολλανδίας
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας mancozeb προσδιορίζονται στην αίτηση με ημερομηνία 30-6-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΚΤ 120031) και στο Doc J από την παρασκευάστρια εταιρεία με ημερομηνία 05-12-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΚΤ 124144) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

UPL Europe Ltd
The Centre, 1st Floor, Birchwood Park,
Warrington, Cheshire WA3 6YN
Ηνωμένο Βασίλειο

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Χελλαφάρμ ΑΕ.
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 6800900
Fax: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL Europe Ltd
The Centre, 1st Floor, Birchwood Park,
Warrington, Cheshire WA3 6YN
Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) UPL Ltd, Ινδίας
2) Cerexagri B.V. Ολλανδίας
3) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) UPL Ltd, Ινδίας
2) Cerexagri B.V. Ολλανδίας
3) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		Γρ. σκ./στρ. (max)	Γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> V. <i>pirina</i>)	220	160- 220	50-100	Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα	Μέχρι 4 εφαρμογές εφόσον απαιτείται
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	220	220	50-100	Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται

	Φόμοψη (<i>Cryptosporiella=</i> <i>Phomopsis</i> <i>viticola</i>) Μαύρη σήψη (<i>Guignardia</i> <i>bidwellii</i>)				1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων	
Κρεμμύδι (ξηρό) Σκόρδο (ξηρό)	Περονόσπορος (<i>Peronospora</i> <i>destructor</i>)	270	220-270	40-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτα (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora</i> <i>infestans</i>) Σεπτόρια (<i>Septoria</i> <i>lycopersici</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> <i>solani</i>)	220	220	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> <i>solani</i>)	220	220	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρότο	Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> <i>dauci</i>)	220	220	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον υπάρχει πρόβλημα.
Κολοκυνθοειδή πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι (Υπαίθρου)	Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium</i> <i>cucumerinum</i>)	220	220	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Bremia</i> <i>lactucae</i>)	220	220	60-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον

						απαιτείται
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora</i> <i>indestans</i>) Αλτερναρίωση (<i>Alternaria</i> <i>solani</i>)	220	-	50-100	Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση	Μέχρι 8 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

- Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του **MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP**.
- Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής
- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων

11 Δηλώσεις Προφύλαξης

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή»
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»
«Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα».
SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
- για τις καλλιέργειες του καρότου, μαρουλιού, κρεμμυδιού, σκόρδου και πατάτας 5 μέτρων
- για την καλλιέργεια του αμπελιού 10 μέτρων και
- για τις δενδρώδεις καλλιέργειες 30 μέτρων
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά Αχλαδιά Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο)	28 ημέρες
Κρεμμύδι, σκόρδο	28 ημέρες
Μαρούλι (Υπαίθρου)	28 ημέρες
Καρότο	35 ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα Πιπεριά, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι (Υπαίθρου)	3 ημέρες
Πατάτα	7 ημέρες

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. **188168/06-09-2010** Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α

I. ΚΑΓΙΑΣ