



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (Σημείο 5.1)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30 - 11 - 2015
Αριθ.πρωτ: 11561/132587

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
153 43, Αγία Παρασκευή
e-mail: info@gr.nufarm.com

ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CONVOY 50 SC (fluometuron 50% β/ο).

Β. Ανάκληση της με αριθ. 7903 έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CONVOY 50 SC (fluometuron 50% β/ο).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Την αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής (Μ.Φ.Ι. Σεπτέμβριος 2015) που αφορά το πανομοιότυπο φυτοπροστατευτικό προϊόν DIFFERENCE® 50 SC.
7. Το από 20/11/2015 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας.
8. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
9. Την από 30/5/2013 αίτηση της εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CONVOY 50 SC** της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70143
30-11-2015
31-05-2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή

CONVOY 50 SC
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Fluometuron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

99.2% β/β min

Χημική ομάδα

Παράγωγα ουρίας.

Παρασκευαστής

NUFARM GmbH & Co KG, St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria Τηλ.: +43 732 6918 2455 Fax: +43 732 6918 62455 klaus.holzleithner@at.nufarm.com

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: NUFARM GmbH & Co KG, St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria

Τεχνικές προδιαγραφές της

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

3

δραστικής ουσίας:

Fluometuron όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια εταιρία Nufarm GmbH & Co KG Αυστρίας κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την Οδηγία Καταχώρησης με ημερομηνία 31-5-2011 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97310) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή
Τηλ: +30 210 6990932,
Fax: +30 210 6990862
E-mail: info@gr.nufarm.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της άδειας

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

NUFARM GmbH & Co KG,
St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria
Τηλ.:+43 732 6918 2455
Fax: +43 732 6918 62455
klaus.holzleithner@at.nufarm.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
NUFARM GmbH & Co KG,
St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. NUFARM GmbH & Co KG,
St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria
2. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Fluometuron 50 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 56.70% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 6090/65632 / 30-05-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 Λίτρο	HDPE
2	Δοχεία	5, 10 Λίτρα	

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενσωμάτωση, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση των βαμβακοφύτων, όταν αυτά έχουν ύψος 10-15 εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα, διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα αυτού σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα μπεκ 2 με 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με θειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα.

Μπορεί να συνδυαστεί υπό ανάδευση με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 96 EC, Tender Gold, Mercantor 96 EC, Typhoon 96 EC και Pixel 96 EC (δραστική ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Sromp Aqua 455 CS, Energiser EC, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilerst 330 EC, Abilest 455 CS, Vinator 330 EC, Vinator 455 CS, Revadis 330 EC, Revadis 455 CS (δραστική ουσία Pendimethalin).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προσπαρτικό, προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ. / στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λτ. / στρ.		
Βαμβάκι	Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	240 – 400	30 – 60	Πριν τη σπορά, με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 5 – 8 εκ.	1 (2 σε περίπτωση σπαστής εφαρμογής)
		300+100 Ή 200+200		«Σπαστή» εφαρμογή προσπαρτικά, και προφυτρωτικά, με ενσωμάτωση	

Κατάλογος καταπολεμούμενων ζιζανίων:

Προσπαρτική εφαρμογή:

Καλή αποτελεσματικότητα:

Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*),
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*),
Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*)
Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*),
Βέλιουρας (*Sorghum halepense*),
Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*),

Μέτρια αποτελεσματικότητα:

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon thiohrasti*)

Σπαστή εφαρμογή (προσπαρτικά και προφυτρωτικά σε αναλογία: 300 κ.εκ. + 100 κ.εκ. ή 200 κ.εκ. + 200 κ.εκ.)

Καλή αποτελεσματικότητα:

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon thiohrasti*),
Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*),
Τάτουλας (*Datura stramonium*),
Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*),
Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*),
Βέλιουρας (*Sorghum halepense*),
Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*),

Μέτρια αποτελεσματικότητα: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*),

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ. / στρ. (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λτ. / στρ.		
Βαμβάκι	Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων	240 – 400	30 – 60	Προφυτρωτικά. Εφόσον δεν ακολουθήσει βροχή, να ακολουθήσει άρδευση με 20 – 50 m ³ νερό / στρέμμα.	1
		200		Μετά το φύτευμα των βαμβακοφύτων και όταν αυτά έχουν ύψος 10 – 15 εκ., με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση τους	

Κατάλογος καταπολεμούμενων ζιζανίων:

Προφυτρωτική εφαρμογή:

Καλή αποτελεσματικότητα:

Λουβουδιές (*Chenopodium spp*)

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon thiohrasti*),

Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*, *Amaranthus sp.*),

Τάτουλας (*Datura stramonium*),

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*),

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*)

Γλιστρίδα (*Portulaca oleracea*),

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*),

Βέλιουρας (*Sorghum halepense*),

Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:

Καλή αποτελεσματικότητα:

Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)

Μέτρια αποτελεσματικότητα:

Βλήτο (*Amaranthus retroflexus*),

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, μικρό πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιμοποιήστε χαμηλότερες δοσολογίες.
 2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνίσταται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή.
 3. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή συνίσταται μόνο όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των ζιζανίων κατά την προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.εκ./στρ. (σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 κ.εκ./στρ. με το σκεύασμα ανά έτος.
 4. Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα με δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλέπε «Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων
- Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας**

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν


Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6μήνες από την εφαρμογή του και βαθύ όργωμα

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν στα φυτά του βαμβακιού σε περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή παραγωγή των φυτών.

9	Σήμανση σκευάσματος:		GHS07, GHS08, GHS09 Προσοχή																												
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 315 630 349">H302</td> <td data-bbox="638 315 1457 349">Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 353 630 387">H351</td> <td data-bbox="638 353 1457 387">Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 392 630 459">H411</td> <td data-bbox="638 392 1457 459">Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 499 630 533">EUH401</td> <td data-bbox="638 499 1457 573"><i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα</i></td> </tr> </table>		H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης	H351	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου	H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.	EUH401	<i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα</i>																				
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης																														
H351	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου																														
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.																														
EUH401	<i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα</i>																														
11		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="486 613 630 647">P102</td> <td data-bbox="638 613 1457 647">Μακριά από παιδιά.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 651 630 685">P405</td> <td data-bbox="638 651 1457 685">Φυλάσσεται κλειδωμένο.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 689 630 757">P270</td> <td data-bbox="638 689 1457 757">Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 761 630 795">P201</td> <td data-bbox="638 761 1457 795">Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 799 630 833">P261</td> <td data-bbox="638 799 1457 833">Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 837 630 871">P264</td> <td data-bbox="638 837 1457 871">Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 875 630 909">P273</td> <td data-bbox="638 875 1457 909">Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 913 630 981">P280</td> <td data-bbox="638 913 1457 981">Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 985 630 1019">Sp1</td> <td data-bbox="638 985 1457 1019">Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 1023 630 1090">SPe3</td> <td data-bbox="638 1023 1457 1090">Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="486 1095 1457 1196">“Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες ανθεκτικές μπότες κατά την διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής”.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="486 1200 1457 1267">“Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα”.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="486 1272 1457 1339">«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="486 1379 1457 1447"><i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</i></td> </tr> </table>		P102	Μακριά από παιδιά.	P405	Φυλάσσεται κλειδωμένο.	P270	Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.	P201	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.	P261	Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα.	P264	Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.	P273	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.	P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.	Sp1	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.	SPe3	Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη	“Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες ανθεκτικές μπότες κατά την διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής”.		“Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα”.		«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».		<i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</i>	
P102	Μακριά από παιδιά.																														
P405	Φυλάσσεται κλειδωμένο.																														
P270	Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.																														
P201	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.																														
P261	Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα.																														
P264	Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.																														
P273	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.																														
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.																														
Sp1	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.																														
SPe3	Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη																														
“Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες ανθεκτικές μπότες κατά την διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής”.																															
“Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα”.																															
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».																															
<i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</i>																															
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	Γενική συμβουλή: P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.																													
		Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.																													
		Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό.																													
		Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.																													
		Σε περίπτωση κατάποσης: P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.																													
		Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.																													
		Συμπτώματα: Δυσκολία στην αναπνοή, αταξία, αδυναμία, υπνηλία																													
		Αντίδοτο/θεραπεία: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.																													
		Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777																													

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά Προϊόντα

Προσωρινά
σε mg/kg

fluometuron

Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MPLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.

13.2 Τελευταία επέμβαση

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μη εφαρμόσιμο	

14**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος**

Αποθηκεύστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0°C προστατευμένο από απ' ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15**Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16**Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B

Ανακαλούμε τη με αριθ. **7903** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **CONVOY 50 SC**, η οποία διαμορφώθηκε με τη με αριθ. 125349/23-12-2008 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συγκεκριμένα:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις μήνες (έως 29-2-2016).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως 31-5-2016).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως 31-5-2017).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 31-5-2017, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ