



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30 - 11 - 2015
Αριθ.πρωτ: 10126/116146

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: chpanagoroulou@minagric.gr

Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μεσογείων 467 &
Γούναρη 40
Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 43
E-mail: info@gr.nufarm.com

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Butoxone DB (2,4-DB).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών 2,4-DB.
7. Την με αριθμό 2080039 έγκριση του στην Γαλλία
8. Το από 19 /10/2015 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας
9. Την υπ' αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
10. Την από 29/1/2015 και 18/9/2015 αίτηση της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Butoxone DB** της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70145
31-11-2015
31-10-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

Butoxone® DB

Πυκνό Διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

2,4-DB

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

2,4-DB οξύ 94% β/β min

Χημική ομάδα

Φαινοξυαλκανοϊκά

Παρασκευαστής

Nufarm Uk, Limited Wyke Lane, Wyke Bradford West Yorkshire BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.¹

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Nufarm Uk, Limited
 Wyke Lane, Wyke
 Bradford
 West Yorkshire BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 2,4-DB όπως προσδιορίζονται στο εμπιστευτικό τμήμα που συνοδεύει την αίτηση με αριθ.πρωτ.789/11013 / 29-01-2015 και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
 Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 43
 Τηλ.: +30 210 6990 932
 Fax: + 30 210 6990 862
 E-mail: info@gr.nufarm.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm Uk, Limited
 Wyke Lane, Wyke,
 Bradford
 West Yorkshire BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Nufarm Uk, Limited
 Wyke Lane, Wyke,
 Bradford
 West Yorkshire BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Nufarm GmbH & Co, KG
 St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Αυστρία

¹ Αναγράφεται η επωνυμία του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Nufarm Uk, Limited

Wyke Lane, Wyke,
Bradford,
West Yorkshire BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Nufarm GmbH & Co, KG

St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Αυστρία

3. K&N Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ

Βι. Πε. Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

2,4-DB: 40 % β/ο

(υπό μορφή άλατος Νατρίου 43,53% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: 64,10% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 789/11013 / 29-01-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 Λίτρου	HDPE
2	Δοχεία	5, 10 και 20 Λίτρων	HDPE
3	Δοχεία μεγάλου όγκου	200, 1000 Λίτρων	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλωματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση 2 ατμόσφαιρες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, θέτουμε σε λειτουργία την ανάδευση και προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: Μη το αναμιγνύετε με άλλα σκευάσματα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε σχολαστικά το ψεκαστικό. Ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό. Κατά τον καθαρισμό θέστε σε λειτουργία την αντλία ώστε το νερό να κυκλοφορήσει από όλα τα μέρη του ψεκαστικού.

Αφαιρέστε τα μπεκ και καθαρίστε τα ξεχωριστά.

Εφόσον το ψεκαστικό χρησιμοποιείται και για άλλους ψεκασμούς προσθέστε κατά το δεύτερο ξέπλυμα σε αναλογία 2% ένα διαβρεκτικό του εμπορίου.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο.

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε μηδική και τριφύλλι.

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τις ρίζες των ευαίσθητων ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς διαμέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς.

Το 2,4-DB εντός των ευαίσθητων ζιζανίων οξειδώνεται σε 2,4-D που προκαλεί επινασσία και ασύμμετρη αύξηση των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή των φύλλων και των νεαρών βλαστών τους και επηρεάζει την αναπνοή, τα αποθέματα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, και την κυτταρική διαίρεση.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφ/γών ανά καλ/κή περίοδο
		Κ.εκ. σκευ./ στρ (μεγ.)	Όγκος ψεκ. υγρού Λτ./στρ.		
Μηδική	Πλατύφυλλα ζιζάνια	450	20-40	Ψεκάσμος μεταξύ του σχηματισμού 2 ^{ου} και 4 ^{ου} τρίφυλλου φύλλου της καλλιέργειας. Σε περίπτωση ανομοιομορφίας η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει όταν στο σύνολό της η καλλιέργεια έχει φθάσει στο στάδιο του πρώτου τρίφυλλου φύλλου.	1
Τριφύλλι		450		Ψεκάσμος μετά το σχηματισμό του 2 ^{ου} τρίφυλλου φύλλου και μέχρι την εμφάνιση των πλαγίων βλαστών.	1

Παρατηρήσεις:

1. Τα ζιζάνια είναι πιο ευαίσθητα όταν είναι μικρά, στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξης:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοκαρότο (*Daucus carota*), Κίρσιο (*Cirsium arvense*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Μαύρο σινάπι (*Brassica nigra*), Λάπαθα (*Rumex crispus*), (*Rumex obtusifolius*), Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale*), Πλαντάγκο (*Plantain spp.*), Ρανούγκουλοι (*Ranunculus acris*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Σινάπι (*Sinapis arvensis*), Θλάσπι (*Thlaspis arvense*)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Άρτιπλεξ (*Atriplex patula*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Παπαρούνα (*Paraver rhoeas*), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*), Πικρίδα (*Picris echinoides*), Τραχύς ζωχός (*Sonchus asper*), *Leontodon autumnalis*, Τσουκνίδα (*Urtica urens*), Πολυκόμπι (*Equisetum sp*), Μυρώνι (*Scandix pecten veneris*), Ποικιλόχρωμος πανσές (*Viola tricolor*), Άγριο φαγόπυρο (*Fallopia convolvulus*), Μαρτιάκος (*Senecio inaequidens*), *Erysimum cheiranthoides*, Αγριομελιτζάνα (*Xanthium spp.*)

2. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα σε Κίρσιο η εφαρμογή να γίνεται λίγο πριν την ανθοφορία του.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το

- Για καλύτερη αποτελεσματικότητα ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 12 και 25 °C με υγρασία >60%.
- Να εφαρμόζεται με ήπιο καιρό, όταν δε φυσάει και με θερμοκρασία χαμηλότερη από 20 °C και σε καμία περίπτωση σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 25 °C.

<p>σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<ul style="list-style-type: none"> Μη το χρησιμοποιείτε όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σε περιόδους ξηρασίας. <p><u>Για την αποφυγή της διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει.</u></p> <p>Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο 2,4-D</p>
---	--

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

Μην εισέρχεστε στην περιοχή που έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή του.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του.

- 9** Σήμανση σκευάσματος



GHS05, GHS07, GHS09
Κίνδυνος

- 10** Δηλώσεις H

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

11 Δηλώσεις P

P102	Μακριά από παιδιά.
P405	Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270	Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P264	Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλα γάντια, κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και προστατευτικά γυαλιά σε όλη τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος.	
SP1	<i>Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.</i>
SPe3	<i>Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα</i>

12 Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Γενικά:	Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής:	Μετακινήστε τον παθόντα από το χώρο έκθεσης σε καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:	Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα και παπούτσια που έχουν μολυνθεί. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και στη συνέχεια πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του προϊόντος.
P305 +P351 +P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:	Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:	καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P330: Ξεπλύνετε το στόμα.
	Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Σε περίπτωση εμετού ξεπλύνετε εκ νέου το στόμα.
	Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Για όλες τις καλλιέργειες	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από πάγο και υψηλές θερμοκρασίες. Οι συσκευασίες σε βαρέλια να αποθηκεύονται σε ειδικές τσιμεντένιες λεκάνες για μείωση του κινδύνου μόλυνσης του περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ