



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 28.04.2016  
Αριθ. πρωτ: 3742/43018**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκόιλη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 254  
e-mail: [dpitarokili@minagric.gr](mailto:dpitarokili@minagric.gr)**

**Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ  
Λ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα Αττικής**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60265 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA OPTI 8/40 SC ως προς το φάσμα δράσης»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44, 45 και 46 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2016/67 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία chlorothalonil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1146/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών ανθρακινόνη, benfluralin, bentazone, bromoxynil, **chlorothalonil**, famoxadone, imazamox, βρωμιούχο μεθύλιο, propanil και θειικό οξύ μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
6. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 3742/43018/08.04.16 σχετική αίτηση της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **60265** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ORTIVA OPTI**, η οποία που χορηγήθηκε με την αριθ. 180977/11.02.2010 Απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης.

**Συγκεκριμένα το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:**

5						
5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
-Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe cichoraceorum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )  <b>Περωνόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Τομάτα (Βιομηχανική)	<b>Περωνόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> )	200-250	-	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe cichoraceorum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )  <b>Περωνόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται..
-Κολοκύθι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Erysiphe cichoraceorum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )  <b>Περωνόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	80-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες εφόσον απαιτείται
<b>Παρατηρήσεις:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή.(προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη(συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).</li> <li>Εφαρμόστε το ORTIVA OPTI 8/40 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.</li> </ul>						

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 180977/11.02.2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο Προϊστάμενος  
της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**