



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ**

Αθήνα, 13/5/2016 -
Αριθ.πρωτ: 2282

Προς: ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α'
Χαλάστρα ΤΚ 57300
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STAM FLO 48 SC (δ.ο. propanil) για χρήση στο ρύζι, για την καταπολέμηση της κύπερης

Κοιν BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λ. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0, 1 February 2013 σχετικά με την εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009/ΕΚ.
4. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τις με αριθ. πρωτ. 2016/22890/23-02-2016 και 4360/49990/22.04.2016 αιτήσεις της ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α' και της BASF Hellas αντίστοιχα.
6. Τη με αριθ. 2016/22890/26.4.16 Απόφασή μας, με θέμα “απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STAM FLO 480 SC(δ.ο. propanil) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 για την καταπολέμηση της κύπερης στο ρύζι”.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4526/51863/28.4.2016 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ Χαλάστρας Α'.
8. Το με ημερομηνία 10-05-2016 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο κάνουμε αποδεκτή τη με αριθ. 4526/51863/28.4.2016 ιεραρχική προσφυγή του ΑΣ Χαλάστρας Α'.

Α ποφασίζοντες

A Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STAM FLO 480 SC (δ.ο. propanil) για χρήση από τους αναφερόμενους στον Πίνακα 1, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70041

Ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
120 ημέρες από την υπογραφή της παρούσας

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

STAM FLO 480 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Propanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97 % (β/β) min
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	United Phosphorus Limited The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, United Kingdom
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	United Phosphorus Limited India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης

Οι αναφερόμενοι στο σημείο Α

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Α. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή.
Τηλ.: 210-6860100
Fax: 210-6860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

United Phosphorus Limited
The Centre, Birchwood Park,
Warrington, WA3 6YN,
United Kingdom

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	United Phosphorus Limited Sandbach, Cheshire – CW11 3QQ, United Kingdom
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος	United Phosphorus Limited Sandbach, Cheshire – CW11 3QQ, United Kingdom
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία 48% β/ο Βοηθητικές ουσίες 58,6% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή δοχεία	1 λίτρο, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 20 λίτρα και 25 λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του στραγγισμένου ορυζώνα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Αραιώνουμε τη δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το ψεκαστικό κατά το 1/3 και προσθέτουμε την προδιάλυση του φαρμάκου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό.

Συνδιαστικότητα: το STAM FLO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μείγμα με τα περισσότερα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στους ορυζώνες , πλην των οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων και δεν πρέπει να ψεκάζεται πριν και μετά από 5 ημέρες από τη χρήση των εν λόγω προϊόντων. Η μη τήρηση των εν λόγω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και άλλα συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το STAM FLO 480 SC είναι ένα μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Η δράση του επιτελείται τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, δευτερευόντως, δια της διασυστηματικής οδού.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευασμάτος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής ¹	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο ²
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Pύζι	Κύπερη (Cyperus spp),	100	-	20-50	Μεταφυτωτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	2 εφαρμογές Μεσοδιάστημα ψεκασμών: 15 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα ζιζάνια εμφανίζουν τη μέγιστη ευαισθησία στο STAM FLO 480 SC όταν βρίσκονται στο στάδιο μεταξύ των κοτυληδόνων και του 1ου-2ου πραγματικού φύλλου. Το STAM FLO 480 SC είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης.
- Η εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου πρέπει να γίνεται με τον ορυζώνα στεγνό. Στεγνά πρέπει να είναι και τα ζιζάνια και συνεπώς η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες ή προς το βράδυ, όταν η βλάστηση καλύπτεται από δρόσο. Μετά την εφαρμογή ο ορυζώνας πρέπει να παραμείνει στεγνός τουλάχιστον 24 ώρες. Αποφύγετε την εφαρμογή εάν υπάρχει πρόβλεψη βροχόπτωσης εντός 6-8 ωρών.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Χάρη στον ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης της, η δραστική ουσία προσφέρεται για τον έλεγχο πληθυσμών ζιζανίων που έχουν αποκτήσει αντοχή (ή εκ φύσεως χαμηλής ευαισθησίας) στη δράση των αναστολέων ALS και ACCase.

Τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μη εφαρμόζετε στους ορυζώνες οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά φυτοφάρμακα ή λίπασμα.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Αποφύγετε την πρόσβαση ανθρώπων και ζώων το εικοσιτετράωρο μετά την εφαρμογή.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθήσιας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις ενδεδειγμένες δοσολογίες χρήσης, το STAM FLO 480 SC δεν προκαλεί την εμφάνιση φυτοτοξικών συμπτωμάτων στο ρύζι. Οι εφαρμογές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ημέρες χωρίς άνεμο, έτσι ώστε το νέφος ψεκασμού να μη μεταφέρεται σε ευαίσθητες γειτονικές καλλιέργειες: μηδική, τριφύλλι, αρακάς, φασόλι, οπωρώνες, αμπέλια και κηπευτικά γενικώς.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:



ΠΡΟΣΟΧΗ

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ NEPO ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Συμπτώματα: Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους. Πιθανή ευαισθητοποίηση. Με κατάποση προκαλεί ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Πιθανή αιματική δυσκρασία με σκουρόχρωμα ούρα. Θεραπεία συμπτωματική
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	30

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία πάνω από 0 °C.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα καθώς και τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ εάν περιέλθει σε γνώση των οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται να αποστείλει στην οικεία ΔΑΟΚ και στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ το αργότερο εντός (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:
 - α) την έκταση του προβλήματος (αριθμός στρεμμάτων, περιοχή)
 - β) την ένταση του προβλήματος (ποσοστό προσβολής και απώλειας παραγωγής), πριν και μετά από την κάθε χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
 - γ) Σε περίπτωση διαχείρισης ανθεκτικότητας, ανάλογα με το είδος αυτής, την καταγραφή της (είδος και ποσοστό ανθεκτικών ζιζανίων στην περιοχή εφαρμογής)
 - δ) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και
 - ε) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση έγκρισης, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπομένης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα στο άρθρο 10 σημείο η.

ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Πίνακας 1, STAM FLO

1	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α'
2	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β'
3	Α' ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
4	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5	AGROASSIST
6	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ
7	ΠΕΤΡΟΥΣΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
8	ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9	ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΓΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.
10	ΑΓΓΕΛΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11	ΚΟΥΜΑΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12	"ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤ. ΣΩΤΗΡΗΣ
13	ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
14	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.
15	ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε.
16	"περί αγρών..." ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ. – ΧΑΝΤΕ Ο.Ο.Ε.
17	ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΖΗΣΗΣ
18	ΤΣΑΟΥΣΗΣ του ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19	ΛΩΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20	ΚΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
21	ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
23	AGROLIFE