



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 18-05-2016

Αριθ. πρωτ: 5110/57827

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: Rotam Agrochemical Europe Limited
Ηνωμένο Βασίλειο
(δια της εταιρείας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ,
Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ODIN 25 EW (δραστική ουσία: tebuconazole)
2. Ανάκληση της με αριθ. 60.235 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης}-10-2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tebuconazole.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστ. προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.

9. Τη με αριθ. 60.235 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ODIN 25 EW (δραστική ουσία: tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με τη αριθ. 125385/19.12.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 185874/7.6.10, 8447/84934/15.10.12 και 1569/20189/29.7.14 Αποφάσεις μας.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 2020/23634/28.2.12 σχετική αίτηση της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για λογαριασμό της εταιρείας Rotam Agrochemical Europe Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο.
11. Το με αριθ. ΕΜΠ 1502/23.12.15 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ οι απαντητικοί πίνακες και τα τελικά αναθεωρημένα τμήματα Β και Γ της έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος.
12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β' 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ODIN 25 EW** (δραστική ουσία: tebuconazole). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.530
18.05.2016
31.08.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

ODIN 25 EW
Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	tebuconazole
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	min 98 % (w/w)
Χημική ομάδα	τριαζολών
Παρασκευαστής	<p>Rotam Agrochemical Co Ltd Unit 6 26/F Trend Centre 29 Cheung Lee Street Chai Wan, Hong Kong Κίνα Dr Yifan WU TEL: +86 (512) 577 186 94 Fax: +86 (512) 577 115 23 E-mail: yifanwu@rotam.com</p> <p>European office: Rotam Agrochemical Europe Ltd. Hamilton House, Mabledon Place London, WC1H 9BB, UK General and Commercial Enquiry TEL: +33 (0) 427 02 73 33 Fax: +33 (0) 427 02 73 41 e-mail: contacteu@rotam.com</p>

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της: She Yang HunagHai Pesticide & Chemical Industry Co.Ltd. Liuduo Chemical Industry Zone Sheyang, Jiangsu Province, Κίνα Jiangsu Fengdeng Pesticide Co., Ltd. Dengguan Market Town, Zhixi Town, Jintan, Jiangsu Province, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας tebuconazole- Rotam Agrochemical Europe Limited όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 31.08.09 (Αρ. Πρ. ΥΑΑ & Τ 132107) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Rotam Agrochemical Europe Limited,
 Hamilton House, Mabledon Place
 London, WC1H 9BB
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Dr. Thierry GROLLIER
 Τηλ: +33 (0) 628 43 33 66
 Fax: +33 (0) 427 02 73 41
 e-mail: tgrollier@rotam.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουζιδάκης Αντώνιος ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 Ξενίας 1 , 115 27, Αθήνα
 Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174
 Fax: 210 7471009
 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,
 Τ.Κ.570 22
 Τηλ.: 2310 796556
 Φαξ: 2310 796506
 E-mail:

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Rotam Agrochemical Co Ltd
 26/F, E-Trade Plaza
 24 Lee Chung Street
 Chai Wan, Hong Kong, Κίνα

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd,
 No. 88 Longdeng Road
 Kunshan 215301, Jiangsu, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd,
 No. 88 Longdeng Road
 Kunshan 215301, Jiangsu, Κίνα
2. LOODS VABIX ,
 Driemanssteeweg 560,3084 CB,

Rotterdam – Ολλανδία

3. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,
Τ.Κ.570 22στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:Δραστική ουσία **Tebuconazole** 25 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 74,75 % β/βΗ πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος
παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας.
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα
αρχεία της ΣΕΑ.**2** Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου	Fluorinated πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (F-HDPE)
3	Δοχείο	2, (2,5), 3, 4, 5, 10 και 20 λίτρων	Fluorinated πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (F-HDPE)


3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.**Συνδυαστικότητα:** --**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.**4** Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs).

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.	Κ.εκ. / στρέμμα		
Ελιά (επιτραπέζιες και για λάδι)	Κυκλοκόνιο (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	60	50 – 125	30 - 75	Εφαρμογή πριν την ανθοφορία	1
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	Νίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	40	50-100	20 - 40	Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής	3 /14
Τομάτα (θερμοκηπίου)	Νίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	50	50 – 100	25 - 50	Εφαρμογές με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής από το στάδιο των 3 φύλλων	2 /7 - 10
Αγγούρι, Αγγουράκι (θερμοκηπίου)	Νίδιο (<i>Erysiphe chioracearum</i>) (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	50	50 - 100	25 – 50	Εφαρμογές με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής από το στάδιο των 10 φύλλων	2 /7 - 10
Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου)	Νίδιο (<i>Erysiphe chioracearum</i>) (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	50	50 - 100	25 – 50	Εφαρμογές με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής από το στάδιο των 10 φύλλων	2 /7 - 10
Κολοκύθα (θερμοκηπίου)	Νίδιο (<i>Erysiphe chioracearum</i>) (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	50	50 - 100	25 – 50	Εφαρμογές με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής από το στάδιο των 10 φύλλων	2 /7 - 10
Πεπόνι (θερμοκηπίου)	Νίδιο (<i>Erysiphe chioracearum</i>) (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	50	50 - 100	25 – 50	Εφαρμογές με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής από το στάδιο των 10 φύλλων	2 /7 - 10
Καρπούζι (θερμοκηπίου)	Νίδιο (<i>Erysiphe chioracearum</i>) (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	50	50 - 100	25 – 50	Εφαρμογές με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής από το στάδιο των 10 φύλλων	2 /7 - 10
Σπαράγγι	Σκωρίαση (<i>Puccinia asparagi</i>) Καστανή κηλίδωση (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	50	60-100	30 - 50	Μετά τη συγκομιδή, με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής	2 /7 - 10

Σιτάρι	Οίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i> , <i>Puccinia striiformis</i>) Σεπτωρίαση (<i>Septoria tritici</i>)	--	20 – 40	100	Εφαρμογή από το τέλος του αδελφώματος έως την άνθηση	1
	Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>)				Εφαρμογή το Καλοκαίρι από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	
Κριθάρι	Οίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>) Σκωρίαση (<i>Puccinia hordei</i> , <i>Puccinia striiformis</i> , <i>Puccinia recondita</i>) Σεπτωρίαση (<i>Septoria spp.</i> , <i>Septoria tritici</i>) Ρύγχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium teres</i>) Καστανή κηλίδωση (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	--	20 – 40	100	Εφαρμογή από το τέλος του αδελφώματος έως την άνθηση (Άνοιξη - Καλοκαίρι)	1
	Φουζαρίωση (<i>Fusarium spp.</i>)				Εφαρμογή το Καλοκαίρι από την αρχή έως το τέλος της άνθησης	
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.						
5.1.1.Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		Κ.εκ/ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.	Κ.εκ/ στρέμμα		
Πιπεριά (θερμοκηπίου)	Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	50	50 – 100	25 - 50	Εφαρμογές με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής από το στάδιο των 3 φύλλων	2 / 7 - 10
Αγκινάρα	Οίδιο (<i>Leveillula taurica</i>)	50	80 – 100	40 - 50	Με τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής	2 – 3/7 - 10
Ρύζι	Πυρικουλάρια (<i>Pyricularia oryzae</i>) Ελμινθοσπορίωση (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	--	20 – 40	100	Εφαρμογές από το τέλος του αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης	1

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του ODIN 25 EW μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.</p>
<p>7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p>	
<p>- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας</p>	<p>--</p>
<p>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</p>	<p>--</p>
<p>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα</p>	<p>Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (48 ώρες)</p>
<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.</p>
<p>9 Σήμανση σκευάσματος:</p>	<div style="text-align: center;">  <p>GHS07 GHS08 GHS09 ΠΡΟΣΟΧΗ</p> </div>
<p>10 Δηλώσεις επικινδυνότητας</p>	<p>H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
<p>11 Δηλώσεις προφύλαξης</p>	<p>P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P260: Μη αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. «Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, μπότες και ολόσωμη φόρμα την εφαρμογή» «Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, μπότες και γάντια» Συνιστάται η εφαρμογή σε ελιές να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων σε αμπέλι 10 μέτρων σε ελιά, καρποφόρα λαχανικά, σπαράγγι</p>

10 – 12 μέτρων με φυτική κάλυψη στα σιτηρά .

ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) tebuconazole

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ελιά (επιτραπέζιες και για λάδι)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	14 ημέρες
Τομάτα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι (θερμοκηπίου)	3 ημέρες
Κολοκύθα, Καρπούζι	7 ημέρες
Σπαράγγι	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Σιτάρι, Κριθάρι	28 ημέρες

*Υπό τις προϋποθέσεις του σημείου 5.1.1. παραπάνω.

Πιπεριά (θερμοκηπίου)	3 ημέρες
Αγκινάρα	7 ημέρες
Ρύζι	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες >0°C και < 30 °C. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- A Validation of the analytical method A-74-06-14 for grapes

Β. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιαδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. **60.235** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ODIN 25 EW (δραστική ουσία: tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με τη αριθ. 125385/19.12.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 185874/7.6.10, 8447/84934/15.10.12 και 1569/20189/29.7.14 Αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς της επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά το πέρας των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω), θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Προϊσταμένη
της Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ