



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27 - 5 - 2016
Αριθ.πρωτ: 1780/20442

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
(δια της εταιρείας
Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
15343 Αγία Παρασκευή)
e-mail: info@gr.nufarm.com

- ΘΕΜΑ: Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) PROLECTUS (fenpyrazamine 50% β/β)
Β. Ανάκληση της με αριθ. 60.407 έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PROLECTUS (fenpyrazamine 50% β/β)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 595/2012 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2012 για την έγκριση της δραστικής ουσίας fenpyrazamine, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

7. Την με αριθμό 2140184 έγκρισή του στην Γαλλία.
8. Την με αριθ. πρωτ. 4701/53386/6-5-2016 εισήγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ).
9. Την υπ' αριθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β'/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
10. Τις από 17-2-2016 και 11-6-2015 αιτήσεις της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PROLECTUS της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60535
27-5-2016
31-12-2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

Prolectus
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO

Fenpyrazamine

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

94.00 %β/β min

Χημική ομάδα

Παράγωγο Pyrazolinone

Παρασκευαστής

Sumitomo Chemical Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-Chome Chuo-ku Tokyo 104-8260, Ιαπωνία Τηλ: +81 3 5543 5703 Fax: +81 3 5543 5929

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Saltigo GmbH Building H12, D-51369 Leverkusen, Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fenpyrazamine όπως προσδιορίζονται στο Part C της

αίτησης, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
 Parc d'Affaires de Crécy - 10A
 Rue de la Voie Lactée
 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία
 Τηλ.: +33 478 64 32 57
 Fax: +33 478 78 47 25 45
 E-mail: Florence.roux@sumitomo-chem.fr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
 Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
 153 43, Αγία Παρασκευή
 Τηλ: 210 6990932
 Fax: 210 6990862
 E-mail: info@gr.nufarm.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
 Parc d'Affaires de Crécy - 10A
 Rue de la Voie Lactée
 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία
 Τηλ: +33 (0) 478 64 4876
 Fax: +33 (0) 478 47 2545

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
1-SBM Formulation
 CS-621, Avenue J. Foucault Z.I., F-34535 Béziers
 Γαλλία

2-Indalva, S.L.
 CTRA. La Mantaza, km 0.5, P.O. Box 160
 03300 Orihuela (Alicante)
 Ισπανία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1 SBM Formulation
 CS-621, Avenue J. Foucault Z.I., F-34535 Béziers
 Γαλλία

2 Indalva, S.L.
 CTRA. La Mantaza, km 0.5, P.O. Box 160
 03300 Orihuela (Alicante)
 Ισπανία

3 K&N Ευθυμιάδη
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσσαλονίκη, 570 22, Σίνδος

4

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 50 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 46.8 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 5466/65074/11-6-2015 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασία(ες)

1.2 Συσσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες & Δοχεία	80, 120, 160, 200, 240, 250, 500, 600 γρ. 1, 1.2, 2.4, 3, 5 χλγρ	PEHD

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Να γίνεται ομοιόμορφη καλή διαβροχή του φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τα 2/3 του επιθυμητού όγκου και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Prolectus και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό.

Εφαρμόστε το ψεκαστικό υγρό αμέσως μετά την παρασκευή του και όχι σε διάστημα μεγαλύτερο από 6 ώρες μετά την παρασκευή του. Η ανάδευση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. Ρυθμίστε την ανάδευση για την αποφυγή σχηματισμού αφρού.

Συνδυαστικότητα: Μη το χρησιμοποιείτε σε μίγματα με Karathane Gold και Profiler. Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να πραγματοποιείται προηγουμένως δοκιμή μικρής κλίμακας.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστικού. Μετά την εφαρμογή, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τις εξωτερικές επιφάνειες ξεπλένοντας με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε τις εσωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε τα νερά του ξεπλύματος μέσα από την αντλία και τους αυλούς. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό. Πλύνετε με κατάλληλο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με νερό. Απορρίψτε τα απόβλητα με ασφάλεια.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μυκητοκτόνο με διελασματική κίνηση και προληπτική δράση που παρεμποδίζει την επιμήκυνση των βλαστικών υφών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Η δραστική ουσία fenpyrazamine δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης.
---------------------------------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ/τος αριθμός εφα/γών ανά καλ/κή περίοδο
		γρ/ 100 λτ. ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λτ. / στρ.	γρ/ στρ. (max)		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Νεκταρινιά	Φαιά Σήψη Ανθέων και Βλαστών <i>Monilia laxa</i> Φαιά Σήψη Καρπών <i>Monilia fructigena</i>	80-120	100	80 120	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση (BBCH61-87)	Μέχρι 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i>	80-120	80-100	120	Ψεκασμός φυλλώματος από την έναρξη της άνθησης έως και την ωρίμανση (BBCH61-87) Συνίσταται να εφαρμόζεται κατά την πτώση των πηλιδίων έως το κλείσιμο της σταφυλής.	1
Φράουλα (Y&Θ)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i>	80-120	50-120	120	Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή (BBCH 61-87)	Μέχρι 3 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Λαχανικά Θ Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά,	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i>	80-120	60-120	120	Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή (BBCH 61-87)	Μέχρι 3 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κολοκυνθοειδή Θ Αγγούρι, Κολοκυθάκι	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i>	80-120	60-120	120	Εφαρμογή από την έναρξη της άνθησης έως και τη συγκομιδή (BBCH 61-87)	Μέχρι 3 με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

- Προσοχή: Οι δόσεις στο εκατόλιτρο να εφαρμόζονται με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού έτσι ώστε η μέγιστη δόση του Prolectus να μην υπερβαίνει τα 120 γρ. / στρέμμα.

2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας και της πίεσης προσβολής. Για μικρή πίεση προσβολής χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση ενώ σε μεγάλη πίεση τη μεγάλη.
3. Προτείνεται η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται προληπτικά.
4. Να εφαρμόζεται πάντα στη συνιστώμενη δοσολογία και να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
5. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.
6. Στο αμπέλι συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται κατευθυνόμενα στη ζώνη που βρίσκονται τα σταφύλια.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα ΙΙ](#).

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Να εφαρμόζεται σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης και με τα οποία δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
2. Περιορίσετε τον αριθμό των εφαρμογών Prolectus ή σκευασμάτων με δραστικές ουσίες της ίδιας χημικής ομάδας σε 1 ανά 3 εφαρμογές σε σχέση με το σύνολο των εφαρμογών που πραγματοποιούνται ανά καλλιεργητική περίοδο για τον έλεγχο του βοτρώτη (εντός του μεγίστου ορίου των 3 εφαρμογών / έτος).
3. Στο αμπέλι, να εφαρμόζεται ένα μόνο σκεύασμα με δραστική ουσία της ίδιας χημικής ομάδας ανά έτος. Επιπλέον συνίσταται η χρήση σκευασμάτων διαφορετικής χημικής ομάδας ανά έτος ειδικά στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται μια μόνο εφαρμογή για τον έλεγχο του Βοτρώτη.
4. Ψεκάζετε με ήπιο καιρό, χωρίς άνεμο, προκειμένου να αποφευχθεί διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες ή ρέματα.
5. Το pH του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να είναι μικρότερο από 8.5, με ιδανική τιμή το 7.


7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν περάσουν 8 ώρες από την εφαρμογή του για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη και 6 ώρες για τις καλλιέργειες αγρού.

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι απολύτως εκλεκτικό στις οινοποιήσιμες ποικιλίες του αμπελιού στις οποίες έχει δοκιμαστεί. Εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, δεν έχει καμία επίδραση στη διαδικασία ζύμωσης και στα ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού.
9	Σύμβολα κινδύνου	 Προσοχή
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</p>
11.	Δηλώσεις προφύλαξης – πρόληψη & απόκριση	<p>P102 Μακριά από παιδιά</p> <p>P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο</p> <p>P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν</p> <p>P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία, και κατάλληλες μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος, κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία και γάντια εάν πρέπει να εισέλθουν στο ψεκασμένο αγρό αμέσως/σύντομα μετά τον ψεκασμό.</p> <p>SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.</p> <p>SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά νερά.</p>

12. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα επιμείνουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό και σαπούνι. Πλύνετε το ρουχισμό πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό για αρκετή ώρα. Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από τον τους οφθαλμούς για να διασφαλίσετε ενδελεχές ξέπλυμα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εφόσον υπάρξει ερεθισμός.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτε δια στόματος σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.

Συμβουλές προς το γιατρό: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRL στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά	1
Αμπέλι:	
Επιτραπέζια	7
Οινοποιήσιμα	14
Φράουλα (Υ & Θ)	1
Λαχανικά Θ (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά)	1
Κολοκυνθοειδή Θ με βρώσιμο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκυθάκι)	1

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα. Η θερμοκρασία να υπερβαίνει πάντα τους -10°C. Στις συνθήκες αυτές, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο [Παράρτημα III](#) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ και το ΜΦΙ τα απαιτούμενα στοιχεία φυτοτοξικότητας και απουσίας δυσμενών επιδράσεων στα ποιοτικά/οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των επιτραπέζιων σταφυλιών σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 2 ετών να προσκομίσει στην ΣΕΑ την αξιολόγηση των περαιτέρω στοιχείων που ζητήθηκαν και κατατέθηκαν στην εισηγήτρια χώρα (Γαλλία).

B

Ανακαλούμε τη με αριθ. 60.407 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PROLECTUS, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 2977/33987/13-3-2014 Υπουργική Απόφαση.
Συγκεκριμένα:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς της επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες (έως 27-8-2016).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως 27-11-2016).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω. (έως 27-11-2017).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά το πέρας των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω), θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ