



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 11-12-2018  
Αριθ. πρωτ: 12814/171995**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ**  
**TELEFAX: 210 92 12 090**  
**Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος, Δ. Καραμάνου**  
**Τηλέφωνο: 210 928 7211, 2109287228**  
**e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**  
**dkaramanou@minagric.gr**

**Προς: AQQUOS S.L., Ισπανίας**  
**(δια της εταιρείας:**  
**ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ**  
**Μουρούζη 9, 10674-Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ AQQUOS 50 WP (δραστική ουσία: *copper oxychloride*)**  
**2. Ανάκληση της αριθ. 6469 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *copper oxychloride*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Την επανεγκριση του σκευάσματος COURE VALLES 50 WP.
8. Την αριθ. πρωτ. 5928/62215/29.5.12 αίτηση της εταιρείας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ για λογαριασμό της εταιρείας AQQUOS S.L. Ισπανίας.
9. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,

Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑQQUOS 50 WP** (δραστική ουσία: *copper oxychloride*), με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

60739

11-12-2018

31-01-2020

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

**ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑQQUOS 50 WP**

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)

**1.3 Δραστική ουσία:**

|  |  |
|--|--|
| Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας:   | <b>Copper oxychloride</b>  |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | <b>94% (β/β) min<br/>(σε Cu 56%)</b>   |
| Χημική ομάδα:  | <b>Ανόργανες ενώσεις χαλκού<br/>(Inorganic copper compounds)</b>   |
| Παρασκευαστής:   | <b>INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.</b><br>Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles,<br>Barcelona, SPAIN.  |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:  | <b>INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.</b><br>Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles,<br>Barcelona, SPAIN.  |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:                                  | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Copper oxychloride όπως έχουν κατατεθεί κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 12/11/2009 (Α.Π. ΥΑΑΤ 134046) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής |

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:**

α) Κάτοχος της άδειας:

**AQQUOS S.L.**

Garbí 3, Polígono Industrial Can Volart, 08150

Parets del Vallès, Barcelona, SPAIN.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.**, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

Τηλ.: 210 7236700, Fax: 210 7236410, Email: info@anorgachim.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου, 71601 Ηράκλειο Κρήτης.

Τηλ.: 2810 380758 Fax: 2810 381738

Email: info@agrochemsofcrete.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.**

Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, SPAIN.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

**INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.**

Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, SPAIN.

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

**1) INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.**

Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, SPAIN.

**2) ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου, 71601 Ηράκλειο Κρήτης.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Μεταλλικός χαλκός 50% β/ο (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)  
 Βοηθητικές ουσίες 10,71% β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2. Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες: σύνολο συσκευασιών : εννέα (9)

| A/A | Είδος                 | Μέγεθος                           | Υλικό   |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 1   | Φάκελος               | 60 γρ.                            | Πλαστικό ή Αλουμίνιο ή τριπλό τοίχωμα (πλαστικό/πλαστικό/αλουμίνιο)                                       |
| 2   | Σακούλα μέσα σε κουτί | 800 γρ., 1 κιλό                   | Σακούλα πολυαιθυλενίου (PE), κουτί χάρτινο  |
| 3   | Σακούλα               | 800 γρ., 1 κιλό                   | Σακούλα πολυαιθυλενίου (PE)   |
| 4   | Σάκος                 | 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά | Σάκος πολυαιθυλενίου (PE) ή χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων με την εσωτερική στρώση από πολυαιθυλένιο (PE). |

## 3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (φάκελοι, σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

| 5. Φάσμα δράσης   |   |                                       |                                   |                           |   |  |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|
| Καλλιέργειες  | Ασθένειες   | Δόσεις                                |                                   |                           | Χρόνος εφαρμογής  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα πεμβάσεων (ημέρες) |
|   |   | γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρό | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμ.) | γρ. σκευάσματος / στρέμμα |   |  |
| <b>ΕΣΠΕΡΙΑΘΕΙΑΗ</b><br>Γκρέιπ φρουτ CIDPA,<br>Λεμονιά CIDLI,<br>Πορτοκαλιά CIDSΙ,<br>Μανταρινιά CIDRE | Ανθράκωση<br>( <i>Colletotrichum gloesporioides</i> )<br>GLOMCI,<br>Σεπτορίωση<br>( <i>Septoria sp.</i> )<br>SEPTSP<br><br>Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών<br>( <i>Pseudomonas syringae</i> )<br>PSDMSY | 190                                   | 125-200                           | 240-380                   | Με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.<br><br>Το Φθινοπώρο, πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χαλάζι ή παγετό.  | 2  |
| Φιστικιά<br>PIAVE   | Σεπτορίωση<br>( <i>Septoria sp.</i> )<br>SEPTSP   | 160                                   | 100-125                           | 160-200                   | α. Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης,<br>β. όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ.<br>γ. μετά από 20 ημέρες<br>δ. αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών.   | 4  |
| <b>ΜΗΛΘΕΙΑΗ</b><br>Μηλιά MABSD,<br>Αχλαδιά PYUCO,<br>Μουσμουλιά ΕΙΟJA                                 | Φουζικλάδιο<br>( <i>Venturia inequalis</i> ,<br><i>Venturia pirina</i> )<br>VENTIN, VENPI   | 250                                   | 100                               | 250                       | Το φθινοπώρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.   | 3  |
| <b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ</b><br>Βερικοκιά PRNAR,<br>Κερασιά PRNAV,<br>Ροδακινιά PRNPS,<br>Δαμασκηνιά PRNDO      | Κορόνιο<br>( <i>Stigmina carpophila</i> )<br>STIGCA,<br>Εξώασκος<br>( <i>Taphrina deformans</i> )<br>TAPHDE<br><br>Φαιά σήψη<br>( <i>Sclerotinia laxa</i> )<br>MONILA   | 170                                   | 100-120                           | 170-200                   | Στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές<br>α) το φθινοπώρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και<br>β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.<br><br>Εφαρμογές στη διόγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. | 4  |

|   |   |     |        |         |   |   |
|---|---|-----|--------|---------|---|---|
| <b>ΑΜΠΕΛΙ</b><br>(για επιτραπέζια και οиноποιήσιμα σταφύλια) VITVI  | Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> ) PLASVI,<br>Ανθράκωση ( <i>Elsinoe ampelina</i> ) ELSIAM   | 260 | 50-100 | 130-260 | Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.   | 3 |
| <b>ΕΛΙΑ</b><br>OLVEU  | Κυκλοκόνιο ( <i>Cycloconium oleaginum</i> ,<br><i>Spilocaea oleagina</i> ) CYCLOL<br><br>Γλοιοσπόριο ( <i>Gleosporium olivarum</i> ) GLOMSI   | 260 | 150    | 390     | Δύο εφαρμογές : η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ.<br><br>Δύο εφαρμογές : Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. | 2 |
| <b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ:</b><br>Καρότο DAUCA,<br>Ραπάνι RAPSR,<br>Κρεμμύδι ALLCE,<br>Πιπεριά CPSAN,<br>Αγγούρι CUMSA,<br>Κολοκύθι CUUPE,<br>Πεπόνι CUMME,<br>Καρπούζι CITLA,<br>Πράσο ALLPO,<br>Κουνουπίδι BRSOB,<br>Λάχανο BRSOX,<br>Μαρούλι LACSA,<br>Σπανάκι SPQOL,<br>Ραδίκι CICIN,<br>Αγκινάρα CYUSC,<br>Σέλινο APUGV,<br>Φασόλι PHSVX,<br>Μπιζέλι PIBSX | Περονόσπορος ( <i>Peronospora sp.</i> ,<br><i>Bremia lactucae</i> ) PEROSP,<br>BREMLA<br><br>Ανθράκωση ( <i>Colletotrichum sp.</i> ) COLLSP,<br>Σεπτορίωση ( <i>Septoria sp.</i> ) SEPTSP | 240 | 50-100 | 120-240 | Από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες.<br><br>Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  | 3 |
| <b>ΤΟΜΑΤΑ</b><br>(Y+Θ)<br>LYPES   | Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) PHYTIN   | 250 | 50-100 | 125-250 | Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.   | 2 |
| <b>ΠΑΤΑΤΑ</b><br>SOLTU  | Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) PHYTIN   | 240 | 50-100 | 120-240 | Όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  | 2 |
| <b>ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ</b><br>BEAVA  | Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora beticola</i> ) CERCBE   | 350 | 40     | 140     | Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  | 3 |

**Παρατηρήσεις:**

- 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν τους την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής.
- 2) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
- 3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 4) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- 5) **Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).**

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

---

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

---

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

---

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

8. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

9. Εικονογράμματα κινδύνου:

Προειδοποιητική λέξη: **ΠΡΟΣΟΧΗ****GHS07, GHS09**

10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**H332:** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

11. Δηλώσεις προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/εκνεφώματα.**P264:** Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P312:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

- 11α. Συμπληρωματικές πληροφορίες EUH:

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 11β. Ειδικές φράσεις για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν:

**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.

Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

- 12.** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**Σε περίπτωση κατάποσης:** χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

**Αντίδοτο:** πενικιλλαμίνη. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.**

**13. Προστασία των καταναλωτών:**

**13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):**

| MRLs (mg/kg)  |
|---|
| Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα II του Κανονισμού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. |

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα                                       | Ημέρες  |
|---|---|
| Εσπεριδοειδή  | 21  |
| Φιστικιά  | 28  |
| Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα                                 | Μη Εφαρμόσιμο<br>(Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή) |
| Αμπέλι<br>(για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) | 21  |
| Ελιά  | 21  |
| Λαχανικά (Υπαίθρου + Θερμοκηπίου)                     | 7   |
| Τομάτα (Υπαίθρου)                                     | 10  |
| Τομάτα (Θερμοκηπίου)                                  | 7   |
| Πατάτα, Ζαχαρότευτλα                                  | 21  |

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεση ηλιακό φως.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

- 15** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B. Γενικές υποχρεώσεις:**

- Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
- Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ.
- Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
- Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
- Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την

|                               |
|-------------------------------|
| ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. |
|-------------------------------|

- Γ. Ανακαλούμε την αριθ. **6469** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑΡΧΟΥΣ 50 WP** (δραστική ουσία: *copper oxychloride*), και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
  2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
  3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
  4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
  5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**