



### ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31-12-2018  
Αριθ. πρωτ: 13529/179958

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ Προς: ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ ΑΒΕΕ  
TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ.  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος 57022-Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 40/4 DP (δρ. ου.: *sulphur+copper oxychloride*)  
2. Ανάκληση της αριθ. 60.067 άδειας διάθεσης στην αγορά »

### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) 9 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες *copper oxychloride* και *sulphur*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων,".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 40/4 DP**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης:

60813 31-12-2018 31-01-2020
-----------------------------------

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 40/4 DP

1.2.β Μορφή:

ΣΚΟΝΗ ΕΠΙΠΑΣΗΣ (DP)

**1.3 Δραστικές ουσίες:****Δραστική ουσία 1:**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας:	<b>copper oxychloride</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία	94% (β/β) min σε Cu 56%
Χημική ομάδα:	Ανόργανες ενώσεις χαλκού
Παρασκευαστής:	<b>INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.</b> Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Ισπανία.
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	<b>INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.</b> Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Ισπανία.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**Δραστική ουσία 2:**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας:	<b>sulphur</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία	99,5% (β/β) min
Χημική ομάδα:	---
Παρασκευαστής:	ZOLFINDUSTRIA srl, Via San Cassiano, 99 I-28069 San Martino di Trecate (NO), Ιταλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:	ZOLFINDUSTRIA Srl, Via Cantarana, 17-27043 San Cipriano Po (Pavia), Ιταλία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:**

α) Κάτοχος της άδειας:

**FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ.**

Τηλ.: 2310 569630-33, Fax:2310797047, E-mail: farmchem@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ.**

Τηλ.: 2310 569630-33, Fax:2310797047, E-mail: farmchem@otenet.gr

γ) Παρασκευαστής:

**FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ.**

Τηλ.: 2310 569630-33, Fax:2310797047, E-mail: farmchem@otenet.gr

δ) Εργοστάσιο παρασκευής:

**FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ.**

Τηλ.: 2310 569630-33, Fax:2310797047, E-mail: farmchem@otenet.gr

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας:

**FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ.**

Τηλ.: 2310 569630-33, Fax:2310797047, E-mail: farmchem@otenet.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Μεταλλικός χαλκός 4% σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού, Sulphur: 40% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 52,66% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2 Συσκευασίες:**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	1 κιλό έως και 5 κιλά	Σακούλα λαμιναρισμένη δύο φύλλων από πολυαιθυλένιο (PE) εσωτ. και πολυεστέρα (PET) εξωτ. ή Σακούλα λαμιναρισμένη (TRIPLEX) τριών φύλλων από πολυαιθυλένιο εσωτ. Aluminium foil (ενδιάμεσο) και πολυεστέρα εξωτ.
2.	Σάκος	10 κιλά έως και 25 κιλά	Σάκος λαμιναρισμένος δύο φύλλων από πολυαιθυλένιο (PE) εσωτ. και πολυεστέρα (PET) εξωτ. ή Σάκος λαμιναρισμένος (TRIPLEX) τριών φύλλων από πολυαιθυλένιο εσωτ. Aluminium foil (ενδιάμεσο) και πολυεστέρα εξωτ. ή Σάκος χάρτινος τρίφυλλος

<b>3</b>	Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. <u>Τρόπος εφαρμογής:</u> Με επίπαση, ως έχει. <u>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:</u> ---. <u>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:</u> Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
----------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.
----------	------------------------------	--------------------------------------------

**5 Φάσμα δράσης:**


Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος (κιλά / στρέμμα)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> UNCINE) Ακαρίαση ή Ερίνωση ( <i>Eriophies vitis</i> )	4-5	Μέχρι δύο (2) εφαρμογές στα ακόλουθα στάδια: α. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. β. Κατά την άνθηση. γ. Μετά το δέσιμο των ραγών και δ. κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του "γαλισματος" των ραγών και ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	2
ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Κολοκύθι (Y+Θ) CUUSS, Κρεμμύδι (Y+Θ) ALLCE	Ωίδιο, ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Sphaerotheca spp</i> SPHRSP, <i>Erysiphe spp</i> ERYSSP)  Περωνόσπορος ( <i>Phytophthora spp</i> PHYTSP, <i>Peronospora spp.</i> PEROSP)	3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  Εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογή στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.	3
Τομάτα (Y+Θ) LYPES, Μελιτζάνα (Y+Θ) SOLME, Μπάμια ABMES	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurina</i> , <i>Sphaerotheca sp.</i> SPHRSP, <i>Erysiphe sp.</i> ERYSSP)  Περωνόσπορος ( <i>Phytophthora spp</i> PHYTSP, <i>Peronospora spp.</i> PEROSP)	3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.  Στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας	2
Πεπόνι (Y+Θ) CUMME, Καρπούζι (Y+Θ) CITLA	Ωίδιο ( <i>Oidium sp.</i> OIDISP, <i>Erysiphe chichoracearum</i> )	3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.	3
Πατάτα SOLTU	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurina</i> )  Περωνόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) PHYTIN	3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.  Στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.	2

<u>Παρατηρήσεις:</u> 1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18° C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20° C. Μην το χρησιμοποιείτε μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού με εξαίρεση το αμπέλι όταν βρίσκεται σε χειμέρια νάρκη.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>7.</b>	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων, στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:	--- --- Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 μέρες.
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28 <sup>0</sup> C) παρουσιάζει εγκαύματα στα φυτά. Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>9</b>	<b>Εικονογράμματα Κινδύνου:</b>		<b>GHS07</b> <b>GHS09</b>
		<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	<b>Προσοχή</b>

<b>10</b>	<b>Δηλώσεις Επικινδυνότητας:</b>	<b>H315</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. <b>EUH401</b> Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
-----------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>11</b>	<b>Δηλώσεις Προφύλαξης:</b>	<b>P102+P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. <b>P261</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. <b>P262</b> Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. <b>P264</b> Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. <b>P362</b> Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. <b>P501:</b> Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. <b>SP1</b> Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.
-----------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>12</b>	<b>Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</b>	<u>Γενικές συμβουλές:</u> Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). <b>P302+P352</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. <b>P301+ P330+P311</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. <b>ΑΝΤΙΔΟΤΟ:</b> Πενικιλλαμίνη. <b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:</b> 210-77.93.777
-----------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**13. Προστασία των καταναλωτών:**

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή :	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
		Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια), Πατάτα
	Τομάτα, Μελιτζάνα (υπαίθρου)	10
	Τομάτα, Μελιτζάνα (θερμοκηπίου)	7
	Μπάμια	10
	Κολοκύθι, Κρεμμύδι, Πεπόνι, Καρπούζι (υπαίθρου-θερμοκηπίου)	7

14	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.	Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος δροσερό, καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από υγρασία και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο χρόνια.
----	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B.	<b>Γενικές υποχρεώσεις:</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.</li> <li>Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.</li> <li>Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ.</li> <li>Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.</li> <li>Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.</li> <li>Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.</li> <li>Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.</li> </ol>

Γ. Ανακαλούμε την αριθ. **60.067** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 40/4 DP** και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

- Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
- Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
- Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
- Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
- Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Δρ Δ. ΓΚΙΛΙΑΘΗ