



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21-12-2018
Αριθ. πρωτ: 13093/175161

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ **Προς:**
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

MANICA S.p.A. Ιταλίας
(δια του κ. Φαρίδη Γρηγόριου,
Λαβάκη 65, 17672-Καλλιθέα)

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) MANIFLOW 12,4 SC(δραστική ουσία: Bordeaux mixture)
 2. Ανάκληση της αριθ. 60.174 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *Bordeaux mixture*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **MANIFLOW 12,4 SC**(δραστική ουσία: *Bordeaux mixture*), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60788**21-12-2018****31-01-2020****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

MANIFLOW 12,4 SC

1.2.β Μορφή:

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας (ISO)	Bordeaux mixture
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία	94% (β/β) min (σε Cu 27%)
Χημική ομάδα	Ανόργανες ενώσεις χαλκού
Παρασκευαστής	MANICA SPA Via all' Adige, 4, 38068 Rovereto (Trento), ITALY
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	MANICA SPA Via all' Adige, 4, 38068 Rovereto (Trento), ITALY
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Bordeaux mixture όπως έχουν κατατεθεί κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης (12/11/2009). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

MANICA SPA

Via all' Adige, 4, 38068 Rovereto (Trento) - Italy

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Δαβάκη 65, 17672-Καλλιθέα

Τηλ: 210 8623144, Κινητό: 6948608599

E-mail: gregory@agriplus.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Δαβάκη 65, 17672-Καλλιθέα

Τηλ: 210 8623144, Κινητό: 6948608599

E-mail: gregory@agriplus.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

MANICA SPA

Via all' Adige, 4, 38068 Rovereto (Trento) - Italy

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

MANICA SPA

Via all' Adige, 4, 38068 Rovereto (Trento) - Italy

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

MANICA SPA

Via all' Adige, 4, 38068 Rovereto (Trento) – Italy

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες : Μεταλλικός χαλκός 12,4 % β/ο σε μορφή βορδιγάλειου πολτού.
 Βοηθητικές ουσίες: 63 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής ΣΕΑ

2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	100cc., 250cc., 300cc., 500cc., 600cc 1.000cc., 2.000cc.	HDPE (υψηλής πυκνότητας, πολυαιθυλένιο)
2.	Δοχεία	3 λίτρων, 5 λίτρων, 6 λίτρων, 10 λίτρων, 20 λίτρων.	HDPE (υψηλής πυκνότητας, πολυαιθυλένιο)
3.	Δοχεία	10 λίτρων	Τύπου POLITAINER (extruded LDPE)

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται με ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Ανόργανο μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο
		κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμ.	κ.εκ./ στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρειπ Φρουτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSL, Νεραντζιά CIDAU, Κιτριά CIDME, Φράπα CIDPA	Κορυφοξήρα (<i>Phoma tracheiphila</i>) DEUTTR Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών (<i>Pseudomonas syringae</i>) PSDMSY	645	200-250	1290-1612,5	Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.	2
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ PRNDU	Κορόνιο (<i>Stigmina carpophila</i>) STIGCA	650	100-150	650-975	Μία εφαρμογή το Φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μία το χειμώνα λίγο μετά την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνεται άλλη 1 εφαρμογή εφ' όσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.	3
Καρδιά IUGRE	Ανθράκνωση (<i>Marsonina juglandis</i>) GNOMLE	650	100-150	650-975	Συνιστώνται 3 εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 μέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση.	3
ΜΗΛΙΑ MABSD	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) VENTIN	900-1000	100-160	900-1600	Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στά στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	2
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Βερικοκιά PRNAR, Κερασιά PRNAV, Ροδακινιά PRNPS, Δαμασκηλιά PRNDO Βυσσινιά PRNCE	Εξώασκος (<i>Taphrina deformans</i>) TAPHDE Κορόνιο (<i>Stigmina carpophila</i>) STIGCA Φαιά σήψη (<i>Sclerotinia laxa</i>) MONILA	685	100-120	685-800	Προληπτικές εφαρμογές το Φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια.	4
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα και Επιτραπέζια σταφύλια) MABSD	Περνόςπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) PLASVI, Ανθράκνωση (<i>Elsinoe ampelina</i>) ELSIAM	900-1050	50-100	450-1050	Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την Άνοιξη όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών	3

ΕΛΙΑ OLVEU	Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum, Spilocaea oleagina) CYCLOL Γλοιοσπόριο (Gleosporium olivarum) GLOMSI Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi) PSDMSA	1000- 1050	150	1500- 1575	Δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το Φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την Άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. Δύο εφαρμογές Η πρώτη όταν αρχίσουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα Μετά από χαλάζι ή παγετό.	2
ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κρεμμύδι ALLCE Πιπεριά CPSAN Αγγούρι CUMSA Κολοκύθι CUUPE Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA, Κουνουπίδι BRSOB, Λάχανο BRSOX, Μαρούλι, Σπανάκι SPQOL, Σέλινο APUGV, Πράσο ALLPO Φασόλι PHSVX.	Περωνόσπορος (Peronospora spp., Phytophthora infestans, Pseudoperonos pora cubensis, Bremia lactucae) PEROSP, PHYTIN, PSPECU, BREMLA, Σεπτορίωση (Septoria spp.) SEPTSP Ανθράκνωση (Colletotrichum spp.) COLLSP Βακτηριώσεις (Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.) PSDMSP, XANTSP	565	50-80	280-450	Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.	4

ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) LYPES	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) PHYTIN Βακτηριακή κηλίδωση (<i>Xanthomonas campestris</i>) XANTCA	900-1000	50-80	450-800	Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της.	4
ΠΑΤΑΤΑ SOLTU	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) PHYTIN	900-1000	50-100	450-1000 (βαριά προσβολή) 280-450 (ελαφρά προσβολή)	Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20εκ και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	3
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥ-ΤΛΑ BEAVA	Κερκοσπορίωση (<i>Cercospora beticola</i>) CERCBE	900-1050	40	360-420	Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας.	4
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>) PEROSP Σεπτορίωση (<i>Septoria spp.</i>) SEPTSP Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>) PHYTSP	900-1050	50-100	450-1050	Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.	3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τη μηλιά και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλιά, αχλαδιά, Πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά, και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).**

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβατολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα

-
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους	Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηλιά αφού φουσκώσουν τα μάτια. Επίσης μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία). Φυτοτοξικότητα παρουσιάζει επίσης σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς. Στη μηλιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
--	---

9 Εικονογράμματα κινδύνου	ΠΡΟΣΟΧΗ	
----------------------------------	----------------	--

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.</p> <p>EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
------------------------------------	--

11 Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.</p> <p>P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.</p> <p>P285: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.</p> <p>EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.</p>
-------------------------------	--

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο ερεθισμός επιμείνει.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε πολύ καλά με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση παρατεταμένης εισπνοής: Δεν είναι δυνατή η εισπνοή του προϊόντος (σε μορφή υδατικού εναιωρήματος). Εάν παρουσιαστούν ύποπτα συμπτώματα μετακινήστε τον πάσχοντα από το σημείο της έκθεσης και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.</p> <p>Συμπτώματα: Μπορεί να προκαλέσει πόνο στο στόμα, και το φάρυγγα, ναυτία, διάρροιες, και/ή πτώση της αρτηριακής πίεσης.</p> <p>Αντίδοτο: Πενικιλλαμίνη.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>
--------------------------------------	---

13. Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)	Φυτικά προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει		

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	21
Ακρόδρυα: (Αμυγδαλιά, Καρυδιά)	28
Μηλιά, Πυρηνόκαρπα:	Μη Εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή)

Αμπέλι: (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	21
Ελιά:	21
Λαχανικά (υπαίθρου + θερμοκηπίου):	7
Τομάτα υπαίθρου:	10
Τομάτα θερμοκηπίου:	7
Πατάτα, Ζαχαρότευτλα	21

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

- 15** **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ. Ανακαλούμε την αριθ. **60.174** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **MANIFLOW 12,4 SC** (δραστική ουσία: *Bordeaux mixture*), και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ