



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02-05-2019
Αριθ. πρωτ: 4504/94835

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι
e-mail: www.cropscience.bayer.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Aspect 533 SC (flufenacet 200 g/L + terbuthylazine 333 g/L)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1262 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanate-methyl και tribenuron.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/291 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-ναφθυλακεταμίδιο, 1-ναφθυλοξικό οξύ, ακριναθρίνη, azoxystrobin, fluazifop p, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadione, prohexadione, spiroxamine, tefluthrin και terbuthylazine.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
8. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος ASPECT 533 SC στο ΚΜ Ιταλία (αριθ. έγκρισης: 11944).
9. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"
10. Την με αριθ. πρωτ. 5452/74343/24-05-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν Aspect 533 SC της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70332
02-05-2019
31-10-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **Aspect 533 SC**
1.2.β Μορφή: **Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	flufenacet
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	95,00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Οξυακεταμίδια
Παρασκευαστής	Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen, Γερμανία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Bayer CropScience LP 8400 Hawthorn Road Kansas City, MO 64120, USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών	terbuthylazine

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ουσίας/ών κατά ISO	
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98,00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Τριαζίνες
Παρασκευαστής	Oxon Italia S.p.A. Via Sempione, 195 20016 Pero (Milan), Ιταλία
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Oxon Italia S.p.A. Strada Provinciale Km 2.6 27030 Mezzana Bigli (PV), Ιταλία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20, Μαρούσι
ΑΜΕ: 2724 / 01ΑΤ / Β / 86 / 685
Τ.Κ. 151 25
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
E-mail: www.cropscience.bayer.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Bayer Ελλάς ABEE
Ταχ. Δ/ση: Σωρού 18-20, Μαρούσι
Τ.Κ.: 151 25
Τηλ.: 210 6166374
Fax: 210 6109100
E-mail: nikos.tsakalis@bayer.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer S.A.S., Division Crop Science
16, rue Jean-Marie Leclair
CS 90106, F-69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

1. Bayer AG
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt, Γερμανία
2. Bayer S.A.S., Division Crop Science
Site de Marle
Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2
02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle,
Γαλλία
3. Phyteurop S.A.
ZI de la Grande Champagne
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4. Schirm GmbH
Geschwister-Scholl-Strasse 127
39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
5. Bayer S.A.S., Division Crop Science
Industrial Operations – Villefranche
1 boulevard Edouard Herriot
69400 Villefranche-Limas, Γαλλία
6. Schirm GmbH
Wendessener Strasse 11c
38300 Wolfenbuttel, Γερμανία
7. Bayer CropScience LP
8400 Hawthorn Road
Kansas City, MO 64120, ΗΠΑ
8. Arysta Lifescience SAS
Av. Du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
9. Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstr. 26
21683 Stade, Γερμανία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Bayer S.A.S., Division Crop Science
Site de Marle
Rue Antoine Laurent de Lavoisier ZI BP2
02250 Marle-sur-Serre, Zone Industrielle,
Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:
flufenacet 200 g/L
terbuthylazine 333 g/L
Βοηθητικές ουσίες: 52,97 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε με την υπ' αριθ. 5452/74343/24-05-2018 αίτηση της εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2

Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/ Δοχείο	500 κ.εκ. έως 10 λίτρα	Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. Διατηρήστε την ανάδευση σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής, ακόμη και κατά τα διαλείμματα.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

Το Aspect 533 SC είναι εκλεκτικό και διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο και δρα κυρίως μέσω της απορρόφησής του από τις ρίζες των ζιζανίων που είτε μόλις έχουν βλαστήσει είτε έχουν αναδυθεί πρόσφατα. Επίσης, απορροφάται από τα φύλλα των αγρωστωδών ζιζανίων όταν βρίσκονται στο στάδιο των 1-2 φύλλων καθώς και των πλατύφυλλων ζιζανίων όταν βρίσκονται στο στάδιο των 2 φύλλων.

Περιέχει δύο (2) δραστικές ουσίες με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης μεταξύ τους.

Το **flufenacet** (χημική ομάδα οξυακεταμίδιων) είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και παρουσιάζει ακροπέταλη κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία τελικά νεκρώνονται.

Η **terbuthylazine** (χημική ομάδα χλωροτριαζινών) δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος II. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από τα φύλλα. Παρουσιάζει ακροπέταλη κίνηση και μεταφέρεται μέσω των αγγείων του ξύλου στα μεριστώματα και στα φύλλα του φυτού, παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος ¹		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος (ΖΕΑΜΧ)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια ^{2,3}	150 ή 225	20-40	Προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 00-12)	1

Παρατηρήσεις:

1. Η μικρότερη δόση (150 κ.εκ./στρ) να εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη και η μεγαλύτερη (225 κ.εκ./στρ.) σε βαριά εδάφη.

2. Προφυτρωτική εφαρμογή:**Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.***Acalypha virginica* (ACCVI)Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)Τάτουλας (*Datura stramonium*) (DATST)Γκαλινσόγκα (*Galinsoga parviflora*) (GASPA)Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*) (SENVU)Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis*) (SETVI)Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)Ζωχός (*Sonchus oleraceus*) (SONOL)**Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.***Όλα τα παραπάνω ζιζάνια, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι ζιζανίων:*Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*) (CAPBP)Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*) (DIGSA)Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (POLPE)Σύκιος (*Sicyos angulatus*) (SIYAN)Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)Πάνικο διχοτομικό (*Panicum dichotomiflorum*) (PANDI)Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) (ECHCG)**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.**Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense*) (SORHA)**2. Νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή:****Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.***Acalypha virginica* (ACCVI)Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*) (AMABL)Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)Τάτουλας (*Datura stramonium*) (DATST)Γκαλινσόγκα (*Galinsoga parviflora*) (GASPA)Λαπάτσα (*Polygonum lapathifolium*) (POLLA)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (POLPE)
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)
 Βερόνικα (*Veronica persica*) (VERPE)
 Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.

Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) (CYNDA)
Xanthium italicum (XANSI)

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

Τα ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση των 150 κ.εκ/στρ., συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι ζιζανίων:

Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*) (CAPBP)
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*) (SENVU)
 Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)
 Ζωχός (*Sonchus oleraceus*) (SONOL)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) (ECHCG)
 Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis*) (SETVI)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (ABUTH)
 Σύκιος (*Sicyos angulatus*) (SIYAN)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Σε εδάφη που έχουν κρατήσει νερό (π.χ. μετά από υψηλή βροχόπτωση), μην εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργεια που δεν έχει φυτρώσει ή βρίσκεται σε κατάσταση στρες.
 - Εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες σε καλή βλαστική κατάσταση.
 - Περίοδος ξηρασίας μετά την εφαρμογή μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα.
 - Συστήνεται να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε τύρφη.
 - Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.
- Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:
- Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο.
 - Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος χωρίς κάποια περίοδο αναμονής ή σόργο τουλάχιστον ένα μήνα μετά την εφαρμογή.

Μετά την εφαρμογή του Aspect 533 SC, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ακόλουθες καλλιέργειες:

- Σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, σόγια, μπιζέλια, ελαιοκράμβη, σινάπι, ηλίανθος και λινάρι: **6 μήνες**
- Ζαχαρότευτλα, καπνός: **10 μήνες**.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχετε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στην εγκεκριμένη καλλιέργεια, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ



10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208 Περιέχει flufenacet, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη διάρκεια ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

SP 1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe 2 Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο μεγαλύτερη του 80%.

SPe 3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείται μία φυτική ζώνη ανάσχεσης **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe 3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** μέχρι μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90%.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

P314 Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

P308 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με polyethyleneglycol 400 και στην συνέχεια με άφθονο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό, καθώς επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. ο παθών έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. δεν είναι άμεσα διαθέσιμη ιατρική βοήθεια, 3. έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα (περισσότερο από μία γουλιά) και 4. ο χρόνος που έχει περάσει από την κατάποση είναι λιγότερο από 1 ώρα. (Ο εμετός δεν πρέπει να εισχωρήσει στην αναπνευστική οδό.) Ξεπλύνετε το στόμα.

P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Θεραπεία: Θεραπεία συμπτωματική. Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα. Παρόλα αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου συνιστάται πάντα. Σε περίπτωση μεθαιμοσφαιριναϊμίας, πρέπει να χορηγείται οξυγόνο και ειδικά αντιδότα (methylene blue/ toluidine blue).

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777.

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αραβόσιτος	-

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Μην αποθηκεύετε το σκεύασμα σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 40 °C.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ