



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 17.12.2019  
Αριθ. πρωτ: 13169/314654**

<b>Ταχ. Δ/νση:</b>	<b>Λ. Συγγρού 150</b>	<b>Προς:</b>	<b>ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ</b>
<b>Ταχ. Κώδικας:</b>	<b>176 71 – ΑΘΗΝΑ</b>		<b>Εθνικής Αντιστάσεως 73</b>
<b>TELEFAX:</b>	<b>210 92 12 090</b>		<b>Τ.Κ. 15231, Χαλάνδρι</b>
<b>Πληροφορίες:</b>	<b>Κ. Μητσοπούλου</b>		
<b>Τηλέφωνο:</b>	<b>210 928 7165</b>		
<b>e-mail:</b>	<b>kmitsopoulou@minagric.gr</b>	<b>e-mail:</b>	<b>technical@alfagro.gr</b>

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 60882 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΖΑΚΕΟ EXTRA SC (azoxystrobin 20% β/ο + cyproconazole 8% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσοнос Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά, όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β΄ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.
5. Τη με αριθμό πρωτ. 8188/199369/16.08.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60882 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΖΑΚΕΟ EXTRA SC (azoxystrobin 20% β/ο + cyproconazole 8% β/ο).
6. Τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 13169/314654/04.12.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε τη με αριθ. 60882 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΖΑΚΕΟ EXTRA SC (azoxystrobin 20% β/ο + cyproconazole 8% β/ο) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 8188/199369/16.08.2019 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά, όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5 Φάσμα δράσης</b>						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Κριθάρι (HORVX)	Ωίδιο <i>Erysiphe graminis</i> (ERYSGR), Σκωρίαση <i>Puccinia hordei</i> (PUCCHD), Ελμινθοσπορίαση <i>Pyrenophora teres</i> (PYRNTE), Ρυγχοσπορίωση <i>Rhynchosporium secalis</i> (RHYNSE)	100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-59	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες Προληπτικά, πριν την προσβολή της ασθένειας και επανάληψη εάν χρειαστεί
Βρώμη (AVESA)	Ωίδιο <i>Erysiphe graminis</i> (ERYSGR), Σκωρίαση <i>Puccinia coronata</i> (PUCOCO), Ελμινθοσπορίαση <i>Pyrenophora avenae</i> (PYRNAV)	100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-59	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες Προληπτικά, πριν την προσβολή της ασθένειας και επανάληψη εάν χρειαστεί
Σίκαλη (SECCE)	Ωίδιο <i>Erysiphe graminis</i> (ERYSGR), Σκωρίαση	100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-59	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες Προληπτικά,

	<i>Puccinia recondita</i> (PUCCRE), Ρυγχοσπορίωση <i>Rhynchosporium secalis</i> (RHYNSE)					πριν την προσβολή της ασθένειας και επανάληψη εάν χρειαστεί
Σιτάρι (Σκληρό και μαλακό) (TRZDU, TRZAX)	Ωίδιο <i>Erysiphe graminis</i> (ERYSGR), Σκωριάσεις <i>Puccinia recondita</i> (PUCCRE) <i>Puccinia striiformis</i> (PUCST), Ελμινθοσπορίαση <i>Pyrenophora tritici-repentis</i> (PYRNTR), Σεπτοριώσεις <i>Septoria nodorum</i> (LEPTNO), <i>Septoria tritici</i> (SEPTTR)	100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 31-59	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες Προληπτικά, πριν την προσβολή της ασθένειας και επανάληψη εάν χρειαστεί
Ελαιοκράμβη (BRSNN) Καμελίνα (CMASA) Σινάπι (SINAL)	Αλτενάρια <i>Alternaria sp.</i> (ALTESP), Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sp</i> (SCLESP)	100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος 1 <sup>η</sup> εφαρμογή BBCH 61-70 2 <sup>η</sup> εφαρμογή BBCH 75-80	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες Προληπτικά, πριν την προσβολή της ασθένειας και επανάληψη εάν χρειαστεί
Ζαχαρότευτλα (BEAVA) Κτηνοτροφικά Τεύτλα (BEAVC)	Κερκοσπορίωση <i>Cercospora beticola</i> (CERCBE), Ωίδιο <i>Erysiphe betae</i> (ERYSBE), Ραμουλάρια <i>Ramularia beticola</i> (RAMUBE),	100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 39-45	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες Προληπτικά, πριν την προσβολή της ασθένειας και επανάληψη εάν χρειαστεί

	Σκωρίαση <i>Uromyces betae</i> ( <i>UROMBE</i> )					
Φασόλια (PHSVX) Μπιζέλια (PIBSX) <u>Χρήσεις</u> <u>ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Φακή* (LENCU) Ρεβίθια* (CIEAR) Κουκιά* (VICFX) Λαθούρι* / Φάβα* (LTHCL)	Σκωρίαση <i>Uromyces pisi</i> ( <i>UROMPS</i> ), Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sp.</i> ( <i>SCLESP</i> ), Ωίδιο <i>Erysiphe sp.</i> ( <i>ERYSSP</i> ), Ασκοχύτωση <i>Ascochyta sp.</i> ( <i>ASCOSP</i> )	100	--	20-40	Ψεκασμός Φυλλώματος BBCH 51-69	2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες Προληπτικά, πριν την προσβολή της ασθένειας και επανάληψη εάν χρειαστεί
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες φακή, ρεβίθια, κουκιά και λαθούρι/φάβα από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του						

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση, εφαρμογή, καθαρισμό και συντήρηση του εξοπλισμού.  
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μέσα σε 48 ώρες μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα προστασίας, γάντια και μπότες.  
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης ή τους δρόμους.  
SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη, πετρώδη και τεχνητά αποξηραμένα εδάφη στις καλλιέργειες του φασολιού, του μπιζελιού, της φακής, των ρεβιθιών, των κουκιών και του λαθουριού/φάβας.  
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:  
5 μέτρων για τα ζαχαρότευτλα,  
10 μέτρων με φυτική κάλυψη για τις λοιπές καλλιέργειες.  
SPo2: Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση.

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κριθάρι, βρώμη, μπιζέλια, φασόλια, ελαιοκράμβη, καμελίνα, σινάπι, ζαχαρότευτλο, κτηνοτροφικό τεύτλο, <b>φακή, ρεβίθια, κουκιά και λαθούρι/φάβα</b>	35
Σίκαλη, Σιτάρι	40

**B** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8188/199369/16.08.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ**