



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.09.2019
Αριθ. πρωτ: 8678/211768

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
email: Evangelos.Diamantis@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60304 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GALBEN M 8/65 WP (δ.ο. benalaxyl 8% β/β + mancozeb 65 % β/β) ως προς τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά, τη διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, του παρασκευαστή του σκευάσματος καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων", όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
4. Την με αριθ. πρωτ. 8678/211768/27.08.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60304 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GALBEN M 8/65 WP (δ.ο. benalaxyl 8% β/β + mancozeb 65 % β/β) ως προς τον κάτοχο της άδειας διάθεσης στην αγορά, τη διεύθυνση του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, του παρασκευαστή του σκευάσματος καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης.

Τα σημεία **1.4α, β, γ** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: +30 211 1983903
Email : Evangelos.Diamantis@fmc.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: +30 211 1983903
Email : Evangelos.Diamantis@fmc.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348
176 74 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: +30 211 1983903
Email : Evangelos.Diamantis@fmc.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC international Switzerland Sarl,
Quai de l'île 13 CH 1204 Geneva, Ελβετία

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ στρέμμα	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (VITVI)	Περνόςπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) (PLASVI)	200-250*	200-250	100	Έναρξη ψεκασμών σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες
Τομάτα Υπαίθρου (LYPES)	Περνόςπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN)	250	250	100	Περαιτέρω ψεκασμοί εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες
Πατάτα (SOLTU)	Περνόςπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN)	250	250	100	Περαιτέρω ψεκασμοί εφόσον οι επικρατούσες συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	3 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόστε με ομοιόμορφο ψεκασμό, με όσο όγκο ψεκαστικού υγρού απαιτείται για καλή κάλυψη του φυλλώματος.
2. Μετά από βροχή ή άρδευση, αφήστε το φύλλωμα να στεγνώσει καλά πριν εφαρμόσετε το GALBEN M 8/65 WP.
3. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε

περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής

4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ GALBEN Μ 8/65 WP ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

- II.** Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 191229/25.11.2010 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ