



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.12.2021  
Αριθ. πρωτ: 12405/342496

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Σωρού 18-20, 15125, Μαρούσι  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr) e-mail: [ioannis.tsoutsanis@bayer.com](mailto:ioannis.tsoutsanis@bayer.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70332 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) Aspect 533 SC (flufenacet 200 g/L + terbuthylazine 333 g/L) ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluorpyram, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 4504/94835/02.05.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70332 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) Aspect 533 SC (flufenacet 200 g/L + terbuthylazine 333 g/L), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 12405/342496/01.12.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70332 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) Aspect 533 SC (flufenacet 200 g/L + terbutylazine 333 g/L), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 4504/94835/02.05.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Τα σημεία **5**, **7** και **11** διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5</b> Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος <sup>1</sup>		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια <sup>2,3</sup>	150 ή 225	20-40	Προφυτρωτική ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 00-12)	<b>1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό</b>
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1. Η μικρότερη δόση (150 κ.εκ./στρ) να εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη και η μεγαλύτερη (225 κ.εκ./στρ.) σε βαριά εδάφη.</p> <p>2. Προφυτρωτική εφαρμογή:  <u>Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.</u>  <i>Acalypha virginica</i> (ACCVI)            Τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (AMARE)            Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) (DATST)            Γκαλινσόγκα (<i>Galinsoga parviflora</i>) (GASPA)            Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) (POROL)            Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>) (SENVU)            Σετάρια πράσινη (<i>Setaria viridis</i>) (SETVI)            Αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) (SOLNI)            Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i>) (SONOL)</p> <p><u>Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.</u>            Όλα τα παραπάνω ζιζάνια, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι ζιζανίων:            Καφέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) (CAPBP)            Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>) (DIGSA)            Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>) (POLPE)            Σύκιος (<i>Sicyos angulatus</i>) (SIYAN)            Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) (CHEAL)            Πάνικο διχτομοκικό (<i>Panicum dichotomiflorum</i>) (PANDI)            Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (ECHCG)</p> <p><u>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.</u>            Βέλιουρας από σπόρο (<i>Sorghum halepense</i>) (SORHA)</p>					

## 2. Νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή:

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.

*Acalypha virginica* (ACCVI)

Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*) (AMABL)

Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)

Τάτουλας (*Datura stramonium*) (DATST)

Γκαλινσόγκα (*Galinsoga parviflora*) (GASPA)

Λαπάτσα (*Polygonum lapathifolium*) (POLLA)

Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*) (POLPE)

Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)

Βερόνικα (*Veronica persica*) (VERPE)

Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 150 κ.εκ/στρ.

Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) (CYNDA)

*Xanthium italicum* (XANSI)

Ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

*Τα ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση των 150 κ.εκ/στρ., συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι ζιζανίων:*

Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*) (CAPBP)

Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*) (SENVU)

Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)

Ζωχός (*Sonchus oleraceus*) (SONOL)

Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)

Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) (ECHCG)

Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis*) (SETVI)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια στη δόση 225 κ.εκ/στρ.

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti*) (ABUTH)

Σύκιος (*Sicyos angulatus*) (SIYAN)

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του αραβοσίτου, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος χωρίς κάποια περίοδο αναμονής ή σόργο τουλάχιστον ένα μήνα μετά την εφαρμογή.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μετά την εφαρμογή του Aspect 533 SC, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες **μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.):**

- Σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, σόγια, μπιζέλια, ελαιοκράμβη, σινάπι, ηλίανθος και λινάρι: 6 μήνες
- Ζαχαρότευτλα, καπνός: 10 μήνες.

**Οι λοιπές καλλιέργειες μπορούν να σπαρούν μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) ή περίοδο αναμονής 12 μηνών.**

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

**P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**

**P260:** Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά τη διάρκεια ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**Spe1:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

**SPe2:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο μεγαλύτερη του 80%.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείται μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90%.

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 4504/94835/02.05.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**