

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά
TELEFAX: 210 92 12 090
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
e-mail: omelita@minagric.gr

Αθήνα, 20.11.2019
Αριθμ. πρωτ: 11153/266653

Προς: Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006
Murcia, Ισπανία
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70108 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) STUN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο) ως προς το εμπορικό όνομα, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο., τον παρασκευαστή της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τον παρασκευαστή σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις συσκευασίες, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθμό πρωτ. 14540/165381/24.02.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70108 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STUN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
5. Τις με αριθμό πρωτ. 12701/145294/23.12.2015, 6078/68576/14.06.2016, 10903/261335/15.10.2019 και 11153/266653/18.10.2019 αιτήσεις και τα με αριθμό πρωτ. 12196/290881/12.11.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 70108 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) STUN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 14540/165381/24.02.2015 απόφασή μας ως προς το εμπορικό όνομα, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο., τον παρασκευαστή της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τον παρασκευαστή σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις συσκευασίες, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.2.α, 1.3, 1.4.α, 1.4.γ, 1.4.δ, 1.4.στ, 2, 5 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CATHARSIS 33 EC

1.2.β Μορφή:

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Pendimethalin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

min 970 gr/kg

Χημική ομάδα

Δινιτροανιλίνη

Παρασκευαστής

SHARDA CROP CHEM LIMITED
Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, Ινδία
Mr. Ashish Bubna
Tel.: +91 22 5678 2800
Fax: +91 22 5678 2828
E-mail: regn@shardaintl.com

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία

Εργοστάσια παρασκευής

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Zhejiang XinNong Chemical Co., Ltd
 Sanlixi, Yangfu, Xianju County,
 Zhejiang Province, Κίνα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.

2. Shandong Huayang Pesticide Chemical Industry Group Co. Ltd.
Ciyao Town, Ningyang County, Shandong Province,
Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **Pendimethalin** όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. **12196/290881/12.11.2019** έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia – Ισπανία
Contact Mrs Elena Nieto
Τηλ.: +34 868127589
e-mail: e.nieto@shardaintl.com
regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα:
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
Τηλ. 210 7471000
Fax: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SHARDA CROPCHEM LIMITED
Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
Vile Parle (West)
Mumbai - 400056, Ινδία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Chemia SPA**, Via Statale
327 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία
2. **I.R.C.A Service S.P.A**
24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία
3. **Chemark Kft**
Industrial Zone, H-8182
Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία
4. **Spachem S.L.**
Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.

5. **LUQSA (Lerida Union Quimica /SA)**
Afores s/n Cp:25173, Sudanel (LLEIDA),
Ισπανία
6. **Shandong Binnong Technology Co., Ltd**
North End of the 5th Bohai Road,
Binzhou, Shandong, Κίνα
7. **Zhejiang Xinnong Chemical co. Ltd**
Sanlixi Yangfu, Xianju County
Zhejiang Province, Κίνα
8. **Shandong Huayang Pesticide Chemical**
Industry Group Co. Ltd.
Ciyao Town, Ningyang County, Shandong
Province, Κίνα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία
Pendimethalin: 33% β/ο,
Βοηθητικές ουσίες: **63.2 % β/β**
Περιέχει αρωματικό διαλύτη (νάφθα)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι **όπως κατατέθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 10903/261335/15.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.** Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	500 κ. εκ. έως 1 λίτρο	Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή HDPE/PA με κατάλληλα πώματα ασφαλείας.
2	Δοχεία	5 έως 20 λίτρα	Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή HDPE/PA με κατάλληλα πώματα ασφαλείας.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	Κ.εκ/ στρέμμα		
ΚΑΡΟΤΟ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.

	ζιζάνια				
ΚΡΕΜΜΥΔΙ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 500	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας, (στο στάδιο του μαστιγίου)	1
ΣΚΟΡΔΟ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 500	Νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο του μαστιγίου)	1
ΤΟΜΑΤΑ ΠΙΠΕΡΙΑ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση	1
ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση	1
ΑΡΑΚΑΣ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΟΣΠΡΙΑ (ΡΕΒΥΘΙΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΥΚΙΑ)	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΜΑΡΟΥΛΙ ΡΑΔΙΚΙ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση	1
ΣΠΑΡΑΓΓΙ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	500 – 600	Προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό. β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου.	1
ΑΓΚΙΝΑΡΑ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα	20 – 50	400 – 500	Πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση ή σε εγκατεστημένη φυτεία κατά την	1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.

	ζιζάνια			περίοδο του λήθαργου, πριν την νέα ανάπτυξη σε γυμνό έδαφος πριν την εμφάνιση ζιζανίων	
ΒΑΜΒΑΚΙ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΟΓΙΑ ΑΡΑΧΙΔΑ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
ΠΑΤΑΤΑ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας, (Επιφανειακά αμέσως μετά την φύτευση)	1
ΚΑΠΝΟΣ (σαν ζιζανιοκτόνο)	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Πριν ή μετά τη μεταφύτευση μεταξύ των γραμμών και μετά το τελευταίο παράχωμα με κατευθυνόμενο ψεκάσμο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των φυτών	1
ΚΑΠΝΟΣ (σαν αντιφυλλιζιακό των Αμερικάνικων καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια)	Παρεμπόδιση ανάπτυξης μασχαλαίων οφθαλμών - φυλλιζίων	20 – 50	400	Στις αρχές της πλήρους άνθησης αφού κορφολογηθούν τα καπνά αρκετά χαμηλά, ψεκάσμο με 20 κ. εκ. ψ.υ. / φυτό, διαλύματος 10 κ. εκ. προϊόντος ανά λίτρα	1
ΣΙΤΑΡΙ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (επιφανειακά αμέσως μετά τη σπορά)	1
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	Ετήσια, αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	20 – 50	400 – 600	Προφυτρωτικά της καλλιέργειας (Επιφανειακά αμέσως μετά την σπορά)	1
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:					
* Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:					
Ευαίσθητα ζιζάνια:					
Βέλιουρας από σπόρο (<i>Sorghum halepense</i>), Μίλιο (<i>Milium sp.</i>), Φεστούκα (<i>Festuca sp.</i>), Κεχρί (<i>Panicum sp.</i>), Ελευσίνα (<i>Eleusine indica</i>), Ήρα (<i>Lolium multiflorum</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Αλεπουρά					

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.

(*Alopecurus myosuroides*), Κοινή πόα (*Poa annua*), Ανεμάγρωστη (*Apera spica venti*), Νεραγριάδα (*Paspalum paspalodes*), Φάλαρη (*Phalaris sp.*), Σετάρια (*Setaria spp.*).

Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:**Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Στύφνος (*Solanum nigrum*), Βλήτο (*Amaranthus spp.*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Γλυστρίδα (*Portulaca oleracea*), Άνθεμις (*Anthemis sp.*), Μαργαρίτα (*Chresanthemum sp.*), Ζωχός (*Sonchus oleraceus*), Αγριοκαρδαμούδα (*Lepidium draba*), Οξαλίδα (*Oxalis pescaprae*), Παπαρούνα κοινή (*Paraver rhoeas*), Πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*), Περικοκλάδα ετήσια (*Convolvulus arvensis*), Γκάλιο (*Gallium aparine*), Βερόνικα (*Veronica sp.*), Τσουκνίδα (*Urtica sp.*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), *Adonis spp.*

Παρατηρήσεις:

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CATHARSIS 33 EC.

Α. Η δράση του **CATHARSIS 33 EC** στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

Β. Στο βαμβάκι μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρέμμα (σκεύασμα 50% περιεκτικότητας σε δρών συστατικό) ή 125 γρ δραστική ουσία /στρέμμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (*Solanum nigrum*).

Γ. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών.

Δ. Το **CATHARSIS 33 EC** καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-κοτυληδόνας). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο.

Η. Μην εφαρμόζετε το **CATHARSIS 33 EC** σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Επανάληψη στο ορθό: 1.3 Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο. σε καθαρή δ.ο.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

P260: Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση».

Περιέχει pendimethalin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα με φυτική κάλυψη σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από την μη γεωργική γη.

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 14540/165381/24.02.2015 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ