



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.03.2020
Αριθ. πρωτ: 690/17929

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Ταχ. Κώδικας:	176 71 - ΑΘΗΝΑ	Παραδείσου 2 & Κηφισίας
Πληροφορίες:	Κορνηλία Μητσοπούλου	Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι
Τηλέφωνο:	210 92 87 165	
e-mail:	kmitsopoulou@minagric.gr	e-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60934 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Forum Duo EC (dimethomorph 7,2% β/ο + pyraclostrobin 4% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β' /2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 92315/19.01.2011 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60305 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CABRIO DUO 4/7,2 EC (dimethomorph 7,2% β/ο + pyraclostrobin 4% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

7. Τη με αριθ. πρωτ. 13833/330253 π.ε./06.02.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60934 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Forum Duo EC (dimethomorph 7,2% β/ο + pyraclostrobin 4% β/ο).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 690/17929/20.01.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε την με αριθμό 60934 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Forum Duo EC (dimethomorph 7,2% β/ο + pyraclostrobin 4% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 13833/330253 π.ε./06.02.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5		Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. σκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου) LYPES	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) RHYTIN	200-250	250-400*	50-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών στην αρχή της άνθησης. BBCH 61-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Αγγούρι (θερμοκηπίου) CUMSA Κολοκύθι (θερμοκηπίου) CUUPG	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) PSPECU Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) ERYSCI	250	250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη σχηματισμού των καρπών. BBCH 71-89	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Πεπόνι (υπαίθρου) CUMME Καρπούζι (υπαίθρου) CITLA	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) PSPECU	250	-	80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες, εφόσον απαιτείται

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. σκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
					BBCH 15-89	
Κουνουπίδι (υπαίθρου) BRSOB Μπρόκολο (υπαίθρου) BRSOK	Περονόσπορος (<i>Peronospora parasitica</i>) PEROPA Αλτερνάρια (<i>Alternaria brassicae</i>) ALTEBA	150-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του καρπού. BBCH 13-49	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες εφόσον απαιτείται
Λάχανο (υπαίθρου) BRSOL	Περονόσπορος (<i>Peronospora parasitica</i>) PEROPA Αλτερνάρια (<i>Alternaria brassicae</i>) ALTEBA	150-250		30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του καρπού. (BBCH 11-49)	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-12 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (υπαίθρου) LACSA	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>) BREMLA	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου. (BBCH 15-49)	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Πατάτα SOLTU	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) RHYTIN	200-250	-	80-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν να κλείσουν οι γραμμές της	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες, εφόσον

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. σκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
					καλλιέργειας.	απαιτείται
Κρεμμύδι (υπαίθρου) ALLCE	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>) PERODE	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3 ^{ου} φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. (BBCH 13-89)	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Λυκοτρίβολο (υπαίθρου) VLLLO	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>) BREMLA	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου. (BBCH 15-49)	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται
Αρωματικά φυτά (υπαίθρου): Βασιλικός OCIBA Μαϊντανός PARCR Θυμάρι THYVU Δενδρολίβανο RMSOF	Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>) PEROSP (<i>Peronospora farinose</i>) PEROFA	200-250	-	20-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου. (BBCH 11-49)	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Σκόρδο (υπαίθρου) ALLSA	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>) PERODE	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. σκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
	Χρήση ήσσοнос σημασίας: Αλτερνάρια (<i>Alternaria porri</i>***) ALTEPO				φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. (BBCH 13-89)	απαιτείται.
Αγκινάρα** (υπαίθρου) (Χρήση ήσσοнос Σημασίας)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>) BREMLA	200-250	-	20-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την πλήρη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέχρι το 50% της ανάπτυξης των καρπών.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

*Η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

- Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής.
- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

**** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την αντιμετώπιση της αλτερνάριας) και αγκινάρας υπαίθρου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.»**

Οι χρήσεις στις καλλιέργειες Σκαρόλα (Υπαίθρου), Σπανάκι και συναφή (Υπαίθρου) θα χορηγηθούν όταν και εάν καθοριστούν στον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 MRLs σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη ΣΕΑ.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
Σκαρόλα (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών	Μέχρι 3 εφαρμογές με

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. σκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ.		
CICEL	BREMLA				Ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 7 ημέρες
Σπανάκι και συναφή (υπαίθρου) SPQOL	Περονόσπορος (<i>Peronospora spp.</i>) (<i>farinosa etc.</i>) PEROSP PEROFA	200-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φαλλικής επιφάνειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες

13

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι (υπαίθρου), Σκόρδο (υπαίθρου), Μαρούλι (υπαίθρου), Λυκοτρίβολο (υπαίθρου), Κουνουπίδι (υπαίθρου), Μπρόκολο (υπαίθρου), Αρωματικά Φυτά (υπαίθρου): Βασιλικός, Μαϊντανός, Θυμαρί, Δενδρολίβανο	7
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου), Πεπόνι (υπαίθρου), Καρπούζι (υπαίθρου), Λάχανο (υπαίθρου), Πατάτα, Αγκινάρα (υπαίθρου)	3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αγγούρι (θερμοκηπίου), Κολοκύθι (θερμοκηπίου)	1
---	---

B

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13833/330253 π.ε./06.02.2020 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ