



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.03.2020
Αριθ. πρωτ.: 12366/295519 π.ε.

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα
Email: Evangelos.Diamantis@fmc.com
Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού Α.Α. & Τ.: κ. Μ. Βορίδη
minister-mailbox@hq.minagric.gr
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Α. & Τ.:
κ. Γ. Στρατάκου
gensecr@hq.minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70313 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) EVORELLE EXPRESS SG (δ.ο: tribenuron 12.5 % β/β + thifensulfuron-methyl 37.5 % β/β) ως προς το φάσμα δράσης (παρατηρήσεις)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία **tribenuron** και **thifensulfuron-methyl**.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 12366/295519/18.11.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70313 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ζιζανιοκτόνο) EVORELLE EXPRESS SG (δ.ο: tribenuron 12.5 % β/β + thifensulfuron-methyl 37.5 % β/β) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 1204/19386/31.01.2019 Υπ. απόφαση, ως προς το φάσμα δράσης (παρατηρήσεις).

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ηλίανθος (HELAN) χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου τα οποία είναι ανθεκτικά στο Evorelle Express SG	Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια*	4,8-6**	20-40	Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8 ^ο φύλλο (BBCH 12-18).	1
Ηλίανθος (HELAN) χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου τα οποία είναι ανθεκτικά στο Evorelle Express SG	Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια*	3**	20-40	1 ^{ος} ψεκασμός : Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 2 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8 ^ο φύλλο (BBCH 12-14). 2 ^{ος} ψεκασμός : Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο των 6 φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το 8 ^ο φύλλο (BBCH 16-18).	2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες

Παρατηρήσεις:

- Η μικρότερη δόση συνιστάται για ζιζάνια που βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης.
- Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωικής ανάπτυξης (2-4 φύλλα).
- Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
- Πραγματοποιήστε τους ψεκασμούς με θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 25 °C. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση υψηλής διακύμανσης της θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας που υπερβαίνει τους 15 βαθμούς.
- Τυχόν βροχόπτωση εντός 2 ωρών από την εφαρμογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.
- Μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν που καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφopenίες, από προσβολές παρασίτων, από ασφυξία ριζών κλπ.
- ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ EVORELLE EXPRESS SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.
- **Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου ανθεκτικά στο Evorelle Express SG. Πριν την εφαρμογή ελέγξατε την ανθεκτικότητα των ποικιλιών ηλίανθου με τον κάτοχο της άδειας, την εταιρεία FMC.**

(**) Η προσθήκη του μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο (ισοδύναμη με 100κ.εκ/100λίτρο) σε δόση 125 κ.εκ/100λίτ είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.

(*) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

Δόση: 6 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* – ABUTH), Βλήτα (*Amaranthus blitoides* – AMABL), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* – AMARE), Αρτεμισία (*Artemisia vulgaris* – ARTVU), Ελαιοκράμβη (*Brassica napus* – BRSSN), Βρωμολουβουδιά (*Chenopodium vulvaria* – CHEVU), Κίρσιο (*Cirsium sp.* – CIRSS), Τάτουλας (*Datura stramonium* – DATST), Καπνόχορτο (*Fumaria parviflora* – FUMPA), Κοινό ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum* – HEOEU), Αγριοϊβίσκος (*Hibiscus trionum* – HIBTR), Χαμομήλι (*Matricaria sp.* – MATSS), Παπαρούνα (*Paraver rhoeas* – PAPRH), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* – POLPE), Γλυστρίδα ή Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Σινάπι άγριο (*Sinapis arvensis* – SINAR), Αγριοτομάτα (*Solanum nigrum* – SOLNI), (*Solanum physalifolium* – SOLPS), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium* – XANST)

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αμβροσία (*Ambrosia artemisiifolia* – AMBEL), Ατρίπλεξ (*Atriplex patula* – AXTPA), Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL), Χρωζοφόρα (*Chrozophora tinctoria* – CRZTI), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* – POLAV), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium orientale* subsp. *italicum* – XANSI)

Μετρίως ευαίσθητα: Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis* – ANGAR), Γεράνι (*Geranium rotundifolium* – GERRT), Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* – CONAR), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua* – MERAN)

Δόση: 4,8 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* – ABUTH), Βλήτα (*Amaranthus blitoides* – AMABL), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* – AMARE), Ελαιοκράμβη (*Brassica napus* – BRSSN), Βρωμολουβουδιά (*Chenopodium vulvaria* – CHEVU), Κίρσιο (*Cirsium sp.* – CIRSS), Καπνόχορτο (*Fumaria parviflora* – FUMPA), Κοινό ηλιοτρόπιο (*Heliotropium europaeum* – HEOEU), Αγριοϊβίσκος (*Hibiscus trionum* – HIBTR), Παπαρούνα (*Paraver rhoeas* – PAPRH), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* – POLAV), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* – POLPE), Γλυστρίδα ή Αντράκλα (*Portulaca oleracea* – POROL), Σινάπι άγριο (*Sinapis arvensis* – SINAR)

Ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL), Τάτουλας (*Datura stramonium* – DATST), Στύφνος (*Solanum nigrum* – SOLNI), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium* – XANST)

Μετρίως ευαίσθητα: Αμβροσία (*Ambrosia artemisiifolia* – AMBEL), Κίρσιο (*Cirsium arvense* – CIRAR), Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* – CONAR), Χρωζοφόρα (*Chrozophora tinctoria* – CRZTI), Πολύγωνο αναρριχώμενο (*Polygonum convolvulus* – POLCO)

Δόση: 2x3 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.

Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια:

Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* – ABUTH), Βλήτα (*Amaranthus blitoides* - AMABL), Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* – AMARE), Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis* – ANGAR), Ελαιοκράμβη (*Brassica napus* – BRSNN), Βρωμολουβουδιά (*Chenopodium vulvaria*-CHEVU), Κίρσιο (*Cirsium sp.* – CIRSS), Τάτουλας (*Datura stramonium* – DATST), Αγριοϊβίσκος (*Hibiscus trionum* – HIBTR), Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium* – XANST)

Ευαίσθητα ζιζάνια: Αμβροσία (*Ambrosia artemisiifolia*- AMBEL), Λουβουδιά (*Chenopodium album* – CHEAL), Κίρσιο (*Cirsium arvense* – CIRAR), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* – POLPE), Αγριοτομάτα (*Solanum nigrum* – SOLNI)

Μετρίως ευαίσθητα: Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* – CONAR), Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis* – FUMOF), Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* – POLAV)

- II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 1204/19386/31.01.2019 Υπ. απόφαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΙΟΣ