



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22.04.2020
Αριθ. πρωτ.: 2978/77516

Ταχ. Δ/νση:	Λ. Συγγρού 150	Προς:	UPL EUROPE Ltd.
Ταχ. Κώδ.:	176 71 - ΑΘΗΝΑ		(Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας
TELEFAX:	210 92 12 090		της εταιρείας: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.
Πληροφορίες:	Ι. Καλαϊτζόγλου		Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι)
Τηλέφωνο:	210 92 87 223	e-mail:	info@arystalifescience.gr
e-mail:	ikalaitzoglou@minagric.gr		

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TRIDEX 80 WP (mancozeb 80 % β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

7. Τη με αριθ. 60296 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) TRIMANOC 80 WP (δ.ο.: mancozeb 80 % β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 188161/06.09.2010 Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
9. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 2978/77516/10.03.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TRIDEX 80 WP της εταιρείας UPL EUROPE Ltd. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60955
22.04.2020
31.01.2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

TRIDEX 80 WP

1.2.β Μορφή

Βρέξιμη σκόνη (WP)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Mancozeb

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Min. 850 g/kg

Χημική ομάδα:

Διθειοκαρβαμιδικά

Παρασκευαστής :

UPL EUROPE Ltd

Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park,

Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ.: +44 (0) 1925 859016

Fax: +44 (0) 1925 817425

E-mail: maria.dalagiorgou@upl-ltd.com

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Cerexagri B.V., Ολλανδίας

Tankhoofd 10
3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam, Ολλανδία
Tel. + (31) 10 472 5395
Fax. + (31) 10 472 5318

2. UPL Ltd

Plot No. 750. GIDC Jhagadia,
Bharuch, PIN 396-195, Gujarat, Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Mancozeb, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αίτηση με ημερομηνία 30.06.2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΚΤ 120031) και στο Doc J από την παρασκευάστρια εταιρεία Cerexagri με ημερομηνία 05-12-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΚΤ 124144) για το πανομοιότυπο προϊόν TRIMANOC 80 WP, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

UPL EUROPE Ltd

Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park,
Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλ.: +44 (0) 1925 859016
Fax: +44 (0) 1925 817425
e-mail: maria.dalagiorgou@upl-ltd.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.

Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
e-mail: info@arystalifescience.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.

Ριζαρείου 16, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
e-mail: info@arystalifescience.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL EUROPE Ltd

Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park,
Warrington, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Cerexagri B.V.**
Tankhoofd 10,
3196 KE Vondelingenplaat/ Rotterdam, Ολλανδία
 - 2. Cerexagri**
14 avenue Manon Cormier,
33530 Bassens, Γαλλία
 - 3. Cerexagri**
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le
Canet, Γαλλία
 - 4. Cerexagri**
Plateforme CHEM'POLE 64, Pôle 4 - RD 281
Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
 - 5. UPL Ltd**
Plot No. 750. GIDC Jhagadia,
Bharuch, PIN 396-195, Gujarat, Ινδία
 - 6. UPL EUROPE Ltd.**
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
 - 7. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
 - 8. Arysta LifeScience S.A.S.**
Route d' Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
 - 9. Arysta LifeScience India Limited**
Kalol (Panchmahal), Gujarat 389330, Ινδία
-

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Cerexagri B.V.**
Tankhoofd 10,
3196 KE Vondelingenplaat/ Rotterdam, Ολλανδία
- 2. Cerexagri**
14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
- 3. Cerexagri**
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le Canet,
Γαλλία
- 4. Cerexagri**
Plateforme CHEM'POLE 64, Pôle 4 - RD 281
Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
- 5. UPL Ltd**
Plot No. 750. GIDC Jhagadia,
Bharuch, PIN 396-195, Gujarat, Ινδία
- 6. UPL EUROPE Ltd.**
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11
3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- 7. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl**
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
- 8. Arysta LifeScience S.A.S.**
Route d' Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
- 9. Arysta LifeScience India Limited**
Kalol (Panchmahal), Gujarat 389330, Ινδία
- 10. ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**
Ύπατο Θήβα, 80ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,
32200, Θήβα
- 11. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
- 12. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, 32 011 Βοιωτία
- 13. ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΟΙΚ. ΤΕΤΡ. 53Β, Τ.Κ. 570 22, Θεσσαλονίκη

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: mancozeb 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 5,9 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 2978/77516/10.03.2020 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερικό σακίδιο θερμοκολλημένο	200 γρ. έως και 10 κιλά	Χάρτινο κουτί με εσωτερικό σακίδιο από πολυαιθυλένιο
2.	Σακίδια θερμοκολλημένα	200 γρ. έως και 25 κιλά	Πολυαιθυλένιο πάχους 140 μ - 160 μ ή ΡΕ/ΕΝΟΗ (polyethylene lined ethylene vinyl alcohol) ή Πολυαιθυλένιο-πολυεστέρας ή Πολυαιθυλένιο-πολυεστέρας-αλουμινίου, πάχους 150μ
3.	Σάκοι θερμοκολλημένοι	2,5 έως και 25 κιλών	Polypropylene/πολυαιθυλένιο ή Χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλένιο ή με εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλένιο

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Συνδυαστικότητα: ---

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια μαζί με τα κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.

Το mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει ευρύ φάσμα δράσης.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αρ. εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες.
		Γραμ./ στρέμμα (max)	Γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά) (MABSD, PYUSS)	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), (VENTIN, VENTPI)	200	150-200	50-100	Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης /λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα (καρπίδιο). Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.	4/ 7-10 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) (VITSS)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) (PLASVI)	200	200	50-100	Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.	4/ 7-10 ημέρες
	Φόμοψη (<i>Cryptospora/ Phomopsis viticola</i>) (PHOPVI), Μαύρη σήψη (<i>Guignardia bidwelli</i>) (GUIGBI)				1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά τον σχηματισμό του 1 ^{ου} φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων.	
Καρότο (DAUCS)	Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i>) (ALTEDA)	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας.	4/ 14 ημέρες

Κρεμμύδι (ξηρό), Σκόρδο (ξηρό) (ALLCE, ALLSS)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>) (PERODE)	250	200-250	40-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	4/ 7-10 ημέρες
Τομάτα (Υ) (LYPES)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN)	200	200	50-100	Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.	4/ 7-10 ημέρες
	Σεπτόρια (<i>Septoria lycopersici</i>) (SEPTLY), Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) (ALTESO)				Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	
Μελιτζάνα (SOLME), Πιπεριά (CPSAN) (Υπαίθρου)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) (ALTESO)	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	4/ 7-10 ημέρες
Κολοκυνθοειδή Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι (CUMME, CITLA, CUUPG) (Υπαίθρου)	Κλαδοσπορίωση (<i>Cladosporium cucumerinum</i>) (CLADCU)	200	200	50-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	4/ 7-10 ημέρες
Μαρούλι (LACSA) (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>) (BREMLA)	200	200	60-100	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	4/ 7 ημέρες
Πατάτα (SOLTU)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) (PHYTIN), Αλτερναρίωση (<i>Alternaria solani</i>) (ALTESO)	200	-	50-100	Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.	8/ 7 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1. Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του σκευάσματος.
2. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
4. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να

ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το TRIDEX 80 WP περιέχει τη δραστική ουσία mancozeb, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα MO3 κατά FRAC.

Το TRIDEX 80 WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα:

--

--

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλιές "Golden Delicious".

Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες της αχλαδιάς Βουτυράτα, Κόσια και Κρυστάλλι.

- 9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07

GHS08

GHS09

- 10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει mancozeb.

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
 «Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή»
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό»
 «Κατά την εφαρμογή σε οπωρώνες συνιστάται η χρήση τρακτέρ με κλειστή καμπίνα».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].

SPe3: Για να προστατέψετε **τους υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας:

- **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του καρότου, του μαρουλιού, του κρεμμυδιού, του σκόρδου και της πατάτας,
- **10 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού
- **30 μέτρων** για τις δενδρώδεις καλλιέργειες.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο:

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.

P333+ P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Γενικά: Μη χορηγείτε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Για τον γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο οινόπνευμα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση δισουλφιράμης.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Μαρούλι (Υ)	28
Καρότο	35
Πατάτα	7
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθι (Υ)	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος αναφοράς (μυκητοκτόνο) TRIMANOC 80 WP (δ.ο.: mancozeb 80 % β/β), με αριθ. έγκρισης 60296 και αριθμό πρωτ. 188161/06.09.2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΚ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Κ.Α.Α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ