



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.04.2020  
Αριθ. πρωτ: 3372/90746

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212090  
Πληροφορίες: Π. Τσιτσιοπούλου  
Τηλέφωνο: 210-9287215  
e-mail: [tsitsiopoulou@minagric.gr](mailto:tsitsiopoulou@minagric.gr)

Προς: DuPont Hellas A.E.  
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας  
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα  
e-mail: [Evangelos.Diamantis@grc.dupont.com](mailto:Evangelos.Diamantis@grc.dupont.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 70053 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) HECTOR MAX WG (nicosulfuron + rimsulfuron + dicamba) ως προς τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης»

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012), για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
4. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 3372/90746/26-3-2020 αίτηση της εταιρείας DuPont Hellas A.E., Χαλάνδρι.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70053 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) HECTOR MAX WG (nicosulfuron + rimsulfuron + dicamba), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 4438/48594/31-7-2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις παρατηρήσεις.

Συγκεκριμένα το σημείο 5 (Παρατηρήσεις) διαμορφώνεται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια	Στόχοι	Δόσεις κ. εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο
Αραβόσιτος	<p>Αγρωστώδη ζιζάνια <i>Alopecurus myosuroides</i> (Αλωπέκουρος), <i>Avena spp.</i> (Βρώμη), <i>Digitaria spp.</i> (Αιματόχορτο), <i>Echinochloa spp.</i> (Μουχρίτσα), <i>Lolium spp.</i> (Ηρα), <i>Panicum dichotomiflorum</i> (Πάνικο), <i>Panicum miliaceum</i> (Κεχρί), <i>Phalaris spp.</i> (Φαλαρίς), <i>Setaria spp.</i> (Σετάρια), <i>Sorghum</i> <i>halperense</i> σε σπόρο ή ρίζωμα (Βέλιουρας), <i>Roa annua</i> (Πόα)</p> <p>Πλατύφυλλα ζιζάνια <i>Abutilon theophrasti</i> (Αγριοθαμβακιά), <i>Amaranthus spp.</i> (Βλήτα), <i>Ambrosia spp.</i> (Αμβροσία), <i>Ammi majus</i> (Ασπροκέφαλος), <i>Bidens bipinnata</i> (Forbicine), <i>Capsella bursa-pastoris</i> (Καψέλα), <i>Calystegia sepium</i> (Περυποκάδι), <i>Chenopodium album</i> (Λουβουδιά), <i>Chenopodium vulvaria</i> (Βρωμολουβουδιά), <i>Convolvulus</i> <i>arvensis</i> (Περικοκλάδα), <i>Diploaxis</i> <i>spp.</i> (Διπλόταξη), <i>Fumaria</i> <i>officinalis</i> (Καπνόχορτο), <i>Helianthus tuberosus</i> (Κολοκάσι), <i>Matricaria chamomilla</i> (Χαμομήλι), <i>Mercurialis annua</i> (Σκαρόχορτο), <i>Polygonum</i> <i>lapathifolium</i> (Λαπάτσα), <i>Polygonum persicaria</i> (Αγριοπιπεριά), <i>Raphanus</i> <i>raphanistrum</i> (Ραφανίδα), <i>Ranunculus spp.</i> (Νερατζούλα), <i>Rapistrum rugosum</i> (Ράπιστρο), <i>Sinapis arvensis</i> (Αγριοσινάπι), <i>Solanum nigrum</i> (Αγριοτοματιά), <i>Sonchus spp.</i> (Ζωχός), <i>Stellaria</i> <i>media</i> (Στελάρια) <i>Xanthium spp.</i> (Αγριομελιτζάνα), <i>Datura</i> <i>stramonium</i> (Τάτουλας)</p>	35 - 44 (3)	20-40	Όταν ο αραβόσιτος έχει 2-6 φύλλα (1)	1

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκάσμος γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους. Η μικρότερη δόση συνιστάται επί μονοετών αγρωστωδών και δικοτυλήδων ζιζανίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση συνιστάται σε

πολυετή ζιζάνια, μονοετή ζιζάνια ήδη ανεπτυγμένα καθώς και στο ζιζάνιο *Digitaria spp.* (Αιματόχορτο).

2. Το ζιζάνιο *Solanum nigrum* (Αγριοντομάτα) είναι μετρίως ευαίσθητο.

3. Κατά τον ψεκάσμό συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού **VIVOLT** σε αναλογία 0.1% κατ' όγκο ή προσκολλητικού CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 4438/48594/31-7-2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**