

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.06.2020
Αριθ. πρωτ: 4094/108935

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
FAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
e-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: PROPLAN Plant Protection Comp. SL
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας,
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. -
«Agribiz»,
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60328 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KATANGA EXPRESS 80 WG (δ.ο. foseetyl-al 80%β/β) ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης στη ταξινόμηση και επισήμανση καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25.05.2018 (ΑΔΑ:Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
7. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
8. Τη με αριθμό πρωτ. 3063/80847/12.03.2020 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 3629/95528/02.04.2020 και 4094/108935/24.04.2020 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL, Ισπανίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60328 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KATANGA EXPRESS 80 WG (δ.ο. fosetyl-al 80%β/β), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 6403/66409/04.07.2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης στη ταξινόμηση και επισήμανση καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.4α), 2, 3, 5, 10, 11** και **13** του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ
 Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
FAX: 210 7471009
 e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

2	Συσκευασίες		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερική σακούλα	25 γραμ. έως 5 κιλά	Σακούλα PE ή PET/PE ή PET /AL / PE και κουτί χάρτινο
2	Σακούλα	25 γραμ. έως 3 κιλά	Σακούλα PE ή PET/PE ή PET /AL / PE
	Σάκος	3 έως 10 κιλά	Σακούλα PE ή PET/PE ή PET /AL / PE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
 Τρόπος εφαρμογής:
 Ψεκασμοί φυλλώματος.
 Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
 Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.
 Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό (3) ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
 Συνδυαστικότητα:
 Δε συνιστάται η ανάμειξη του KATANGA SUPER WG με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα αζώτου.

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό	γρ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
<u>Εσπεριδοειδή:</u> Γκρέιτ φρουτ CIDPA Λεμονιές CIDLI Μανταρινιές (Κλημεντίνες) CIDRE Πορτοκαλιές CIDSI Φράπα CIDGR Κίτρο CIDME Περγαμόντο CIDAB Νεραντζιά CIDAU	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora sp.</i> - PHYTSP)	250 – 300	250 – 450	100 – 150	Πρώτος ψεκάσμος την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, δεύτερος ψεκάσμος το Ιούλιο και τρίτος τον Οκτώβρη-Νοέμβρη. (BBCH 39-91)	3
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora sp.</i> - PHYTSP)	250 – 300	200 – 360	80 – 120	Ο πρώτος ψεκάσμος τον Απρίλιο, ο δεύτερος τον Ιούλιο και ο τρίτος τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. (BBCH 39-91)	3
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	250 – 300	75 – 330	30 – 110	Ψεκάσμος λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (BBCH 57-85)	4 / 10-14
Φράουλα (Y+Θ) FRAAN	Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (<i>Phytophthora cactorum</i> - PHYTCC)	250	250	100	Προληπτικοί ψεκάσμοι έως την άνθηση. (BBCH 12-59)	1-3 / 8-10
		250	--	10	Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση.	1
Τομάτα (Y+Θ) LYPES	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN)	200 – 300	200 - 300	100	Προληπτικοί ψεκάσμοι φυλλώματος. (BBCH 14-89)	1-3 / 8-10

Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA, Κολοκύθι/ Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - PSPECU)	200 – 300	160-300	80-100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. (BBCH 14-89)	1-3 / 8-10
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME, Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA Κολοκύθα (Υ+Θ) CUUPE	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i> - PSPECU)	200 – 300	160-300	80-100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. (BBCH 14-89)	1-2 / 8-10
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i> - BREMLAC)	200 – 300	100-300	50-100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος. (BBCH 14-45)	1-3 / 10-14
Καλλωπιστικά ² (Υ&Θ) NNNZZ	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora sp.</i> - PHYTSP)	250	100-120	250-300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.	1-3 / 30
		5-10 γρ./Τετ. μέτρο	100	-	Ριζοπότισμα.	1-2 / 30
Παρατηρήσεις: 1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 2. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.						

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	28
Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιές, Μανταρινιές (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιές, Φράπα, Κίτρο, Περγαμόντο, Νεραντζιά, Μαρούλι (Υ+Θ)	15
Φράουλα (Υ+Θ) (ψεκασμός φυλλώματος)	14
Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθι / Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ)	3
Φράουλα (Υ+Θ) (εμβάπτιση ριζώματος)	-
Καλλωπιστικά	-

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 6403/66409/04.07.2012 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ