



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.11.2020
Αριθ. πρωτ: 12719/328345

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON S.p.A., Ιταλίας
(Δια της SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400,
Κορωπί)
e-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) TONALE (clomazone 4% β/ο + terbuthylazine 37,5% β/ο + mesotrione 7,5% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες **clomazone** και **mesotrione**.

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 820/2011 της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2011 για την έγκριση της δραστικής ουσίας **terbuthylazine** σύμφωνα με τον Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής και της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής.
9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1511 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας **clomazone**.
10. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
11. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
12. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
13. Την αριθ. 16779 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το πανομοιότυπο προϊόν TONALE, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της Ιταλίας.
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5002/107749/15.05.2019 αίτηση και τα υπ' αριθ. πρωτ. 1139/29844/28.01.2020, 3042/79975/11.03.2020, 10765/285831/13.10.2020 και 12719/328345/24.11.2020 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TONALE** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

| |
|-------------------|
| 70407 |
| 26.11.2020 |
| 31.10.2022 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

| |
|---|
| TONALE |
| Μείγμα εναιωρήματος μικροκαψουλών και συμπυκνωμένου αιωρήματος (ZC) |

1.3 Δραστικές ουσίες

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

| |
|------------------|
| Clomazone |
|------------------|

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

| |
|----------------------|
| 96,5% β/β min |
|----------------------|

Χημική ομάδα

| |
|-------------------------|
| Ισοξαζολιδινόνες |
|-------------------------|

Παρασκευαστής

SIPCAM OXON SpA
Via Sempione, 195
20016 Pero (Milan), Ιταλία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Sipcarn Oxon S.p.A.**
Strada Prov.le Km 2,6
Mezzana Bigli (PV), 27030, Ιταλία
- 2. Shandong Cynda Chemical Co Ltd**
Economic Development Area
Boxing Country, Shandong, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **clomazone** όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 5002/107749/15.05.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Mesotrione

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

93% β/β min

Χημική ομάδα

Τρικετόνες

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG
CH 4002 - Basel, Ελβετία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Syngenta Crop Protection Monthey SA**
Route de l'île au Bois CH-1870 Monthey, Ελβετία
- 2. Shenyang Sciencreat Chemicals Co. Ltd.**
Shenyang Liaoning, P.R. Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **mesotrione** όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 5002/107749/15.05.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 3

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Terbuthylazine

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98% β/β min

Χημική ομάδα

Τριαζίνες

Παρασκευαστής

SIPCAM OXON SpA
Via Sempione, 195
20016 Pero (Milan), Ιταλία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
Sipcam Oxon S.p.A.
 Strada Prov.le Km 2,6
 Mezzana Bigli (PV), 27030, Ιταλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας **terbuthylazine** όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 5002/107749/15.05.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

SIPCAM OXON S.p.A
 Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία
 Contact person: Chiara Palladini
 Τηλ.: + 39 0371 597220
 Fax: +39 0371 597220
 e-mail: cpalladini@sipcam.com

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400, Κορωπί
 Τηλ.: +30 210 5223834
 Fax: +30 210 5223139
 E-mail: info@sipcam.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
 Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400, Κορωπί
 Τηλ.: +30 210 5223834
 Fax: +30 210 5223139
 E-mail: info@sipcam.gr

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος

SIPCAM OXON S.p.A
 Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO)
 Ιταλία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- SIPCAM OXON S.p.A.**
 Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO),
 Ιταλία
- SIPCAM INAGRA S.A.**
 Carretera Mareny Blau, s/n - 46410 Sueca
 (Valencia), Ισπανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- SIPCAM OXON S.p.A.**
 Via Vittorio Veneto 81, Salerano sul Lambro (LO),
 Ιταλία
- SIPCAM INAGRA S.A.**
 Carretera Mareny Blau, s/n - 46410 Sueca

(Valencia), Ισπανία

3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.

Μάνδρα Αττικής

4. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

Νέα Σάντα Κιλκίς, Τ.Κ. 56403

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: clomazone 4% β/ο
mesotrione 7,5% β/ο
terbuthylazine 37,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 54,78% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στο υπ. αριθμ. 1139/29844/28.01.2020 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσσκευασίες

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|--------|------------------------|--------------------|
| 1 | Φιάλη | 500 κ. εκ. έως 1 λίτρο | Πολυαιθυλένιο (PE) |
| 2 | Δοχείο | 2 έως 20 λίτρα | Πολυαιθυλένιο (PE) |

3 Οδηγίες χρήσης**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Ομοιόμορφος ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Το έδαφος πρέπει να είναι υγρό και ψιλοχωματισμένο.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 30-50% και ξεκινήστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Εκλεκτικό προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ευρέως φάσματος με υπολειμματική δράση για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.
 Το TONALE είναι μείγμα 3 δραστικών ουσιών (clomazone + terbuthylazine + mesotrione).
 Η δ.ο. clomazone είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από τις ρίζες και τους νεαρούς βλαστούς των ζιζανίων στόχων και μετακινείται στο πάνω μέρος του φυτού. Δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των καροτινοειδών.
 Η δ.ο. terbuthylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.
 Η δ.ο. mesotrione παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της πλαστοκινόνης και των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο |
|--------------------|--|--------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | κ.εκ./στρ. | Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.) | | |
| Αραβόσιτος (ZEAMX) | Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* | 170-200 | 20-40 | Προφυτρωτικά BBCH 00-09 | 1 |
| | | 150-200 | | Νωρίς μεταφυτρωτικά στο στάδιο των 2-6 φύλλων BBCH 12-16 | |

***ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**

Ευαίσθητα

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)
 Σετάρια (*Setaria viridis* - SETSS)

Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH)
 Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE)
 Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)
 Βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMASS)
 Γκαλινσόγκα (*Galinsoga parviflora* - GASPA)
 Ζωχός (*Sonchus* spp. - SONSS)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

Μετρίως ευαίσθητα: Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense* - SORHA)

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε σε καλά προετοιμασμένο επίπεδο έδαφος, χωρίς σβώλους.
2. Η δράση του προϊόντος στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν βρέξει σε 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται άρδευση περίπου 10 mm νερού για την ενσωμάτωση – ενεργοποίηση του σκευάσματος στο έδαφος.
3. Ομοιόμορφη σπορά σε βάθος τουλάχιστον 3-4 cm για όλες τις καλλιέργειες, ώστε να μη μένουν σπόροι ακάλυπτοι.
4. Σε ελαφριά εδάφη χρησιμοποιείτε τις χαμηλότερες δόσεις.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Το σκεύασμα περιέχει τα ζιζανιοκτόνα clomazone που ανήκει στην ομάδα 13 κατά HRAC, terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα 3 κατά HRAC και mesotrione που ανήκει στην ομάδα 27 κατά HRAC.
- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.
- Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες.
- Η εφαρμογή να γίνεται με ήπιο καιρό και απουσία ανέμου.
- Να μην χρησιμοποιείται σε καθαρές γραμμές που προορίζονται για την παραγωγή σπόρου και σε γλυκό καλαμπόκι.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μόνο καλαμπόκι την ίδια καλλιεργητική περίοδο.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

7 ημέρες

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

- Η δράση του προϊόντος εκδηλώνεται κατά το φύτευμα των ζιζανίων τα οποία ευρίσκονται στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους. Για επαύξηση της εκλεκτικότητας συνιστάται η σπορά των καλλιεργειών να γίνεται στο συνιστώμενο βάθος σποράς. Σε πολύ επιφανειακά τοποθετούμενους σπόρους καλλιεργειών σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων μετά την σπορά η εκλεκτικότητα του ενδεχομένως να μειωθεί.
- Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα λεύκανσης στην καλλιέργεια τα οποία εξαφανίζονται μετά από 1-2 εβδομάδες, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της καλλιέργειας.

9 Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS08



GHS09

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H361d: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

*Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/φόρτωση.
 Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία με κουκούλα και προσωπίδα κατά την εφαρμογή.
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε, μπότες, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
 Αφήνετε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων για την προστασία παρευρισκομένων ή κατοίκων.*

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες.

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και καλέστε γιατρό για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|---------------|
| Αραβόσιτος | Μη εφαρμόσιμο |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παρατάση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

--

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ