



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.12.2020  
Αριθ. πρωτ: 11812/312621

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212090  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125  
Μαρούσι  
e-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 60653 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΟΡΤΙΜΟ EC (pyraclostrobin 4% β/ο + dimethomorph 7,2% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/567 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών chlorantraniliprole, cyflumetofen, cyprodinil, **dimethomorph**, dithiocarbamates, fenamidone, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenone, myclobutanil, propiconazole, sedaxane και spirodiclofen μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1015 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, **pyraclostrobin**, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
6. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 12248/118530/12.01.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60653 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) OPTIMO EC (pyraclostrobin 4% β/ο + dimethomorph 7,2% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 11812/312621/09.11.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60653 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) OPTIMO EC (pyraclostrobin 4% β/ο + dimethomorph 7,2% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 12248/118530/12.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

<b>5</b> Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ. / στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES	Περωνόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) PHYTIN	200-250	250-400*	50-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών στην αρχή της άνθησης.	3/7-8
Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG	Περωνόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) PSPECU  Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ERYSCI	250	250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη σχηματισμού των καρπών.	3/7-8
Πεπόνι (Υ) CUMME Καρπούζι (Υ) CITLA	Περωνόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) PSPECU	250	-	80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου.	3/7
Μπρόκολο (Υ) BRSOK Κουνουπίδι (Υ) BRSOB	Περωνόσπορος ( <i>Peronospora parasitica</i> ) PEROPA Αλτερνάρια ( <i>Alternaria brassicae</i> )	150-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι	3/10-12

	ALTEBA				την πλήρη ανάπτυξη του καρπού.	
Λάχανο (Υ) BRSOL	Περονόσπορος ( <i>Peronospora parasitica</i> ) PEROPA Αλτερνάρια ( <i>Alternaria brassicae</i> ) ALTEBA	150-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του καρπού.	3/10-12
Μαρούλι (Υ) LACSA	Περονόσπορος ( <i>Bremia lactucae</i> ) BREMLA	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου.	3/7-8
Πατάτα SOLTU	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) PHYTIN	200-250	-	80-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν να κλείσουν οι γραμμές της καλλιέργειας.	3/10
Κρεμμύδι (Υ) ALLCE	Περονόσπορος ( <i>Peronospora destructor</i> ) PERODE	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3 <sup>ου</sup> φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας.	3/7-8
Λυκοτρίβολο (Υ) VLLLO	Περονόσπορος ( <i>Bremia lactucae</i> ) BREMLA	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου.	3/7-8
Αρωματικά φυτά (Υ) Βασιλικός OCIBA Μαϊντανός PARCR Θυμάρι THYVU Δενδρολίβανο RMSOF	Περονόσπορος ( <i>Peronospora spp.</i> ) ( <i>farinosa etc.</i> ) PEROSP PEROFA	200-250	-	20-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου.	3/7-10
Σκόρδο (Υ) ALLSA	Περονόσπορος ( <i>Peronospora</i> )	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών	3/7-8

	<i>destructor</i> PERODE				ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας.	
Σκόρδο (Υ) ALLSA  Μικρής Σημασίας Χρήση **	<i>Αλτερνάρια</i> ( <i>Alternaria porri</i> ) ALTEPO	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας.	3/7-8
Αγκινάρα (Υ) CYUCA  Μικρής Σημασίας Χρήση **	<i>Περονόσπορος</i> ( <i>Bremia lactucae</i> ) BREMLA	200-250	-	20-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την πλήρη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέχρι το 50% της ανάπτυξης των καρπών.	3/7-10
<p><b>Παρατηρήσεις:</b></p> <p>*Η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.</p> <p>** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την αντιμετώπιση της αλτερνάριας) και αγκινάρας υπαίθρου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις μικρής σημασίας χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα κατά τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής.</li> <li>• Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.</li> <li>• Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.</li> </ul> <p>Η χρήση στις καλλιέργειες Σκαρόλα (Υπαίθρου), Σπανάκι και συναφή (Υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.</p>						
Σκαρόλα (Υπαίθρου) CICEL	<i>Περονόσπορος</i> ( <i>Bremia lactucae</i> ) BREMLA	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 <sup>ου</sup> πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 7 ημέρες

Σπανάκι και συναφή (υπαίθρου) SPQOL	Περονόσπορος ( <i>Peronospora spp.</i> ) ( <i>farinosa etc.</i> ) PEROSP PEROFA	200-250	-	30-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες.
-------------------------------------	---	---------	---	--------	--	---

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ)	1
Τομάτα (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ) Καρπούζι (Υ), Πατάτα Αγκινάρα (Υ), <b>Λάχανο (Υ)</b>	3
Μαρούλι (Υ), Κρεμμύδι (Υ) Σκόρδο (Υ), Λυκοτρίβολο (Υ) Βασιλικός (Υ), Μαϊντανός (Υ) Θυμάρι (Υ), Δενδρολίβανο (Υ) <b>Μπρόκολο (Υ), Κουνουπίδι (Υ)</b>	7

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 12248/118530/12.01.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ