



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.08.2021
Αριθ. πρωτ: 4649/124645

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl, Βελγίου
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε.)
e-mail: Ami.Athanasiadou@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8259 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) MAXIM 10 ST (triclopyr υπό μορφή οξέος 10% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/590 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aclonifen, boscalid, αγελαδινό γάλα, etofenprox, πυροφωσφορικός σίδηρος, L-κυστεΐνη, λ-κυαλοθρίνη, μηλεϊνικό υδραζίδιο, mefentriflucanazole, 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο, ο-νιτροφαινολικό νάτριο, ρ-νιτροφαινολικό νάτριο και **triclopyr** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
6. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

8. Τη με αριθ. πρωτ. 10404/114066/14.10.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8259 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) MAXIM 10 ST (triclopyr υπό μορφή οξέος 10% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Η υπ' αριθ. πρωτ. 4649/124645/12.05.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 8259 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) MAXIM 10 ST (triclopyr υπό μορφή οξέος 10% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 10404/114066/14.10.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ στρέμμα	γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ						
Πορτοκαλιά [CIDSΙ] (ποικιλίες: κοινή, είδη Tarocco, Sallustiana, Navellina, Merlin, Moro)	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση χρωματισμού και ποιότητας φλοιού.	15-37,5 (βέλτιστη δόση 25-30) <i>[1,5-3,75 δισκία (βέλτιστη δόση 2,5-3)]</i>	6-18,75 (βέλτιστη δόση 10-15) <i>[0,6-1,88 δισκία (βέλτιστη δόση 1-1,5)]</i>	200-250	Μετά τη φυσική καρπόπτωση και όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 25 χιλιοστά.	1
	Αποφυγή καρπόπτωσης	15-37,5 (βέλτιστη δόση 25) <i>[1,5-3,75 δισκία (βέλτιστη δόση 2,5)]</i>	6-18,75 (βέλτιστη δόση 10-12,5) <i>[0,6-1,88 δισκία (βέλτιστη δόση 1-1,25)]</i>	200-250	Μόλις πριν ή κατά την αλλαγή χρώματος του καρπού.	

Μανταρινιά [CIDRE] (ποικιλίες: κοινή, άσπερμες και όψιμες)	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση χρωματισμού και ποιότητας φλοιού.	20-25 [2-2,5 δισκία]	8-12,5 [0,8-1,25 δισκία]	200-250	Αφού ολοκληρωθεί η φυσική καρπότητα και όταν η διάμετρος των καρπών είναι 20-22 χιλιοστά.	1
Κλημεντίνη		25-35 (2,5-3,5 δισκία)	10-17,5 [1-1,75 δισκία]	200-250	διάμετρος 18- 22 χιλιοστά	
Κλεμενούλα		20-35 (2-3,5 δισκία)	8-17,5 [0,8-1,75 δισκία]	200-250	διάμετρος 20- 24 χιλιοστά	
Σατσούμα, Νόβα - Κλημεντίνη		20-35 (2-3,5 δισκία)	8-17,5 [0,8-1,75 δισκία]		διάμετρος 22- 26 χιλιοστά	
Λεμονιά [CIDLI] (ποικιλίες: κοινή, είδη Femminello, Monachello, Interdonato, Lunario)	Αύξηση μεγέθους καρπού, πρωιμότητα παραγωγής.	15-37,5 [1,5-3,75 δισκία]	6-18,75 [0,6-1,88 δισκία]	200-250	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 22 χιλιοστά (μέση διάμετρος 24- 26 χιλιοστά).	1
Βερικοκιά [PRNAR]	Πρωίμηση ωρίμανσης καρπών, αύξηση μεγέθους καρπών, βελτίωση χρωματισμού καρπών και αύξηση παραγωγής.	12 [1,2 δισκία]	9,6-14,4 [0,96- 1,44 δισκία]	80-120	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο 20-24 χιλιοστά και όχι αργότερα.	1
Μηλιά [MABSD]	Αποφυγή καρπότητας και αύξηση κόκκινου χρωματισμού σε ορισμένες ποικιλίες.	20 { 2 δισκία]	13,3-66,6 [1,3-6,7 δισκία]	30-150	3-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.	1

Αχλαδιά [PYUCO]	Αποφυγή καρπόπτωσης.	10-20 <i>[1-2 δισκία]</i>	6,66-66,6 <i>[0,6-6,7 δισκία]</i>	30-150	3-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.	1
Ακτινίδιο [ATIDE]	Αύξηση μεγέθους και βάρους καρπού.	2 <i>[0,2 δισκία]</i> ή 10 <i>[1 δισκίο]</i>	1,7-2,5 <i>[0,17- 0,25 δισκία]</i> ή 8,3-12,5 <i>[0,83- 1,25 δισκία]</i>	80-120	30 ημέρες από το πέρας της ανθοφορίας ή μεταξύ 70 και 100 ημερών από το πέρας της ανθοφορίας	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες)	Διατήρηση κάλυκα καρπών	-	2 δισκία	100 λίτρα/ τόνο καρπών	Με διαβροχή, μετά τη συγκομιδή.	1
---	-------------------------------	---	----------	---------------------------------	---------------------------------------	---

Παρατηρήσεις:

1. Να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης, κυρίως όσον αφορά τη δόση και τον χρόνο εφαρμογής.
2. Οι μικροί όγκοι ψεκαστικού υγρού να συνδυάζονται με τη μέγιστη δόση ανά εκατόλιτρο και αντίστοιχα οι μεγάλοι όγκοι ψεκαστικού υγρού με την ελάχιστη δόση ανά εκατόλιτρο, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση της δόσης ανά στρέμμα.
3. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φυσικής καρπόπτωσης.
4. Μην ψεκάζετε φυτά που έχουν εμβολιαστεί πρόσφατα και νεαρά φυτά σε φυτώριο, παρά μόνο ενήλικα φυτά.
5. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή έντονος άνεμος.
6. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στην όψιμη εποχή/εφαρμογή.
7. Εφαρμόστε σε υγιή φυτά, με επάρκεια υγρασίας και λίπανσης.
8. Μην εφαρμόζετε μαζί με κάλιο.
9. Μην εφαρμόζετε σε αχλάδια ποικιλίας Guyot.
10. Στη βερικοκιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας (σχίσσιμο καρπών, τοξικότητα στο φύλλωμα), μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μεταγενέστερο στάδιο ή σε μεγαλύτερη δόση από τα προτεινόμενα.
11. Η εφαρμογή του προϊόντος στα δέντρα των ακτινιδίων σε πολύ όψιμη εποχή ή σε πολύ υψηλή δοσολογία, μπορεί να προκαλέσει μαρασμό ή/και μερική πτώση των φύλλων. Ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί αρνητική επίδραση στη ζωτικότητα ή τη μακροζωία της καλλιέργειας.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ	
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια) - χρήση μετά τη φυσική καρπόπτωση	120
Πορτοκάλια - χρήση για αποφυγή αρπόπτωσης	40
Βερίκοκα	60
Μήλα, Αχλάδια	21
Ακτινίδια	52
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ	
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Κλημεντίνες)	3

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 10404/114066/14.10.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ