



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19/11/2021
Αριθ. πρωτ: 10478/289956

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 9287250
e-mail: mgaspari@minagric.gr

Προς: Asahi Chemical Europe s.r.o.
(δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης
Αντώνος και Σια Ε.Ε.-AGRIBIZ)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8227 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ASAHI SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate, sodium p-nitrophenolate) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1098 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 24-epibrassinolide, *Allium cepa* L. bulb extract, cyflumetofen, fludioxonil, fluoxypyr, sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate και sodium p-nitrophenolate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8700/95582/23.7.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8227 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**φυτορρυθμιστική ουσία**) **ASAHI SL**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 10478/289956/19-10-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 8227 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(φυτορρυθμιστική ουσία) ASAHI SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate, sodium p-nitrophenolate)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 8700/95582/23.7.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ/ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής	100	100 – 250	40 – 100	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	4 / 15
Ρύζι	Βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και καρπώδεσης. Βελτίωση της θρέψης των σπόρων και της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής.	50	--	50	Ένας ψεκασμός στην αρχή της άνθησης	1
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Αύξηση γονιμότητας γύρης, καλύτερη γονιμοποίηση, παρθενοκαρπικό δέσιμο, βελτίωση μεγέθους & ποιότητας καρπών, πρωιμότητα	50 - 75	50	100 – 150	1ος ψεκασμός 10 μέρες πριν την άνθηση, 2ος στην αρχή της άνθησης και επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες	4 / 10
Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της	100	50 – 200	50 – 200	1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	4 / 15

	παραγωγής					
Πιπεριά Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής	100	50 – 200	50 – 200	1ος ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	5 / 15
Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής	100	50 – 200	50 – 200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες	4 / 10
Ελιά (επιτραπέζια- ελαιοποιήσιμη)	Βελτίωση της άνθησης και της καρπώδεσης, της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής.	100	50 – 100	100 – 200	1ος ψεκασμός στο στάδιο των μπουμπουκιών 2ος ψεκασμός 10 μέρες αργότερα 3ος ψεκασμός στην άνθηση και 4ος ψεκασμός στην καρπώδεση	4 / 10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η δόση/ΗΛ θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψ.υ./στρ ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση/στρ
2. Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.
3. Οι κάτωθι χρήσεις δεν εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση αλλά θα χορηγηθούν όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		Κ.εκ/ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Πεπόνι Καρπούζι Αγρού	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	100 – 250	40 – 100	1ος ψεκασμός όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 2ος ψεκασμός όταν είναι ορατό το 50% των	3 / 10 (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες)

					χρήσιμων θηλυκών ανθέων 3ος ψεκασμός 10 μέρες μετά το 2ο ψεκασμό	
Πεπόνι Καρπούζι Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	100 – 250	40 – 100	1ος ψεκασμός όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 2ος ψεκασμός όταν είναι ορατό το 50% των χρήσιμων θηλυκών ανθέων 3ος ψεκασμός 10 μέρες μετά το 2ο ψεκασμό	3 / 10 (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες)

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού	3
Ρύζι	90
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	14
Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου	3
Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου	3
Πιπεριά Θερμοκηπίου	3
Ελιά	60

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8700/95582/23.7.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ