



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.11.2021  
Αριθ. πρωτ: 10457/289464

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ  
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα  
e-mail: [Evangelos.Diamantis@fmc.com](mailto:Evangelos.Diamantis@fmc.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70231 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΚΟΒΑΝ® Τx (terbuthylazine 18,75% β/ο + pethoxamid 30% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluorpyram, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 3617/35591/28.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70231 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΚΟΒΑΝ® Τx (terbuthylazine 18,75% β/ο + pethoxamid 30% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 10457/289464/19.10.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70231 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΚΟΒΑΝ® Τx (terbuthylazine 18,75% β/ο + pethoxamid 30% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 3617/35591/28.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο), το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σοράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης.

Τα σημεία 5, 7 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

## 5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		γρ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια αγρωτώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	300-400 για προφυτρωτική εφαρμογή  400 για μεταφυτρωτική εφαρμογή	20-30	Ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική (BBCH 00-09) ή νωρίς μεταφυτρωτική εφαρμογή (BBCH 10-14) (από το στάδιο του 1ου φύλλου έως το στάδιο των 4ων φύλλων του αραβοσίτου), κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος	<b>1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια</b>

## Παρατηρήσεις:

- Η μικρότερη δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη και η μεγαλύτερη σε βαριά.

- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 300 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* ECHCG), Λουβουδιά (*Chenopodium album* CHEAL), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE).
2. Μετρίως ευαίσθητα: Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA), Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI).

- ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 400 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE), Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL), Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE).
2. Μετρίως ευαίσθητα: Σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI).

ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 300 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* -SOLNI), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE), Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum* -PANDI).
2. Μετρίως ευαίσθητα: Αγριομπάμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH), Λουβουδιά (*Chenopodium album* CHEAL), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG).

- ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – Δόση 400 γρ./στρέμμα

1. Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH), Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* ECHCG), Τραχύ Βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE), Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE), Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum* -PANDI).
2. Μετρίως ευαίσθητα: Λουβουδιά (*Chenopodium album* CHEAL).

## 7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας την Άνοιξη μετά την εφαρμογή του Koban® Τχ, μπορεί να σπαρεί μόνο καλαμπόκι.

Μετά τη συγκομιδή του καλαμποκιού στο οποίο χρησιμοποιήθηκε Koban® Τχ **μπορείτε να σπείρετε την επόμενη άνοιξη οποιαδήποτε καλλιέργεια.**

Εάν επικρατούν κλιματολογικές συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς, μπορεί να προκληθούν βλάβες στις καλλιέργειες που ακολούθησαν το καλαμπόκι, ιδιαίτερα στα σιτηρά φθινοπωρινής σποράς.

Μην εισέρχεσθε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα (24 ώρες).

## 11

Δηλώσεις Προφύλαξης

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.

**P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια.

Χρησιμοποιείτε τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου για την εφαρμογή.

**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**SPe1:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσιών μείωσης της διασποράς κατά 75%.

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 3617/35591/28.07.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**