



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.11.2021
Αριθ. πρωτ: 11564/317633

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ Α. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη, Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287250, 210 9287160
e-mail: mgaspari@minagric.gr e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com
dmakrogianni@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70210 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CALARIS 400 SC (terbuthylazine 33% β/ο + mesotrione 7% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluorogran, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 5376/53039/15.05.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70210 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CALARIS 400 SC (terbuthylazine 33% β/ο + mesotrione 7% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τις με αριθ. πρωτ. 11564/317633/12.11.2021 και 11868/326495/19.11.2021 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70210 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CALARIS 400 SC (terbuthylazine 33% β/ο + mesotrione 7% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 5376/53039/15.05.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **5, 7, 11** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ευαίσθητα ζιζάνια -Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i> , CHEAL) -Στελλάρια (<i>Stellaria media</i> , STEME) -Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i> , SOLNI) -Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i> , POLPE) -Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i> , ABUTH) -Τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i> , AMARE) -Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium</i> sp., XANSS) -Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i> , DATST) -Τραχύς ζωχός (<i>Sonchus asper</i> , SONAS)	100-150	--	20-30	Ψεκάσμος Φυλλώματος από το 1 ^ο μέχρι το 8 ^ο φύλλο (BBCH 11-18)	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό

	-Σκαρολάχανο <i>(Mercurialis annua, MERAN)</i> - Πολύγωνο <i>(Polygonum convolvulus, POLCO)</i> Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: -Μουχρίτσα <i>(Echinochloa crus-galli, ECHCG)</i> -Αιματόχορτο <i>(Digitaria sanguinalis, DIGSA)</i> -Γλυστρίδα <i>(Portulaca oleracea, POROL)</i> -Κεχρί <i>(Panicum dichotomiflorum, PANDI)</i> - Γκαλινσόγκα <i>(Galinsoga parviflora, GASPA)</i> - Πολυκόμπι <i>(Polygonum aviculare, POLAV)</i> -Περικοκλάδα <i>(Convolvulus arvensis, CONAR)</i>					
--	---	--	--	--	--	--

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση των 100-125 κ.εκ./στρ. χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των πλατυφύλλων ζιζανίων, ενώ η δόση των 150 κ.εκ./στρ. εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της γλυστρίδας, των ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων ή όταν χρειάζεται υπολειμματική διάρκεια δράσης για την καταπολέμηση από εδάφους των ζιζανίων που θα βλαστήσουν μετά την εφαρμογή.
2. Για τα ζιζάνια Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) και Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*) η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μέχρι το τρίτο φύλλο του ζιζανίου (BBCH 13).

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να γίνει άμεσα επανασπορά του καλαμποκιού.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί να σπαρθεί σιτάρι το επόμενο φθινόπωρο (5 μήνες μετά την εφαρμογή).
12 μήνες μετά την εφαρμογή (την επόμενη άνοιξη),

μπορούν να σπαρθούν βαμβάκι, ηλίανθος, σόργο, σόγια και αραχίδια.
Να μην σπέρνεται χειμερινή ελαιοκράμβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.
 Να μην σπέρνονται τεύτλα, μηδική, καπνός, λαχανικά, πατάτα, φασόλια και άλλα ψυχανθή, πριν περάσουν 18 μήνες μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Η επανείσοδος των εργατών μπορεί να γίνει 14 ημέρες μετά την εφαρμογή.

11

Δηλώσεις
 Προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
P264: Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

*Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση/ εφαρμογή του σκευάσματος.
 Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια.
 Όταν η καλλιέργεια γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήσετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από αυτή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.*

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη φυτικής ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε από τη γεωργική γη μian απέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

- Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά ακόλουθα στοιχεία: Finalization of the assessment of the data to further address the toxicological profile of metabolite AMBA (at RMS level as confirmatory data of the ai). Pending the assessment of the confirmatory data, the residue definition in feed commodities is considered as provisional.
- **Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 11565/317640/19.11.2021 υ.α. για το προϊόν LUMAX 537,5 SE.**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5376/53039/15.05.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ