



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.12.2021
Αριθ. πρωτ: 12289/338755

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON S.p.A., Ιταλίας
(Δια της SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ)
e-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70195 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) AXION COMBI (pendimethalin 25% β/ο + terbuthylazine 12,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη).
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofor, fluorogran, ipconazole και **terbuthylazine** μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
5. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 12265/133397/30.01.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70195 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) AXION COMBI (pendimethalin 25% β/ο + terbuthylazine 12,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 12289/338755/29.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70195 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) AXION COMBI (pendimethalin 25% β/ο + terbutylazine 12,5% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 12265/133397/30.01.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Τα σημεία 5, 7 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./ στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	400	20-50	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας μετά τη σπορά	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό
Βαμβάκι GOSHE	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	400	20-50	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας μετά τη σπορά	
	<i>Cynodon dactylon</i> (Αγριάδα)	600	20-50	Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας μετά τη σπορά	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <p>1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια Καλαμπόκι Πολύ Ευαίσθητα: <i>Polygonum aviculare</i> (Πολυκόμπι) POLAV, <i>Polygonum convolvulus</i> (Πολύγωνο) POLCO, <i>Portulaca oleracea</i> (Αντράκλα) POROL, <i>Veronica persicaria</i> (Βερόνικα). Ευαίσθητα: <i>Amaranthus retroflexus</i> (Τραχύ Βλήτο) AMARE, <i>Chenopodium album</i> (Λουβουδιά) CHEAL, <i>Datura stramonium</i> (Τάτουλας) DATST, <i>Echinochloa crus-galli</i> (Μουχρίτσα) ECHCG, <i>Polygonum persicaria</i> (Αγριοπιπεριά) POLPE, <i>Setaria spp.</i> (Σετάρια) SETSS, <i>Solanum nigrum</i> (Αγριοτοματιά) SOLNI, <i>Xanthium spp.</i> (Αγκάθι) XANSS. Μετρίως ευαίσθητα: <i>Abutilon theophrasti</i> (Αγριοβαμβακιά) ABUTH, <i>Euphorbia prostrata</i>, <i>Heliotropium europaeum</i> (κοινό ηλιοτρόπιο) HEOEU, <i>Solanum physalifolium</i> SOLPS</p> <p>Βαμβάκι Ευαίσθητα: <i>Amaranthus retroflexus</i> (Τραχύ Βλήτο) AMARE, <i>Chenopodium album</i> (Λουβουδιά) CHEAL, <i>Datura stramonium</i> (Τάτουλας) DATST, <i>Polygonum persicaria</i> (Αγριοπιπεριά) POLPE, <i>Portulaca oleracea</i> (Αντράκλα) POROL, <i>Solanum nigrum</i> (Αγριοτοματιά) SOLNI, <i>Xanthium strumarium</i> (Αγριομελιτζάνα) XANST, <i>Echinochloa crus-galli</i> (Μουχρίτσα) ECHCG Μετρίως ευαίσθητα: <i>Abutilon theophrasti</i> (Αγριοβαμβακιά) ABUTH, <i>Sorghum halepense</i> (Βέλιουρας) SORHA. *<i>Cynodon dactylon</i> CYNDA (Αγριάδα /στη δόση των 600 κ. εκ./στρ.).</p> <p>2. Η δράση του AXION COMBI στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν αναμένεται βροχόπτωση εντός 2 εβδομάδων, συνιστάται ελαφρύ πότισμα 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.</p>					

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας αραβοσίτου ή βαμβακιού, μπορεί να ξανασπαρεί άμεσα μόνο αραβόσιτος ή βαμβάκι αφού προηγηθεί άροση του εδάφους.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Μετά από βαθιά άροση (40 εκ.) και περίοδο αναμονής τουλάχιστον 10 μηνών από την εφαρμογή του προϊόντος.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

11

Δηλώσεις Προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια εντός 7 ημερών οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αραβόσιτου και μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας έως τις 14.02.2022.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 14.05.2022.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 14.06.2022.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 12265/133397/30.01.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ