



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 18.12.2003**

**Αριθ. Πρωτ.: 117712**

**Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 2124498**

**FAX: 3617103**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν, (μυκητοκτόνο)  
SPOTANIL 72 SC**

**ΠΡΟΣ: 1) Παπαικονόμου Αγροχημικά ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 89  
570 22 Σίνδος Θεσ/νίκη  
(Με απόδειξη)  
2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/σεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου  
Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας  
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β παρ.1
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 84850/23-7-93 απόφασή μας με την οποία ανανεώθηκε, διευρύνθηκε και τροποποιήθηκε η με αριθ. 6368 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο με το αιτούμενο σκεύασμα, JUPITAL 72 SC, καθώς και τη με αριθ. 90229/29-2-00 απόφασή μας για την τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των μυκητοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία chlorothalonil, ως προς τις φράσεις R.
5. Τη με αριθ. 111892/2-10-03 (ΦΕΚ 1506/Β/13-10-2003) απόφασή μας για την «Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν σαν δραστική ουσία chlorothalonil, ως προς το φάσμα δράσης».
6. Τη με αριθ 399580/30-10-2001 (Β'1479/31-10-2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη».
7. Τις από 20-5-03 και 10-9-03 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 10-9-03 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6921 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** SPOTANIL 72 SC
- 2. Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση :** chlorothalonil 72 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 45,6 % β/β
- 4. Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: 98% min, του οίκου Syngenta Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
- 5. Παρασκευαστής:** ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ.89, 570 22 Σίνδος
- 6. Αντιπρόσωπος:** -
- 7. Τυποποιητής:** SIPCAM PHYTEUROP, Γαλλία
- 8. Συσκευαστής:** Ο παρασκευαστής
- 9. Συσκευασία:** **9α. Είδος-Μέγεθος:****α1.** Φιάλες των 150, 200, 300, 400, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου  
**α2.** Μπιτόνια των 2.5, 3 και 5 λίτρων  
**9β. Υλικό:****β1, β2** Πολυαιθυλένιο (HDPE)
- 10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:**  
Οργανικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.
- 11.Τρόπος εφαρμογής :** Ψεκασμοί φυλλώματος μεγάλου όγκου. Πρέπει να γίνεται καλή διαβροχή.
- 12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**  
-Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  
-Ανακινήστε αργά τη φιάλη πριν από τη χρήση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.  
-Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

### 13. Φάσμα δράσης.

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις κ.εκ. /100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκαστ. υγρού λίτρα/στρ.	Χρόνος εφαρμογής
Μηλοειδή Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (Venturia pirina)	135	100-150	Έως 4 εφαρμογές: στα στάδια της πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 15- 20 ημέρες αργότερα.
	Σεπτορίωση (Septoria spp.)	135		2-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές (λευκή κορυφή, πτώση πετάλων και 15 ημέρες μετά).
	Σκωρίαση (Gymnosporangium sp.)	135		Εφαρμογές που αρχίζουν ενωρίς την άνοιξη στην πτώση των πετάλων.

<b>Πυρηνόκαρπα</b> Βερικοκιά, Ροδακινιά, (συμπεριλαμβανο- μένων των νεκταρινιών)	Φαιά σήψη ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	135	100-150	3-4 εφαρμογές στην περίοδο της άνθησης (ρόδινη κορυφή, 50% άνθησης, πλήρης άνθηση, πτώση των πετάλων).
Αμπέλι (επιτραπέζια)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	180-240	100	4 εφαρμογές: -όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. -μετά από 10 ημέρες -λίγο πριν την άνθηση -λίγο μετά τη γονιμοποίηση
	Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> )	260-310		Εφαρμογή μία φορά στην αρχή της ωρίμανσης (γυάλισμα) και επανάληψη 3 εβδομάδες πριν τον τρυγητό.
Αμπέλι (οινοποιήσιμα)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	135	100	4 εφαρμογές: -όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. -μετά από 10 ημέρες -λίγο πριν την άνθηση -λίγο μετά τη γονιμοποίηση
	Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> )	135		Εφαρμογή μία φορά στην αρχή της ωρίμανσης (γυάλισμα) και επανάληψη 3 εβδομάδες πριν τον τρυγητό.
<b>Σολανώδη</b> Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria spp.</i> ) Περονόσπορος ( <i>Peronospora spp.</i> ) Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Σεπτορίωση ( <i>Septoria spp.</i> ) Ανθράκνωση ( <i>Colletotrichum spp.</i> ) Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium spp.</i> )	210-260	100	Έως 4 εφαρμογές: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

<b>Κολοκυνθοειδή</b> Αγγούρι Πεπόνι, Καρπούζι	Περονόσπορος ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria</i> spp.) Ανθράκνωση ( <i>Colletotrichum lagenarium</i> ) Κομμίωση ( <i>Didymella bryoniae</i> ) Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora</i> sp.) Τεφρά σήψη ( <i>Botrytis cinerea</i> ) Κλαδοσπορίωση ( <i>Cladosporium</i> spp.)	205	100	Έως 4 εφαρμογές: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Σέλινο	Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora apii</i> ) Σεπτορίωση ( <i>Septoria apii</i> )	155-205	100	3 εφαρμογές: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
<b>Όσπρια</b> Φασόλια, Ρεβίθια	Σκωρίαση ( <i>Uromyces</i> spp.)	205	80	3 εφαρμογές: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Πατάτα	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora infestans</i> ) Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria solani</i> )	155-205	100	3 εφαρμογές: Από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. κάθε 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Ζαχαρότευτλα	Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora beticola</i> )	205	100	3 εφαρμογές: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Καπνός	Περονόσπορος ( <i>Phytophthora tabacina</i> ) Αλτερναρίωση ( <i>Alternaria</i> sp.)	205	100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Γαρύφαλλο	Σκωρίαση ( <i>Uromyces</i> spp.)	260-310	100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

## **Παρατηρήσεις:**

1. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.

Στις καλλιέργειες αχλαδιά, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, πατάτα και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων, όπου αυτά εφαρμόζονται.

2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.

### **14. Φυτοτοξικότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό αν εφαρμόζεται στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, και υπό τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Σε ορισμένες ποικιλίες αμπέλου πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από την πτώση των πετάλων.

Στα γαρύφαλλα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του όταν τα άνθη είναι ανοιχτά, προς αποφυγή κηλιδώσεως των ανθέων.

### **15. Συνδυαστικότητα:**

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

Με τα γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα απαιτείται προηγουμένως δοκιμή.

Δεν συνδυάζεται με το TEDION V 18 ούτε με προσκολλητικά.

16. **Σημάνσεις Τοξικότητας:** Χn, Επικίνδυνο-Χi, Ερεθιστικό

### **17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις):**

**R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

**R36/37/38** Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

**R40** Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων βλαβών υγείας.

### **18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):**

**RO5/8** Τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς.

### **19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):**

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.

**S23** Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

**S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί.

**S28** Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

**S35** Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με τρύπημα και θάψιμο.

**S36/37/39** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

**S44** Αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

**SY10** Μην αυξάνετε τις δόσεις.

### **20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :**

-Αν πέσει στα μάτια ξεπλύνετέ τα με άφθονο νερό επί 15΄ και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

-Ατομα που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση να συμβουλευονται γιατρό.

Αντίδοτο δεν υπάρχει ειδικό. Γι΄ αλλεργικά συμπτώματα συνιστώνται αντισταμινικά και κρέμες στεροειδούς συνθέσεως ή και διασυστηματικά στεροειδή.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777**

### **21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):**

**SO4** Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

### **22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (II φράσεις):**

**ΠΙ** -Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Ροδάκινα (συμπεριλαμβανομένων των νεκταρινιών): στο στάδιο του καρπού μεγέθους καρυδιού (30 ημέρες για τις πρώιμες ποικιλίες και 45 για τις όψιμες)

Φασόλια, Ρεβίθια: 42 ημέρες

Αχλάδια, Βερίκοκα, Αμπέλι: 21 ημέρες

Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Πιπεριά, Σέλινο, Πατάτα Ζαχαρότευτλα: 10 ημέρες

Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2007.**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**