



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.02.2022  
Αριθ. πρωτ: 12626/350178π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής  
e-mail: [voula.kalliakaki@syngenta.com](mailto:voula.kalliakaki@syngenta.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 14757 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MONKONDA 1.5 GR (tefluthrin 1,5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
4. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 10045/267447/05.10.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14757 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MONKONDA 1.5 GR (tefluthrin 1,5% β/β).
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 12626/350178/07.12.2021 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14757 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MONKONDA 1.5 GR (tefluthrin 1,5% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.

10045/267447/05.10.2020 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης          |  |                    |                             |                                  |  |   |
|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|
| Πεδίο Εφαρμογής         | Στόχος   | Δόσεις σκευάσματος |                             |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής  | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα |
|                         |  | γρ./στρ.           | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |  |   |
| Αραβόσιτος (ΖΕΑΜΧ)      | Διαβρώτικα ( <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI)                     | 1220               |                             |                                  | BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 3 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα | 1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια                             |
|                         | Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)                      | 350-500            | -                           | -                                |  | 1   |
|                         | Αγρότιδα ή Καραφατμε ή Κοφτοσκούληκα ( <i>Agrotis spp.</i> - AGROSP) |                    |                             |                                  |  |   |
|                         | Σύμφυλα ( <i>Scutigerella immaculata</i> - SCUTIM)                   |                    |                             |                                  |  |   |
| Γλυκό Καλαμπόκι (ΖΕΑΜΣ) | Διαβρώτικα ( <i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)                   | 1220               |                             |                                  | BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 3 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα | 1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια                             |
|                         | Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)                      | 350-500            | -                           | -                                |  | 1   |
|                         | Αγρότιδα ή Καραφατμε ή Κοφτοσκούληκα ( <i>Agrotis spp.</i> - AGROSP) |                    |                             |                                  |  |   |
|                         | Σύμφυλα ( <i>Scutigerella immaculata</i> - SCUTIM)                   |                    |                             |                                  |  |   |

|   |   |         |   |   |  |                            |
|---|---|---------|---|---|--|----------------------------|
| Σόργο<br>(SORVU)  | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)   | 1220    | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 3<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα.            | 1 εφαρμογή ανά 3<br>χρόνια |
| Βαμβάκι<br>(GOSHI)  | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Κοφτοσκούληκα<br>( <i>Agrotis spp.</i> -<br>AGROSP)  | 350-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα.            | 1                          |
| Ζαχαρότευτλα<br>(BEAVA)   | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> –<br>AGRISP)<br><br>Κοφτοσκούληκα<br>( <i>Agrotis spp.</i> -<br>AGROSP)  | 350-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα.            | 1                          |
| Καπνός<br>(NIOTA)   | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i><br>AGRISP)<br><br>Κοφτοσκούληκα<br>( <i>Agrotis sp.</i><br>AGRISP)<br><br>Τιπούλα<br>( <i>Tipula spp.</i><br>TIPUSP) | 350-500 | - | - | BBCH 12<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη<br>μεταφύτευση με<br>κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα    | 1                          |
| Ηλίανθος<br>(HELAN)   | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)   | 1000    | - | - | BBCH00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 4<br>cm σε αυλάκι κατά<br>τη σπορά με<br>κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1                          |
| Φασολάκια<br>(με λοβό)<br>(PHSVX)<br><br>Μπιζέλια<br>(με λοβό)<br>(PIBSX) | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Υλέμια<br>( <i>Delia spp.</i> - DELISP)  | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 4<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα             | 1                          |
| Γογγύλι<br>(BRSRR)<br><br>Γουλί<br>(BRSNN)                                | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Υλέμια<br>( <i>Delia spp.</i> - DELISP)  | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο                              | 1                          |

|                      |  |         |   |   |  |   |
|----------------------|--|---------|---|---|--|---|
|                      |  |         |   |   | κοκκοδιανομέα  |   |
| Παντζάρι<br>(BEAVX)  | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> –<br>AGRISP)<br><br>Μηλολόνη<br>( <i>Melolontha<br/>melolontha-<br/>MELOME</i> )                          | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |
| Σέλερι<br>(APUGD)    | Ψύλλα<br>( <i>Psila rosae</i> –<br>PSILRO)   | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |
| Ραπανάκια<br>(RAPSR) | Υλέμια<br>( <i>Delia spp.</i> – DELISP)  | 300-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |
| Καρότο<br>(DAUCS)    | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Ψύλλα<br>( <i>Psila rosae</i> -PSILRO)<br><br>Υλέμια<br>( <i>Delia spp.</i> - DELISP) | 300-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |

**Παρατηρήσεις:**

1. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα του σκευάσματος σε 3 ημερολογιακά έτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1220 γραμ. ανά στρέμμα.
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.

**11**Δηλώσεις  
προφύλαξης**P405+102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.**P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.*Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.**Οι εργάτες να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.***P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

**SPe 3:** Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες αραβόσιτος, γλυκός αραβόσιτος, σόργο, καρότο, **σέλερι**, παντζάρι, ραπανάκι, γογγύλι, γουλί, ζαχαρότευτλα και καπνό.

**SPe 5:** Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.

**SPe 6:** Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια θηλαστικά μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

**SPe 8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Αποφύγετε την εκπομπή σκόνης εάν υπάρχουν ανθισμένα φυτά στις άκρες του χωραφιού.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Πεδίο εφαρμογής  | PHI<br>(σε ημέρες)                     |
|--|--|
| <b>Σέλερι</b>  | 110                                    |
| Ραπανάκια  | 21                                     |
| Αραβόσιτος, Σόργο, Γλυκό Καλαμπόκι, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος, Φασολάκια (με λοβό) Μπιζέλια (με λοβό) Γογγύλι, Γουλί, Παντζάρι, Καρότο | Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής |
| Καπνός   | Δεν ορίζεται                           |

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 10045/267447/05.10.2020 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ