



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 18-04-2022
 Αριθ. πρωτ: 3414/96973

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα	Προς:	ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας
Πληροφορίες:	Ηλ. Νασιόπουλος		«Η Ένωση»
Τηλέφωνο:	210 9287211		easorest@otenet.gr
e-mail:	inasiopoulos@minagric.gr	Κοιν.:	SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν STAPLE SL (δραστική ουσία: *pyrithiobac-sodium*), για μεταφυτρωτική χρήση στο βαμβάκι »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την αριθ. 5171/70387/15.5.18 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 10333/286388/14.10.2021 αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ για λογαριασμό του του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση» και τη καταχώριση αυτής στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS) με κωδικό 5384.
8. Το αριθ. ΕΜΠ 2859/5.11.2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

9. Το από 8-2-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
10. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 10333/286388 π.ε./22.2.2022 Απόφαση με θέμα “*Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν STAPLE SL (δραστική ουσία: pyriithiobac-sodium), για μεταφωτρωτική χρήση στο βαμβάκι*”.
12. Τη με αριθ. πρωτ. 1791/54253/28.02.2022 Ιεραρχική Προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία “SIPCAM HELLAS ” κατά της υπ' αριθ. 10333/286388ΠΕ/22.2.2022 απορριπτικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Τη με αριθ. πρωτ. 1521/8.4.2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία γίνεται αποδεκτή η ανωτέρω ιεραρχική προσφυγή.

Αποφασίζουμε

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν STAPLE SL (δρ. ουσία: *pyriithiobac-sodium*), για μεταφωτρωτική χρήση σε καλλιέργεια **βαμβακιού** εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων: Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηλείας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αττικής, Εύβοιας, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Καβάλας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.157
18-04-2022
15-08-2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

STAPLE SL
Πυκνό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<i>Pyriithiobac-sodium</i>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96,4 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Ανάλογο βενζοϊκού οξέος - Πυριμιδίνης
Παρασκευαστής	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 4-26 Ikenohata 1-chome, Taitoh-ku, Tokyo 110-8782, Japan Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε. την εταιρεία K-I Chemical Europe S.A./N.V. Avenue Louise, 287, box 13, 1050 Brussels, Belgium
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Kumiai Chemical Industry Co., Ltd, Shizuoka Factory 1800 Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 421-3306 Japan
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>Pyriithiobac sodium</i> είναι εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένουν στη διάθεση της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της άδειας:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Α.Σ. Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση»
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βασιλ. Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βας. Κωνσταντίνου 32 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM OXON SpA
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

SIPCAM OXON SpA
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro
(LO), Ιταλία

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SIPCAM OXON SpA, Ιταλία
2. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
Νέα Σάντα, Τ.Κ. 56403 – Κιλκίς
3. Torre srl, Torrenieri (Si), Ιταλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Pyriithiobac-sodium: 38,3 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 65,84 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτικό στοιχείο και παραμένει στη διάθεση της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	200 κ.εκ. , 500 κ.εκ.	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε την φιάλη πριν την εφαρμογή. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές προτείνεται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού ΚΡΙΤΟΝ στην συνιστώμενη δόση, υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τρεις (3) φορές, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή η καταστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε εμπορικούς αποτεφρωτές. Άδειες συσκευασίες θα πρέπει να πλένονται καλά με άφθονο νερό και τα νερά του ξεπλύματος να προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό. Μετά τη διαδικασία αυτή οι άδειες συσκευασίες αποσύρονται είτε με καύση σε αποτεφρωτή είτε ως οικιακά απόβλητα αφού προηγουμένως καταστεί (πχ με τρύπημα) αδύνατη η περαιτέρω χρήση τους.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά για τον έλεγχο ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων από σπόρο ή και ανεπτυγμένων στο βαμβάκι.</p> <p>Εμποδίζει την σύνθεση αμινοξέων των φυτών και οδηγεί σε νέκρωση των ιστών. Απορροφάτε από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταματούν να αναπτύσσονται και γίνονται χλωρωτικά μετά από 5-10 ημέρες. Τα ευαίσθητα ζιζάνια ξηραίνονται σε 2-4 εβδομάδες ενώ άλλα παραμένουν πράσινα αλλά δεν αναπτύσσονται και είναι ανενεργά.</p>
----------	------------------------------	--

5. 5.1 Φάσμα δράσης:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος/ζιζάνιο	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Βαμβάκι GOSHI	Πορφυρή κύπερη (<i>Cyperus rotundus</i>) CYPRO Κίτρινη κύπερη (<i>Cyperus esculentus</i>) CYPES	18	20-40	Μετασπαρτικά-Προφυτρωτικά	1/3 έτη
	Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>) ABUTH Βλήτα (<i>Amaranthus</i> spp.) AMASS Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium strumarium</i>) XANST Τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>) AMARE Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) DATST Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) SOLNI	18	20-40	Μεταφυτρωτικά Μετά την ανάπτυξη του πρώτου φύλλου του βαμβακιού και μέχρι τα φυτά να φτάσουν τα 15 εκ. ύψος	1/3 έτη
	Κύπερη (<i>Cyperus</i> spp) CYPSS			Εφαρμογή στα 2-6 φύλλα ανάπτυξης	
<p>Εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις αποτυχίας της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο βαμβάκι. Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι' αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες άλλες καλλιέργειες. • Η χρήση περιορίζεται σε μία εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό. • Η εφαρμογή του STAPLE να αποφεύγεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση των μεταβολιτών στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη, σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση). <p>Για τις μεταφυτρωτικές εφαρμογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να γίνονται μόνο εφ' όσον το βαμβάκι και τα ζιζάνια δεν είναι σε κατάσταση στρες από κρύο, ξηρασία, υγρασία, προσβολές εντόμων ή άλλο. • Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι πάνω από 21° C και το βαμβάκι αλλά και τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ζωηρής ανάπτυξης. • Προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με το επιφανειοδραστικό σκεύασμα KRITÓN στην κατάλληλη δόση. <p>Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.</p> <p>Για τις μετασπαρτικές - προφυτρωτικές εφαρμογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το έδαφος θα πρέπει να είναι ψιλοχωματισμένο. • Εάν δεν βρέξει εντός 4-7 ημερες μετά την εφαρμογή να ακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή. • Να μην αυξάνετε τις δόσεις και να αποφεύγετε τα διπλοπεράσματα. 					

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>Διαχείριση ανθεκτικότητας:</p> <p>Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyriithiobac-sodium που ανήκει στην ομάδα B2 κατά HRAC.</p> <p>Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.</p>
----------	---	--

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας βαμβακιού στην οποία χρησιμοποιήθηκε το STAPLE SL, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί βαμβάκι μετά από όργωμα.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιιεργειών που ακολουθούν

Στο χωράφι που εφαρμόστηκε το STAPLE SL μπορούν να σπαρθούν τα εξής: σιτάρι μετά από 4 μήνες, 30 ημέρες για όσπρια/ελαιούχους σπόρους.


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για την προτεινόμενη καλλιέργεια και δόσεις. Είναι πιθανόν κατά την 1^η – 2^η εβδομάδα μετά την εφαρμογή να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του βαμβακιού. Το φαινόμενο είναι συνάρτηση της δόσης που τελικά χρησιμοποιήθηκε. Είναι όμως παροδικό και δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH 208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP 1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους τηρείτε μίαν ανέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική:
 - 10 μέτρων ή
 - 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
 - χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες:

- P305+P351+P338+P337+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και καλέστε προληπτικά γιατρό. Εάν ο ασθενής είναι αναισθητός διατηρήστε σε σταθερή θέση για μεταφορά.
- Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα χωρίς να καταπιείτε, Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Β. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Η εταιρεία SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η εταιρεία SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες ΑΣ την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της.
8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31.10.2022 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
 - 8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
 - 8.5. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης του σκευάσματος σε ορυζώνες που διενεργήθηκε ψευδοσπορά.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποιήσε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ