



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.10.2022
Αριθ. πρωτ: 6527/187194

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Κοτσαρίνη
Τηλέφωνο: 210 92 87 256
e-mail: dkotsarini@minagric.gr

Προς: SINON EU GmbH, Γερμανίας
(διά του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ
Φιλικής Εταιρείας 3,
144 52, Μεταμόρφωση)
E-mail: info@hybridshellas.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CALIZI (δ.ο azoxystrobin 25% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2019/291 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών.....**azoxystrobin**....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).

4. Την αριθμ. 60485 άδεια του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SINSTAR 250 SC (azoxystrobin 25% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 5645/66835/03.12.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 6527/187194/04.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **CALIZI** της εταιρείας **SINON EU GmbH**, Γερμανίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

61087

24.10.2022

31.12.2025

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CALIZI

1.2.β Μορφή:

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

1.3 Δραστικές ουσίες

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

azoxystrobin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

96,5% (β/β) min

Χημική ομάδα

Στρομπιλουρίνες

Παρασκευαστής

1. SINON CORPORATION

1F., No 101, Nanrong Road, Dadu District, Taichung City 43245, Taiwan

2. Syngenta Crop Protection AG,

Schwarzwaldallee 215,
CH-4058 Basel, Switzerland

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. SINON CORPORATION

No 101, Narnrong Road, Dadu District, Taichung City 43245, Ταϊβάν.

2. Syngenta Limited,

Grangemouth Manufacturing Centre
Earls Road, Grangemouth, Stirlingshire FK3 8XG,
Αγγλία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azoxystrobin είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

SINON EU GmbH
 ImAltenDorfe 37 (Volksdorf),
 D-22359 Hamburg Γερμανία
 tel: +49-406599 5039
 fax: +49-406599 5158
 e-mail: sinoneu@aol.com
 Contact: Mr Hans Brandt

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ
 Φιλικής Εταιρείας 3,
 144 52, Μεταμόρφωση
 Τηλ.: 210 2836440
 Fax: 210 2836240
 E-mail: info@hybridshellas.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ
 Φιλικής Εταιρείας 3,
 144 52, Μεταμόρφωση
 Τηλ.: 210 2836440
 Fax: 210 2836240
 E-mail: info@hybridshellas.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SINON EU GmbH
 ImAltenDorfe 37 (Volksdorf),
 D-22359 Hamburg Γερμανία

ε) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) SINON CORPORATION
 Plant address: No. 111, Chung Shan Rd., Ta-Tu Hsiang,
 Taichung Hsien, Taiwan 432

2) CHEMIA S.p.A.
 Strada Stratale 255, km 46 - 44047 Dosso (FE)

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. SINON CORPORATION**
Plant address: No. 111, Chung Shan Rd., Ta-Tu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan 432
- 2. CHEMIA S.p.A.**
Strada Stratale 255, km 46 - 44047 Dosso (FE)
- 3. ΣΕΓΕ**, Οινόφυτα Βοιωτίας
- 4. ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.**, 190 14 Αφίδνες, Αττικής
- 5. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ**, ΒΙΠΕΘ Σίνδος, Θεσ/νικη
- 6. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ**, Περιβοίας 6, 14564- Ν. Κηφισιά

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Azoxystrobin 25% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,2% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το αριθμό πρωτοκόλλου 9783/23763/23.09.2019 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν SINSTAR 250 SC είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	25 ml - 1 λίτρο.	Πλαστικό HDPE
2	Φιάλη εντός χαρτοκιτίου	25 ml - 1 λίτρο.	Πλαστικό HDPE, Κουτί από χαρτόνι

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Ξεπλύνετε τη φιάλη και ρίξτε το ξέπλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο της Ομάδας των Στρομπιλουρινών με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Μέρος του σκευάσματος παραμένει στη φυλλική επιφάνεια και το υπόλοιπο απορροφάται και διανέμεται ομοιόμορφα μέσα στο φυτό (με κίνηση διασυστηματική και διελασματική). Είναι αποτελεσματικό σε χαμηλές δόσεις.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. /στρ.	κ.εκ. /100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα /στρ.		
ΑΜΠΕΛΙ (VITVI)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i> - UNCINE) Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i> - PLASVI)	100	100-500	20-100	Ψεκασμοί φυλλώματος προστατευτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2/10-12
ΤΟΜΑΤΑ (LYPES)	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> LEVETA) Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i> - PHYTIN) Αλτερνάρια (<i>Alternaria</i> sp. - ALTESP)	70-80	87,5-400	20-80	Ψεκασμοί φυλλώματος προστατευτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.	2/7-10
Σιτάρι (TRZSS)	Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i> - SEPTTR) Σκωρίαση (<i>Puccinia triticina</i> - PUCCRT)	60-100	-	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Βρώμη (AVESA)	Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i> - SEPTTR) Σκωρίαση (<i>Puccinia triticina</i> - PUCCRT)	60-100	-	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη έκπτυξη του στάχew (BBCH 30-59).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Σίκαλη (SECCE)	Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i> - SEPTTR) Σκωρίαση (<i>Puccinia triticina</i> - PUCCRT)	60-100	-	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Κριθάρι (HORVX)	Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i> - SEPTTR) Σκωρίαση (<i>Puccinia triticina</i> - PUCCRT)	60-100	-	20-30	Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους έως την πλήρη έκπτυξη του στάχewς (BBCH 30-59).	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις:

1. Να μην χρησιμοποιείται σε σπορεία και φυτώρια.
2. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη δόση ή το συντομότερο διάστημα εφαρμογής εφόσον υπάρχουν συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη παθογένειας.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Azoxystrobin που ανήκει στην ομάδα 11 κατά FRAC.

Συνιστάται:

- η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- να μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.
- να μην αυξάνετε τις δόσεις.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

-Να μην χρησιμοποιείται σε σπορεία και φυτώρια τομάτας.
 -Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή του προϊόντος, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς λόγω της φυτοτοξικότητας που παρουσιάζει στις μηλιές. Ακόμα και ίχνη μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
 -Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.

9 Εικονογράμματα κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.»

Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από την καλλιέργεια της τομάτας, σιταριού, βρώμης, σίκαλης και κριθαριού.

SPe3: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εδάφη με ποσοστό άμμου πάνω από 80% καθώς και σε αλκαλικά εδάφη.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε γιατρό.
Γενική Οδηγία: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και χαλαρώστε τα υπόλοιπα ρούχα. Τοποθετήστε το παθόντα σε αναπαυτική θέση και κρατήστε τον ζεστό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν εμφανιστούν συμπτώματα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Έχετε τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εμφανισθούν συμπτώματα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και πιείτε αρκετό νερό. Αν προκληθεί εμετός πιείτε και πάλι νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Οδηγίες για τον γιατρό: Η θεραπεία πρέπει να κατευθυνθεί στον έλεγχο των συμπτωμάτων και της κλινικής κατάστασης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα αναπνευστικά συμπτώματα.
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλ.Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (0151010, 0151020)	21
Τομάτα(0231010)	3
Σιτάρι (0500090) Βρώμη (0500050) Σίκαλη (0500070) Κριθάρι (0500010)	35

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30°C) και καλά αεριζόμενο μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στην Έκθεση Αξιολόγησης που στηρίχθηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος SINSTAR 250 SC, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων**

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταθέσει στη ΣΕΑ από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του πανομοιότυπου προϊόντος SINSTAR 250 SC με αριθμ. πρωτοκόλλου 5645/66835/03.12.2015 μελέτη παρακολούθησης της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών αυτής, η οποία θα έχει διεξαχθεί στα υπόγεια ύδατα, επί τρία έτη.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ