



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.07.2022
Αριθ. πρωτ: 6834/199159

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα / Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287165/210 9287225
e-mail: lapocha@minagric.gr
dkaramanou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττική

email: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70194 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE (s-metolachlor 31,25% β/ο + terbutylazine 18,75 % β/ο) ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Την αριθμ. 10436/114112/04.01.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70194 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE (s-metolachlor 31,25% β/ο + terbutylazine 18,75 % β/ο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 6834/199159/12.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. 70194 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SE (s-metolachlor 31,25% β/ο + terbutylazine 18,75 % β/ο),

που χορηγήθηκε με την αριθμ. 10436/114112/04.01.2017 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ηλιάνθος	Ευαίσθητα: -Βλήτα (<i>Amaranthus retroflexus</i> ,	400	--	20-30	Προφυτρωτικά (BBCH 00-11)	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό
Αραβόσιτος	<i>Amaranthus blitoides</i>) - Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) -Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) - Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>) -Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) - Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>) -Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>) -Γλυστρίδα (<i>Portulaca oleracea</i>) -Σετάρια (<i>Setaria viridis</i> , <i>Setaria verticillata</i>) -Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) -Βέλιουρας (από σπόρο) (<i>Sorghum halepense</i>) -Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i>) Μετρίως ευαίσθητα: - Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>)	400-450	--	20-30	α) Προσπαρτικά σε ξηρό έδαφος με ενσωμάτωση μέσα σε μία δύο ημέρες (3-5 εκ.). Η εφαρμογή αυτή προτιμάται σε περιοχές με χαμηλή βροχόπτωση. β) Προφυτρωτικά (1-4 ημέρες μετά την σπορά αλλά πριν το φύτευμα της καλλιέργειας και των ζιζανίων). (BBCH 00-10)	

Αραβόσιτος	<p>Ευαίσθητα:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) -Βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>, <i>Amaranthus blitoides</i>) -Αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>) -Γλυστρίδα (<i>Portulaca oleracea</i>) -Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) -Σετάρια (<i>Setaria verticilata</i>) <p>Μετρίως ευαίσθητα:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>) -Σετάρια (<i>Setaria viridis</i>) -Βέλιουρας (από σπόρο) (<i>Sorghum halepense</i>) - Αγριοβαμβακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>) - Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>) -Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) - Πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>) -Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i>) 	350-400	-	20-30	<p>Μεταφυτρωτικά έως το 4^ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14), ή όταν οι μουχρίτσες και τα άλλα αγρωστώδη ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 2 φύλλων ενώ τα πλατύφυλλα είναι σε στάδιο 1-3 φύλλων.</p>	
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε βαριά εδάφη ή σε υψηλούς πληθυσμούς ζιζανίων. 2. Μη διπλοψεκάσετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. 3. Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα συνιστάται πότισμα σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βροχόπτωση εντός 1 εβδομάδας από την προφυτρωτική εφαρμογή. 						

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10436/114112/04.01.2017 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ