

Αθήνα, 28-9-1998

Αριθ. Πρωτ.: 74354

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 3-5
Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 3617103

Πληροφορίες: Α.Φονταρά
Τηλέφωνο: 52 91 411

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο γεωργικό
φάρμακο (μυκητοκτόνο)
ΧΕΛΛΑΒΑΞ-2Μ 20/40 WP

ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Φλέμιγκ 15
151 23 Μαρούσι

(Με απόδειξη)

2) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α) Δ/σεις Γεωργίας

Έδρες τους

β) Δ/σεις Εμπορίου

Έδρες τους

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρμάκων

Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για “την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων” και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 και τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 5.
2. Τη με αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας “για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων” Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά “τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων” καθώς και το με αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 140481/851/4-2-82 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6065 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όμοιο γεωργικό φάρμακο VITAVAX 2Μ WP.
5. Τη με αριθ. 358731/14-10-96 (ΦΕΚ 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για “ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη”.
6. Τις από 23-1-96 και 7-4-97 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 7-4-97 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 6706 στο γεωργικό φάρμακο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΧΕΛΛΑΒΑΞ-2Μ 20/40 WP
2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)

3. **Εγγυημένη σύνθεση** : carboxin 20 % β/β
 maneb 40 % β/β
 βοηθητικές ουσίες: 32,66 % β/β
4. **Καθαρότητα technicals** από τα οποία παρασκευάζεται: carboxin 96 % min
 maneb 86 % min
5. **Παρασκευαστής** : ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι
6. **Αντιπρόσωπος** :-
7. **Τυποποιητής** : ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα, Φθιώτιδα
8. **Συσκευαστής**: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα, Φθιώτιδα
9. **Συσκευασία** : **9α. Είδος - Μέγεθος**: **α.** Φακελάκια ή σακουλάκια των 50, 100, 125, 200, 225 και 250 γραμ.
β. Σακίδια μέσα σε κουτιά των 400 γραμ.
9β. Υλικό: **α.** Λαμιναρισμένα φακελάκια με 3 στρώματα (εξωτ. πλαστικοποιημένο χαρτί, ενδιάμεσο αλουμίνιο, εσωτ. πολυεθυλένιο) ή σακουλάκια πολυαιθυλενίου.
β. Σακίδια πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο.

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση, για απολύμανση σπόρων σποράς. Έχει χρώμα κόκκινο και εφαρμόζεται με επένδυση των σπόρων σποράς.

11. Τρόπος εφαρμογής :

α. Η επένδυση των σπόρων γίνεται μέσα σε μηχανήματα για απολύμανση μεγάλων ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με τη χρήση ενός πυκνού πολτού (slurry) στις κατωτέρω αναλογίες και με την εξής διαδικασία:

Στην ποσότητα του νερού που απαιτείται κατά περίπτωση, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος ΧΕΛΛΑΒΑΞ-2Μ 20/40 WP μέσα στο δοχείο της μηχανής.

Αφήνουμε για λίγο χρόνο μέχρι να διαλυθεί η βρέξιμη σκόνη και στη συνέχεια βάζουμε σε λειτουργία το σύστημα ανάδευσης για μερικά λεπτά της ώρας.

β. Με χρήση πιο απλών συσκευών (π.χ. μιας μετοπιέρας, βαρελιού ή και πλαστικών σάκων), πρέπει αρχικά να διαβραχεί ο σπόρος με λίγο νερό, με ανάμιξη για 1 λεπτό της ώρας. Ακολουθεί προσθήκη της αντίστοιχης ποσότητας ΧΕΛΛΑΒΑΧ-2Μ 20/40 WP και ανάμιξη επί 3-5 λεπτά της ώρας.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

13. Φάσμα δράσης.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ (γραμ./100 κιλά σπόρου)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σιτάρι	Φουζαρίωση (Fusarium moniliformae) Γυμνός άνθρακας (Ustilago maydis) Δαυλίτης (Tilletia sp.) Γραμμωτός άνθρακας (Urocystis tritici) Σήψεις ριζών (Ophiobolus graminis)	200	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.

Κριθάρι	Φουζαρίωση (Fusarium moniliformae) Γυμνός άνθρακας (Ustilago maydis) Σήψεις ριζών (Ophiobolus graminis) Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium sp.)	200	2-3 ημέρες πριν τη σπορά.
---------	---	-----	---------------------------

Παρατηρήσεις:

1. Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ανθρώπων ή ζώων.
2. Στους σάκους που συσκευάζονται οι επενδεδυμένοι σπόροι, να αναγράφεται η φράση “Οι σπόροι αυτοί είναι επενδεδυμένοι με carboxin και maneb.
Να μην χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων”.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

15. Συνδυαστικότητα:

Εφαρμόζεται μόνο του. Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο.

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xi Ερεθιστικό.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις):

RO14 Επικίνδυνο για τα πουλιά.

RO5 Τοξικό για τα ψάρια.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.

S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί.

SY1/4/5 Φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, γυαλιά, και μάσκα.

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

SY10 Μην αυξάνετε τις δόσεις.

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο :

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό ή κάνετε πλύση στομάχου.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 77 93 777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

(Π3) Μη χρησιμοποιείτε σπόρους επενδεδυμένους με ΧΕΛΛΑΒΑΞ-2Μ 20/40 WP σαν τροφή ή κτηνοτροφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασίες 15-25° C σε μέρος καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II.Ετικέτα:

α. Θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Η τελική ετικέτα θα προσκομισθεί στην υπηρεσία εντός εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσας απόφασης.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31.12. 2002.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ