



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.11.2022
Αριθ. πρωτ: 7274/211557

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: LAINCO S.A., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –
“AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 61084 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LAIZOX (azoxystrobin 25% β/ο) σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσοнос σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσοнос σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 3272/93569/07.07.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 61084 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LAIZOX (azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 7274/211557/21.07.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 61084 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LAIZOX (azoxystrobin 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 3272/93569/07.07.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσοнос σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)	κ.εκ./ στρέμμα		
Τομάτα LYPES (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης.	1-2/10
Μελιτζάνα (Θ)* SOLME <i>Χρήση</i> <i>Ήσσονος</i> <i>Σημασίας</i>	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης.	1-2/10
Αγγούρι CUMSA Αγγουράκι CUMSG) Κολοκυθάκι CUUPG (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης .	1-3 /10
Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CUUPE (Θερμοκηπίου)	Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	50-100	80	Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης .	1-3 /10
Ρύζι ORYSA	Πυρικουλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> PYRIOR Ελμινθοσπορίωση <i>Helminthosporium</i> sp. HELMSP	20-40	100	Μία εφαρμογή από το στάδιο φουσκώματος του κολεού – μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος	1
Πατάτα SOLTU	Αλτερναρίωση <i>Alternaria solani</i> ALTESO	20-60	50	Ψεκάσμος φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1 ^{ης} ταξιανθίας έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1 ^{ης} ταξιανθίας (BBCH 51-85)	1-2/14

<p><u>Ψυχανθή</u> Μπιζέλια με λοβό PIBSX Μπιζέλια χωρίς λοβό PIBSX</p> <p><u>Όσπρια</u> Μπιζέλια PISBX</p>	<p>Ασκοχύτωση <i>Ascochyta pisi</i> ASCOPI</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας: Σκωρίαση** <i>Uromyces pisi</i> UROMPS</p>	15-80	80-100	<p>Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 7^{ου} φύλλου/ έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος. (BBCH 17-72)</p>	1-2/10
<p><u>Ψυχανθή</u> Φασόλια με λοβό PHSVX Φασόλια χωρίς λοβό PHSVX Κουκιά φρέσκα VICFX</p> <p><u>Όσπρια</u> Φασόλια PHSVX Κουκιά VICFX</p>	<p>Ασκοχύτωση <i>Ascochyta fabae</i> ASCOFA</p> <p>Χρήση ήσσονος σημασίας: Σκωρίαση** <i>Uromyces pisi</i> UROMPS</p>	15-80	80-100	<p>Ψεκασμοί φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος. (BBCH 20-79)</p>	1-2/10
<p>Πιπεριά (Θ) CPSAN</p>	<p>Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA</p>	30-60	80-100	<p>Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)</p>	1-2/10
<p>Μπρόκολο* BR5OK</p> <p>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</p>	<p>Περονόσπορος <i>Peronospora parasitica</i> PEROPA</p>	30-60	80-100	<p>Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής και μέχρι να φτάσει στο 80% του τυπικού μεγέθους και μορφής. (BBCH 41-48)</p>	1-2/10
<p>Αγκινάρα* CYUSC</p> <p>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</p>	<p>Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA</p>	30-60	80-100	<p>Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, ψεκασμός φυλλώματος από όταν έχει αναπτυχθεί το 10% της μέγιστης φυλλικής</p>	1-2/10

				μάζας μέχρι την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής). (BBCH 41-55)	
Λωτός* DOSKA	Μυκοσφαιρέλα <i>Mycosphaerella nawae</i> MYCONA	50-100	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της άνθησης. (BBCH 60-69)	1-2/10

Παρατηρήσεις:

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια υπό κατάκλιση.

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μελιτζάνας (Θ), του μπρόκολου, της αγκινάρας και του λωτού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της σκωρίασης στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια (όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)	κ.εκ./ στρέμμα		
Ελαιοκράμβη BRSNN	Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	20-40	100	Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την αρχή της άνθησης μέχρι την πτώση των πετάλων. (BBCH 60-67)	1-2/10-14

Παρατηρήσεις:

- Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφινάρισμένου λαδιού καλλιέργειας ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

- Στο σημείο 11: Δηλώσεις προφύλαξης:

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης.

- Στο σημείο 13: Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Ελαιοκράμβη (0401060): 21 ημέρες

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες της πατάτας, του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:

- μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες μπιζελιού, κουκιών (πρώιμη εφαρμογή) και φασολιού (πρώιμη εφαρμογή), **αγκινάρας και μπρόκολου**
- μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες της τομάτας (Θ), **της μελιτζάνας (Θ)**, των κολοκυνθοειδών (Θ), της πιπεριάς (Θ), του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή)
- **από τα επιφανειακά ύδατα μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την καλλιέργεια του λωτού.**

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη για την καλλιέργεια του λωτού.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Τομάτα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030) , Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030), Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ)(0233030), Κολοκύθα (Θ) (0233020), Πιπεριά (Θ) (0231020)	3
Πατάτα (0211000), Αγκινάρα (0270050)	7

Μπιζέλια με λοβό (0260030), Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040) Φασόλια με λοβό (0260010) Φασόλια χωρίς λοβό (0260020) Κουκιά (φρέσκα) (0260010) Μπρόκολο (0241010)	14
Ρύζι (0500060)	28
Μπιζέλια (όσπρια) (0300030) Φασόλια (όσπρια) (0300010) Κουκιά (όσπρια) (0300010)	35
Λωτός (0162060)	Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3272/93569/07.07.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ