



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τη μονάδα μέτρησης της δόσης στη 2<sup>η</sup>, 3<sup>η</sup> και 4<sup>η</sup> σελίδα, απο το εσφαλμένο κ.εκ/στρ, στο ορθό γρ. σκ./στρ. (15.11.2022).

#### ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 14.11.2022  
Αριθ. πρωτ: 11583/340280

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  
Τηλέφωνο: 210 9287225  
e-mail: [dkaramanou@minagric.gr](mailto:dkaramanou@minagric.gr)

Προς: ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλίας  
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας,  
της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα  
E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr))

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70462 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MATSUDA WG (δ.ο flazasulfuron 25% β/β), ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος»

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
- Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε τη με αριθ. 70462 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MATSUDA WG (δ.ο flazasulfuron 25% β/β), η οποία χορηγήθηκε την αριθ. πρωτ. 7934/232232/12.08.2022 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		Γραμ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή:  Πορτοκαλιά CIDSΙ, Λεμονιά CIDLI, Γκρέιπφρουτ CIDPA, Μανταρινιά CIDRE, Λάιμ (Πράσινα λεμόνια) CIDAF)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια *	6 – 20	20 – 60 <sup>(7)</sup>	Εφαρμογή την άνοιξη, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού	1
Ελιά OLVEU	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	6 – 10	20 – 60 <sup>(7)</sup>	Εφαρμογή το <u>φθινόπωρο</u> , προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού	1
		6 – 20	20 – 60 <sup>(7)</sup>	Εφαρμογή την <u>άνοιξη</u> , προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού	1
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	6 – 20	20 – 60 <sup>(7)</sup>	Εφαρμογή προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά, των ζιζανίων κατά τον Χειμώνα – Άνοιξη, σε λωρίδες στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού	1
Ακαλλιέργητες εκτάσεις (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι,	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	6-13,6	20 – 60 <sup>(7)</sup>	Εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1 εφαρμογή κάθε 2 χρόνια

νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές)					
Ακαλλιέργητες εκτάσεις (Σιδηρόδρομοι)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	6 – 20	20 – 60 <sup>(7)</sup>	Εφαρμογή νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.	1

## Παρατηρήσεις:

1. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος και καρπούς.
2. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
3. Οι εφαρμογές μεταφυτρωτικά θα πρέπει να γίνονται μέχρι το 4<sup>ο</sup> φύλλο των ζιζανίων.
4. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
5. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές
6. Μην ψεκάσετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες.
7. Όγκος ψεκαστικού υγρού: - 20-40 λίτρα/στρ με μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα  
- 60 λίτρα/στρ με χειροκίνητα ψεκαστικά μέσα.

## \*Καταπολεμούμενα ζιζάνια :

## Αμπέλι:

## Προφυτρωτικά

-Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.:

Ευαίσθητα ζιζάνια

*Conyza canadensis* (ERICA) Κόνυζα*Veronica persica* (VERPE) Βερόνικα*Amaranthus retroflexus* (AMARE) Τραχύ βλήτο*Chenopodium album* (CHEAL) Λουβουδιά- Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ. σκ./στρ.*Senecio vulgaris* (SENVU) Μαρτιάκος*Amaranthus retroflexus* (AMARE) Τραχύ βλήτο*Chenopodium album* (CHEAL) Λουβουδιά*Mercurialis annua* (MERAN) Σκαρολάχανο*Conyza canadensis* (ERICA) Κόνυζα*Geranium rotundifolium* (GERRT) Γεράνι*Polygonum persicaria* (POLPE) Αγριοπιπεριά*Polygonum aviculare* (POLAV) Πολυκόμπι*Sonchus asper* (SONAS) Ζοχός τραχύς*Matricaria inodora* (MATIN) Χαμομήλι*Diploaxis erucoides* (DIPER) Ρόκα άγρια*Echinochloa crus-galli* (ECHCG) Μουχρίτσα*Lolium multiflorum* (LOLMU) Πολύανθη Ήρα*Setaria viridis* (SETVI) Σετάρια*Digitaria sanguinalis* (DIGSA) Αιματόχορτο*Setaria verticillata* (SETVE) Σετάρια σπονδυλωτή*Poa annua* (POAAN) ετήσια Πόα

## Νωρίς μεταφυτρωτικά

Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 6-20 γρ.σκ./στρ.:

Ευαίσθητα ζιζάνια

*Chamaemelum mixtum* (ANTMI) Χαμομήλι*Diploaxis erucoides* (DIPER) Ρόκα άγρια- Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη δόση 20 γρ.σκ./στρ.

Ευαίσθητα ζιζάνια

*Conyza canadensis* (ERICA) Κόνυζα*Erodium malacoides* (EROMC) Βελονίδα μαλακοειδή*Geranium dissectum* (GERDI) Γεράνι*Geranium molle* (GERMO) Γεράνι*Geranium rotundifolium* (GERRT) Γεράνι*Senecio vulgaris* (SENVU) Μαρτιάκος*Polygonum aviculare* (POLAV) Πολυκόμπι*Conyza canadensis* (ERICA) Κόνυζα*Festuca elatior* (FESAR)*Diploaxis erucoides* (DIPER) Ρόκα άγρια*Stellaria media* (STEME) Στελλάρια*Lamium amplexicaule* (LAMAM) Δωδεκάνθι*Sinapis arvensis* (SINAR) Σινάπι*Carduus crispus* (CRUCR) Γαϊδουράγκαθος

Εσπεριδοειδή : Προφυτρωτικά –	Νωρίς μεταφυτρωτικά Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη <u>δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.:</u> Ευαίσθητα ζιζάνια <i>Amaranthus blitoides</i> (AMABL) Πλαγιαστό βλήτο
	Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη <u>δόση 20 γρ. σκ./στρ.</u> Ευαίσθητα ζιζάνια <i>Portulaca oleracea</i> (POROL) Αντράκλα <i>Amaranthus retroflexus</i> (AMARE) Τραχύ βλήτο <i>Amaranthus albus</i> (AMAAL) Άσπρο βλήτο <i>Amaranthus sp.</i> (AMASS) Βλήτο <i>Sonchus oleraceus</i> (SONOL) Ζωχός <i>Galium aparine</i> (GALAP) Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα <i>Diploaxis erucoides</i> (DIPER) Ρόκα άγρια <i>Malva parviflora</i> (MALPA) <i>Chenopodium album</i> (CHEAL) Λουβουδιά <i>Euphorbia chamaesyce</i> (EPHCE) Χαμαισική <i>Coryza canadensis</i> (ERICA) Κόνυζα <i>Capsella bursa-pastoris</i> (CAPBP) Καψέλλα <i>Picris echinoides</i> (PICEC) Πικρίς <i>Parietaria sp.</i> (PAISS) Περδικούλι <i>Fumaria sp</i> (FUMSS) Καπνόχορτο <i>Senecio vulgaris</i> (SENVU) Μαρτιάκος <i>Urtica urens</i> (URTUR) Τσουκνίδα <i>Setaria verticillata</i> (SETVE) Σετάρια σπονδυλωτή <i>Poa annua</i> (POAAN) ετήσια Πόα <i>Echinochloa crus-galli</i> (ECHCG) Μουχρίτσα <i>Lolium sp</i> (LOLSS) Ήρα Μέτριως Ευαίσθητα ζιζάνια <i>Setaria sp.</i> (SETSS) Σετάριας <i>Sonchus oleraceus</i> (SONOL) Ζωχός
Ελιές : Προφυτρωτικά - Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη <u>δόση 20 γρ. σκ./στρ. (επιπλέον των ανωτέρω)</u> <i>Calendula arvensis</i> (CLDAR) Καλεντούλα <i>Galium tricornutum</i> (GALTC) <i>Sinapis arvensis</i> (SINAR) Σινάπι <i>Lolium rigidum</i> (LOLRI) Λεπτή Ήρα	Νωρίς μεταφυτρωτικά Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη <u>δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.:</u> Ευαίσθητα ζιζάνια <i>Amaranthus retroflexus</i> <i>Urtica sp</i> (URTSS) Τσουκνίδες <i>Sonchus oleraceus</i> (SONOL) Ζωχός Μετρίως ευαίσθητα <i>Diploaxis erucoides</i> (DIPER) Ρόκα άγρια Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη <u>δόση 20 γρ. σκ./στρ. (επιπλέον των ανωτέρω)</u> Ευαίσθητα ζιζάνια <i>Diploaxis erucoides</i> (DIPER) Ρόκα άγρια <i>Geranium dissectum</i> (GERDI) Γεράνι <i>Malva parviflora</i> (MALPA)

<p>Ακαλλιέργητες εκτάσεις :</p> <p>Προφυτρωτικά</p>	<p><i>Calendula arvensis</i> (CLDAR) Καλεντούλα  <i>Senecio vulgaris</i> (SENVU) Μαρτιάκος  <i>Stellaria media</i> (STEME) Στελλάρια  <i>Rumex acetosella</i> (RUMAA) Λάπαθο  <i>Sisymbrium officinalis</i> (SSYOF) Αγριοβρούβα/  Σισύμβριο φαρμακευτικό  <i>Lolium perenne</i> (LOLPE) Ήρα πολυετής  <i>Lolium rigidum</i> (LOLRI) Λεπτή Ήρα</p>
<p>--</p>	<p>Νωρίς μεταφυτρωτικά</p> <p>-Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη <u>δόση 6-20 γρ. σκ./στρ.:</u>  Ευαίσθητα ζιζάνια  <i>Diploaxis erucoides</i> (DIPER) Ρόκα άγρια</p> <p>-Καταπολεμούμενα ζιζάνια στη <u>δόση 20 γρ. σκ./στρ. (επιπλέον των ανωτέρω)</u>  Μετρίως ευαίσθητα  - <i>Cirsium arvense</i> (CIRAR) Κίρσιο</p>

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 7934/232232/12.08.2022 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**