



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.02.2023
Αριθ. πρωτ: 781/22139

Ταχ. Δ/νση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9287256
Πληροφορίες: Δ. Κοτσαρίνη
Τηλέφωνο: 210 9287256
e-mail: dkotsarini@minagric.gr

Προς: **BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.**
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
email: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LECOLTIS 10 EC (δ.ο.: cycloxydim 10% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
 - β) (ΕΕ) 2018/1266 της επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών.... **cycloxydim**....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
 - στ) (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’ 4612/19-10-20).

4. Την αριθμ. 70202 άδεια του πανομοιότυπου προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθμ. 781/22139/23.01.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **LECOLTIS 10 EC** της εταιρείας **BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

| |
|-------------------|
| 70486 |
| 24.02.2023 |
| 31.05.2024 |

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
- 1.2.β Μορφή:

| |
|-------------------------------|
| LECOLTIS 10 EC |
| Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) |

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

| |
|-------------------|
| cycloxydim |
|-------------------|

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

| |
|----------------|
| 94 % (β/β) min |
|----------------|

Χημική ομάδα:

| |
|-------------------------|
| Κυκλοεξανοδιόνες |
|-------------------------|

Παρασκευαστής:

| |
|---|
| BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen, Γερμανία |
|---|

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

| |
|--|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: BASF Schwarzheide GmbH Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafen, Γερμανία |
|--|

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

| |
|--|
| Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cycloxydim, όπως προσδιορίζονται στο Part C στην σχετική έκθεση αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας για το πανομοιότυπο προϊόν FOCUS 10 EC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. |
|--|

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

ΑΜΕ: BASGR

Τηλ.: 2106860120

Fax: 2106860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com**BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε**

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

ΑΜΕ: BASGR

Τηλ.: 2106860120

Fax: 2106860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

ΑΜΕ: BASGR

Τηλ.: 2106860120

Fax: 2106860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38,

67056 Ludwigshafen

Γερμανία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) BASF SE

B 510 Carl-Bosch-Strasse 38

67056 Ludwigshafen, Γερμανία

2) Schirm GmbH

Standort Schönebeck

Geschwister-Scholl-Strasse 127

39218 Schönebeck, Γερμανία

3) IMPERIAL Chemical Logistics GmbH

Wendessener Strasse 11c

38300 Wolfenbutte, Γερμανία

4) Schirm GmbH

Halchtersche Str. 33

38304 Wolfenbuettel, Γερμανία

5) BASF Agri-Production S.A.S.

Site Industriel Leurette, Route du Vieux

Chemin de Loon, 59820 Gravelines, Γαλλία

6) Schirm GmbH Standort Lübeck

Mecklenburger Straße 229
23568 Lübeck, Γερμανία

7) Torre srl unipersonale

Via Pian D'Asso
53024 Torrenieri (Si), Ιταλία

8) IPT Pergande GmbH

Wilfried Pergande Platz 1
06369 Weißandt-Görlzau, Γερμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. BASF SE

B 510 Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen, Γερμανία

2) Schirm GmbH

Standort Schönebeck
Geschwister-Scholl-Strasse 127
39218 Schönebeck, Γερμανία

3) K+N Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε.

57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

4) IMPERIAL Chemical Logistics

GmbH Wendessener Strasse 11c
38300 Wolfenbutte, Γερμανία

5) Schirm GmbH

Halchtersche Str. 33
38304 Wolfenbuettel, Γερμανία

6) BASF Agri-Production S.A.S.

Site Industriel Leurette, Route du Vieux
Chemin de Loon 59820 Gravelines, Γαλλία

7) Schirm GmbH Standort Lübeck

Mecklenburger Straße 229
23568 Lübeck, Γερμανία

8) Torre srl unipersonale

Via Pian D'Asso,
53024 Torrenieri (Si), Ιταλία

9) IPT Pergande GmbH

Wilfried Pergande Platz 1
06369 Weißandt-Görlzau, Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: cycloxydim 10% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 88,8% β/β

Περιέχει το διαλύτη parhta.

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή περιγράφεται στο Part C στην σχετική έκθεση αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας για το πανομοιότυπο προϊόν FOCUS 10 EC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

| 2 Συσκευασίες | | | |
|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
| 1 | Φιάλες | 100 κ.εκ. έως 1 λίτρο | PA/PE (Coex) ή f-HDPE |
| 2 | Eco-Φιάλες | 1 λίτρο | PA/PE (Coex) ή f-HDPE |
| 3 | Δοχεία | 3 έως 10 λίτρα | PA/PE (Coex) ή f-HDPE |
| 4 | Eco-Δοχεία | 5 έως 10 λίτρα | PA/PE (Coex) ή f-HDPE |

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με τη χρήση μπεκ τύπου σκούπας. Εφαρμογές νωρίς μεταφυτευτικά / μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας και πριν οι γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη είναι σε ζωηρή ανάπτυξη και μέχρι το αδελφωμά τους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνδυαστικότητα: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες-δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Το προϊόν καταστρέφεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 2 δευτερόλεπτα).

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. Το σκεύασμα περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδίων. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| | | κ.εκ./ στρ. | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ. | | |
| Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO), Κυδωνιά (CYDOB) | <u>Αγρωστώδη</u> <u>Ζιζάνια</u> ⁽¹⁾ | 200 Για Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i> – ECHCG), Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i> - | - | 15-40 | Κάνετε ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των καρπών. (έως BBCH 79) | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Αμπέλι (επιτραπέζιο, οينوποιήσιμο, σταφίδα) (VITVI) | | ALOMY), Πολύανθη ήρα (<i>Lolium multiflorum</i> - LOLMU), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i> - DIGSA), | | | Κάνετε ανοιξιάτικες – καλοκαιρινές εφαρμογές, μέχρι το πλήρες κλείσιμο των σταφυλιών. (έως BBCH 79) | 1 |
| Πατάτα (SOLTU) | | Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA), Σετάρια (<i>Setaria</i> spp. - SETSS), | | | Κάνετε εφαρμογές κατά την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος (BBCH 10-19) | 1 |
| Καρότο (DAUCS), Χρένο (ARWLA), Ραπανάκι (PARSR), Σελινόριζα (APUGR), Παστινάκη (PAVSA), Λαγόχορτο (TROPS) | | Βρόμος (<i>Bromus</i> spp. - BROSS), Πάνικο (<i>Panicum dichotomiflorum</i> - PANDI), Φάλαρη (<i>Phalaris</i> spp. - PHASS), | | | Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του ριζώματος. (BBCH 13-45) | 1 |
| Κρεμμύδι (ALLCE), Σκόρδο (ALLSA), Ασκαλώνιο (ALLAS), Φρέσκο κρεμμυδάκι (ALLCE), Πράσο (ALLPO) | | Λεπτόχλοα (<i>Leptochloa fascicularis</i> - LEFFA), Φέστουκα (<i>Festuca</i> spp. - FESSS), | | | Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 5 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του βολβού. (BBCH 15-45) | 1 |
| Τομάτα (LYPES), Πιπεριά (CPSAN), Μελιτζάνα (SOLME) | | Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού και βρώμης | | | Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 2 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 3 ^{ου} πλευρικού βλαστού. (BBCH 12-23) | 1 |
| Λευκό Λάχανο (BRSOL), Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSOF), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο - BRSPK, Κόκκινο λάχανο - BRSOL) | | 400 Για Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> - CYNDA), Κόκκινο ρύζι (<i>Oryza rufipogon</i>) | | | Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του κεντρικού στελέχους. (BBCH 13-35) | 1 |
| Μαρούλι (LACSA), Σκαρόλα (CICEL), Λυκοτρίβολο (VLLLO) | | 500 Για Αγρόπυρο (<i>Agropyron repens</i> - AGRRE) | | | Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο ως το 9 ^ο φύλλο. (BBCH 13-19) | 1 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Κάρδαμο (LEPSA), Κόκκινο Σινάπι (BRSJU), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Σπανάκι (SPQOL), Αντράκλα (POROL), Αρωματικά φυτά | | | | | | |
| Φασόλια (φρέσκα με λοβό) (PHSVX), Φασόλι (ξηρό) (PHSVX), Μπιζέλι (ξηρό) (PIBSX), Φακές (LENCU), Λούπινα (LUPAL), Ρεβίθια (CIEAR) | | | | | Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο σύνθετο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 ^{ου} μεσογονατίου διαστήματος. (BBCH 13-35) | 1 |
| Ζαχαρότευτλο (BEAVA), Κτηνοτροφικό τεύτλο (BEAVM), Γογγύλι (BRSRR), Παντζάρι (BEAVD) | | | | | Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3 ^{ου} ζεύγους φύλλων ως την πλήρη ανάπτυξη της ροζέτας. (BBCH 16-39) | 1 |
| Βαμβάκι (GOSHI) | | | | | Κάνετε εφαρμογές από το 2 ^ο φύλλο ως το στάδιο έκπτυξης όλων των πλάγιων βλαστών. (BBCH 12-29) | 1 |
| Ελαιοκράμβη (BRSNN) | | | | | Κάνετε εφαρμογές από το 3 ^ο φύλλο ως το στάδιο ανάπτυξης του 5 ^{ου} μεσογονατίου διαστήματος. (BBCH 13-35) | 1 |
| Σόγια (GLXMA) | | | | | Κάνετε εφαρμογές από το 4 ^ο ως το 9 ^ο σύνθετο φύλλο. (BBCH 14-19) | 1 |
| Ηλίανθος (HELAN) | | | | | Κάνετε εφαρμογές από το 2 ^ο ως το 8 ^ο φύλλο. (BBCH 12-18) | 1 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:**

α. ευαίσθητα: Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Σετάρια (*Setaria* spp.), Βρόμος (*Bromus* spp.), Πάνικο (*Panicum dichotomiflorum*), Φάλαρη (*Phalaris* spp.), Λεπτόχλοα (*Leptochloa fascicularis*), Φέστουκα (*Festuca* spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (*Hordeum* spp.) και βρώμης (*Avena* spp.),

β. μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*), Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum*)

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα:

α. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (*Cynodon dactylon*)

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:

α. μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (*Agropyron repens*)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Σε περίπτωση που οι γειτονικές καλλιέργειες είναι αγρωστώδεις και έχουν φυτρώσει κατά τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος, τηρήστε μια απόσταση ασφαλείας 1-5 μέτρων από αυτές. Στις προτεινόμενες χρήσεις και δόσεις, το σκεύασμα δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στα μέρη του φυτού που αποτελούν πολλαπλασιαστικό υλικό. Στις πλώδεις καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται πριν την αρχή της άνθισης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, εναλλάσσετε ή συνδυάζετε το προϊόν με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Επίσης, κάνετε προγράμματα αμειψισποράς των καλλιεργειών.

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία cycloxydim, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα Α (παρεμποδιστής σύνθεσης λιπιδίων) κατά HRAC.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, είναι δυνατή η φύτευση/σπορά όλων των δικοτυλήδων φυτών. Για τη φύτευση/σπορά αγρωστωδών καλλιεργειών πρέπει να περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Όταν εφαρμόζονται προγράμματα αμειψισποράς, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ετικέτα.

9 Εικονογράμματα
κινδύνου:



10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H361d: Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
P264: Πλύνετε με άφθονο νερό σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό.
P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
 «Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την συντήρηση του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.»
 «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.»
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]
SPe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην εφαρμόζετε το προϊόν το φθινόπωρο σε οπωρώνες και σε χλοοτάπητα. Εφαρμόστε στην ελαιοκράμβη μία φορά κάθε τρία χρόνια.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη.

12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο:

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
 Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή δίνετε οτιδήποτε από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|---|---|
| Πατάτα, Φασόλι (ξηρό), Μπιζέλι (ξηρό), Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια | 56 |
| Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο. | 42 |
| Καρότο, Ραπανάκι | 35 |
| Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια (φρέσκα με λοβό), Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό Λάχανο, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά | 28 |
| Πιπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα, Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο | 21 |
| Βαμβάκι | Δεν ορίζεται |
| Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Παστινάκη, Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος. | Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στην Έκθεση Αξιολόγησης που στηρίχθηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος FOCUS 10 EC, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ, στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Χρ. Αραμπατζής