



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.06.2023
Αριθ. πρωτ: 6255/170679

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 14573 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AMPLIGO 150 ZC (chlorantraniliprole 10% β/ο + lambda-cyhalothrin 5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 51/2273/04.01.2023 απόφασή μας, με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 14573 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AMPLIGO 150 ZC (chlorantraniliprole 10% β/ο + lambda-cyhalothrin 5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 6255/170679/02.06.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 14573 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AMPLIGO 150 ZC (chlorantraniliprole 10% β/ο + lambda-cyhalothrin 5% β/ο), που

ανανεώθηκε με την αριθμ. 51/2273/04.01.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης		Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	κ.εκ./στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα (Υ) LYPES	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI</p> <p>Φυλλορύκτης της Τομάτας <i>Tuta absoluta</i> GNORAB</p> <p>Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE</p>	20	-	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση της 1 ^{ης} ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση. (BBCH 51-89)	1
Μπρόκολο (Υ) BRSOK	<p>Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA</p> <p>Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i></p>	20	-	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή. (BBCH 12-49)	1

	<p>SPODLI</p> <p>Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Lipaphis erysimi</i> LIPAER</p>					
Αγκινάρα CYUCA	<p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI</p> <p>Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH</p> <p>Αφίδες <i>Brachycaudus cardui</i> BRDSCA <i>Brachycaudus persicae</i> ANURPN <i>Macrosiphum</i> sp. MACSSP</p>	20	-	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2 ^{ου} φύλλου έως ότου τα φύλλα φθάσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 12-49)	1
Πατάτα SOLTU	<p>Φθοριμαία <i>Phthorimaea operculella</i> PHTOOP</p>	25	-	30-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Στην έναρξη της κάλυψης της καλλιέργειας (10%) έως την άνθιση των πρώτων ανθέων. (BBCH 31-60)	1
	<p>Δορυφόρος της πατάτας <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE</p>	20	-	30-80		
Βαμβάκι GOSHI	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ Βρωμούσα* <i>Halymorpha halys</i> HALYHA</p>	30	-	40-80	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από το στάδιο όπου το 40% των φυτών ενώνονται ανάμεσα στις γραμμές έως ότου το 70% των καρυδιών έχει αποκτήσει το τελικό του	1

					μέγεθος. (BBCH 34-77)	
Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	<p>Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU</p> <p>Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> SESANO</p> <p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI</p>	30	-	30-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} κόμβου έως ότου τουλάχιστον τα μισά σπυριά αλλάξουν χρώμα (από λευκό σε κίτρινο) και η ξηρά ουσία ξεπεράσει το 40%. (BBCH 34-77)	1
Γλυκό καλαμπόκι ΖΕΑΜΣ	<p>Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU</p> <p>Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> SESANO</p> <p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI</p>	30	-	30-60	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 4 ^{ου} φύλλου έως τη φυσιολογική ωρίμανση (ορατή η στοιβάδα αποχωρισμού στη βάση του σπυριού. (BBCH 14-87)	1
Μελιτζάνα (Υ)** SOLME Χρήση Ήσσονος Σημασίας	<p>Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR</p> <p>Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI</p>	20	-	20-100	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} άνθους έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)	1

Φυλλορύκτης της Τομάτας <i>Tuta absoluta</i> GNORAB					
Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE					

Παρατηρήσεις:

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της καφέ βρωμούσας στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μελιτζάνας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

11

Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων /ατμούς /εκνεφώματα.

P264: Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Φοράτε μέσα ατομική προστασίας προσώπου/αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος.

Απαγορεύεται η εφαρμογή με επινώτιους ψεκαστήρες.

Εφαρμογές με ψεκαστήρα χειρός επιτρέπονται μόνο στις καλλιέργειες χαμηλού ύψους ανάπτυξης.

Για τις εφαρμογές με ψεκαστήρες φερόμενους επί ελκυστήρα ή ρυμουλκούμενους με υποβοήθηση αέρα, πρέπει να χρησιμοποιείται τρακτέρ κλειστής καμπίνας.

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια:

- ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων, σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 75%, στις καλλιέργειες της πατάτας, αραβόσιτου και γλυκού καλαμποκιού.
- ζώνη φυτικής ανάσχεσης 20 μέτρων, σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 50%, στις καλλιέργειες τομάτας, μπρόκολου, αγκινάρας και **μελιτζάνας**.
- αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 75%, στην καλλιέργεια βαμβακιού.

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας

- 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης διασποράς κατά 75% ή χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 90% στην καλλιέργεια τομάτας και **μελιτζάνας**.
- 5 μέτρων ή χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 75%, στις καλλιέργειες αραβόσιτου, γλυκού καλαμποκιού, βαμβακιού και πατάτας.
- 5 μέτρων ή χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 50%, στις καλλιέργειες μπρόκολου και αγκινάρας.

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Καταπολεμείστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του σκευάσματος.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Βαμβάκι (0401090)	21
Γλυκό καλαμπόκι (0234000) Πατάτα (0211000)	14
Τομάτα (Υ) (0231010) Μπρόκολο (Υ) (0241010) Αγκινάρα (0270050) Μελιτζάνα (Υ) (0231030)	3
Αραβόσιτος (0500030)	Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 51/2273/04.01.2023 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ