



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.05.2023  
Αριθ. πρωτ: 3720/99469

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: Nichino Europe Co Limited,  
Ηνωμένου Βασιλείου  
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ)  
e-mail: [info@efthymiadis.gr](mailto:info@efthymiadis.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70477 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΗΙΚΑΡΙ (pyraflufen-ethyl 1,06% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 11954/353758/23.12.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70477 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΗΙΚΑΡΙ (pyraflufen-ethyl 1,06% β/ο).
- Την αριθμ. 3720/99469/31.03.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε τη με αριθ. 70477 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΗΙΚΑΡΙ (pyraflufen-ethyl 1,06% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 11954/353758/23.12.2022 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Πατάτα* SOLTU	Αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή ΥΚΡΑΥ	200	30-40	Κατά την έναρξη κιτρινίσματος των φύλλων. BBCH 91 <b>(Μάρτιος-Οκτώβριος)</b>	2/5
	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	100-200	20-40	Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Μέχρι την εμφάνιση του 5% των φυτών. BBCH 00-09 <b>(Μάρτιος-Οκτώβριος)</b>	1
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Αποξήρανση παραφυάδων ΥΕΧST	200	30-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από την πλήρη έκπτυξη 9 ή περισσότερων φύλλων μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιζελιού. BBCH 19-75 <b>(Απρίλιος-Αύγουστος)</b>	2/20
	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιζελιού. BBCH 00-75 <b>(Φεβρουάριος-Αύγουστος)</b>	
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσουλιά MSPGE Ιαπωνική μουσουλιά EIOJA Ασιατικό αχλάδι (nashi, αχλαδόμηλο) PYUPY	Αποξήρανση παραφυάδων ΥΕΧST	200	30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από τη διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους. BBCH 51-75 <b>(Μάρτιος-Σεπτέμβριος)</b>	2/20
	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια			Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους. BBCH 00-75 <b>(Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος)</b>	

Πυρηγόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηινιά PRNDO Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV	Αποξήρανση παραφυάδων YEXST	200	30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από τη διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους. BBCH 51-75 (Μάρτιος-Αύγουστος)	2/20
	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια			Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους. BBCH 00-75 (Φεβρουάριος-Αύγουστος)	
Ακρόδρυα Καρυδιά IUGRE Αμυγδαλιά PRNDU Φουντουκιά CYLAV Φιστικιά PIAVE Καστανιά CSNSA	Αποξήρανση παραφυάδων YEXST	200	30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 60% του τελικού μεγέθους BBCH 13-76 (Μάρτιος -Σεπτέμβριος)	2/20
	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια			Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 60% του τελικού μεγέθους. BBCH 00-76 (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος)	
Ακτινιδιά ATIDE	Αποξήρανση παραφυάδων YEXST	200	30	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι την εμπορική ωρίμαση των καρπών (δεν είναι ακόμα κατάλληλοι για κατανάλωση). BBCH 19-85 (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος)	2/20 (15 ημέρες για αποξήρανση παραφυάδων)
	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια			Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από τον λήθαργο μέχρι μέχρι την εμπορική ωρίμαση των καρπών (δεν είναι ακόμα κατάλληλοι για κατανάλωση). BBCH 00-85 (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος)	

Ελιά OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	Αποξήρανση παραφυάδων YEXST	200	10-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από το στάδιο που τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος της ποικιλίας μέχρι τον έντονο μεταχρωματισμό των καρπών. BBCH 19-85 (Απρίλιος -Σεπτέμβριος)	2/20
	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια		25-40		
Αγκινάρα CYUSC	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	87,5	25-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Από την εμφάνιση του 2 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 4 <sup>ου</sup> φύλλου. BBCH 12-14 (Ιούλιος-Οκτώβριος)	1
Μπανάνα MUBSS	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Νωρίς μεταφυτρωτικά (Ιανουάριος-Δεκέμβριος)	1 ανά έτος
Τομάτα (Υ) LYPES	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	100-200	20-40	Καθολικός ψεκασμός. Πριν τη μεταφύτευση (μέχρι 1 μέρα πριν) (Μάρτιος-Ιούνιος) ή Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών φύτευσης με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Μετά τη μεταφύτευση από την έκπτυξη του 5 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι το σχηματισμό της 2 <sup>ης</sup> ταξικαρπίας. BBCH 15-72 (Απρίλιος-Αύγουστος)	1 ανά έτος

\* Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών στην καλλιέργεια της πατάτας είναι δύο (2): 1 εφαρμογή για καταπολέμηση ζιζανίων + 1 εφαρμογή για αποξήρανση στελεχών ή 2 εφαρμογές για αποξήρανση στελεχών.

**Παρατηρήσεις:**

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.
2. Η χρήση στην αχλαδιά περιλαμβάνει και το ασιατικό αχλάδια (nashi, αχλαδόμηλο).
3. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει και τη βυσσιλιά.
4. Η εφαρμογή για αποξήρανση παραφυάδων να γίνεται σε μη ξυλοποιημένες παραφυάδες με μήκος έως 15-20 εκ.
5. Εφαρμογή απουσία ανέμου.
6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες ελιάς Καλαμών και Κορωνέικη, στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.

**ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**

- Πατάτα Ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)

Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)  
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)  
 Πολύγωνο αναρριχώμενο (*Fallopia convolvulus* - POLCO)

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοπιπεριά (*Persicaria maculosa* / *Polygonum persicaria* - POLPE)  
 Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)

- Τομάτα Ευαίσθητα: Αγριοπιπεριά (*Persicaria maculosa* / *Polygonum persicaria* - POLPE)  
 Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)  
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)  
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
 Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)  
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)  
 Πολύγωνο αναρριχώμενο (*Fallopia convolvulus* - POLCO)

- Αγκινάρα Ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)  
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)  
 Βλήτο άσπρο (*Amaranthus albus* - AMAAL)  
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
 Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)  
 Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis* - FUMOF)  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
 Μολόχα (*Malva* spp. - MALSS)  
 Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)  
 Σισύμπριο (*Sisymbrium irio* - SSYIR)  
 Τσουκνίδα μικρή (*Urtica urens* - URTUR)  
*Chenopodium murale* - CHEMU  
*Diploaxis virgata* - DIPVG

- Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ακτινίδιο, Ελιά

Ευαίσθητα: Αγριομάρουλο (*Lactuca serriola* - LACSE)  
 Αναγαλλίδα (*Anagallis arvensis* - ANGAR)  
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)  
 Βερόνικα (*Veronica hederifolia* - VERHE, *Veronica persica* - VERPE)  
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)  
 Γεράνι (*Geranium dissectum* - GERDI)  
 Επιλόβιο (*Epilobium* spp. - EPISS)  
 Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)  
 Καρδαμίνη (*Cardamine hirsuta* - CARHI)  
 Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP)  
 Κόνυζα (*Erigeron bonariensis* - ERIBO)  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU)  
 Μολόχα (*Malva sylvestris* - MALSI)  
 Μύαγρο (*Myagrum perfoliatum* - MYGPE)  
 Παπαρούνα κοινή (*Papaver rhoeas* - PAPRH)  
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)  
 Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua* - MERAN)  
 Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)  
 Τοριλίδα (*Torilis arvensis* - TOIAR)

*Acalypha virginica* - ACCVI  
*Chamaesyce prostrata* / *Euphorbia prostrata* - EPHPT  
*Diplotaxis eruroides* - DIPER

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)  
 Κόνυζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)

- Μπανάνα Ευαίσθητα: Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)  
 Βλήτο καλλιεργούμενο (*Amaranthus hybridus* - AMACH)  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)  
 Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis* - SONAR)  
 Κόνυζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)  
 Λαβατέρα (*Lavatera arborea* - LVAAR)  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)

## II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11954/353758/23.12.2022 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**